



California Academy of Sciences Library

By action of the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University on June 14, 1974, this book has been placed on deposit with the California Academy of Sciences Library.



18

Mexicos Bregner,
en systematisk, critisk, planogeographisk Undersögelse

af

F. Liebmann.

(Læst i det Kongl. danske Videnskabernes Selskabs Møde d. 3 Novbr. 1848).

W.

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
California Academy of Sciences Library

<http://www.archive.org/details/mexicosbregneren00lieb>

Mexico har i Löbet af de sidste tyve Aar været en ligesaa interessant som udtömmelig Grube for Botaniken; men uagtet allerede saa rige Skatte derfra ere tilførte Videnskaben, lover dog Landets Udstrækning og mangfoldige climatologiske og geognostiske Forskjelligheder betydeligt Udbytte for tilkommende Undersögere. Allerede siden Humboldts og Bonplands Reise i Mexico har Naturforskernes Opmærksomhed været henvendt paa dette mærkværdige Lands Naturprodukter, men det gunstige Sammenstød af Omstændigheder, som skaffede hine to udmærkede Forskere Adgang til de udstrakte spansk-americanske Colonier lige imod det baade tidligere og sildigere fulgte mistænkelige og prohibitive spanske Colonial-System, gjentog sig ikke senere; og det var først Revolutionen af 1821, som aabnede fri Adgang til Mexico. Under Krigen med Moderlandet og de indre Omvæltninger, som fulgte paa denne, var Landet ikke skicket for Naturforskerens fredelige og rofordrende Sysler; derfor var det først henimod 1830, at europæiske Naturforskere begyndte at bereise Mexico, og siden den Tid har deres Antal stadig været i Tiltagende, uden at Udbyttet af disse Reiser endnu synes at tyde hen paa nogensomhelst Udtömmelse af Landets Planterigdom.

Mexicos Bregner have med Rette tiltrukken sig megen Opmærksomhed, og et stort Antal Arter er efterhaanden blevet beskrevet, hvorom det litterær-historiske Afsnit vil give særlig Oplysning. Man vil imidlertid højlig feile, hvis man troer, at Stoffet i den Retning er udtömt med de ved Schiede, Galeotti og Leibold tilveiebragte Samlinger. Nærværende Skrift vil vise, hvor stor Tilväxt det endnu er muligt for en enkelt Reisende at bringe til det allerede Kjendte; og alligevel er det min Overbevisning, at endnu langtfra det fuldstændige i Mexico existerende Bregne-Antal er kjendt. Denne Mening paatrænger sig mig ved at legge Mærke til, hvor indskrænket dog det Terrain er, som i Mexico er blevet besøgt og undersøgt af Botanikere i Sammenligning med det, hvorom vi aldeles Intet vide, fordi det aldrig er blevet betrædt af nogen Botanikers Fod. De i botanisk Henseende meer eller mindre undersøgte Egne af Mexico ere omrent følgende: 1) en Deel af Østkysten og den østlige Skraaning og Kam af Cordillererne fra 19° til 23° N. B.; 2) et Par Linier fra Østkysten til det Indre, nemlig fra Vera Cruz over Orizaba eller Jalapa til Mexico, eller fra Tampico til Minedistricterne S. Luis Potosi, Guadalaxara, Guanaxuato:

3) en Linie fra Mexico til Acapulco; 4) en Linie fra Mexico til S. Blas; 5) en Linie fra Mexico igjennem Departementet Michoacan til Vulkanen Jorullo; 6) Vulkanen Toluca, Omegnen om Cuernavaca og Plan de Amilpas; 7) en Linie over Tehuacan da las granadas til Oajaca igjennem Misteca alta og M. baja; fremdeles fra Oajaca imod SO. igjennem det saakaldte Sierra de Oajaca med Indbefattelse af Districterne Ixtlan, Chuapan, Villa alta og Chinantla; fra Oajaca imod SV. over Juquila til Sydhavet; endelig en Linie fra Oajaca over Ocotlan, Ejutla, Meoallan til Pochutla og Guatulco ved Sydhavet, langs dette til Tehuantepec. En Expedition er foretaget af Belgierne Linden og Ghiesbrecht igjennem Departementerne Tabasco og Chiapas, men det botaniske Udbytte derfra er ikke bekjendt. Vore Kundskaber om Mexicos Bregner vilde sandsynligvis for Tiden være meget betydeligere, hvis alle de Plantesamlere, som have bereist Landet, havde været videnskabelig dannede Botanikere. Men ikke saa ganske faa af dem vare uvidenskabelige Mænd, sendte fra europæiske Museer, af Selskaber eller af enkelte Rige for at indsamle Frøe af Pragtplanter eller visse Træslægter, eller levende Planter. Naar flere af disse Samlere ved Siden af deres reen practiske Formaal tillige anlagde Herbarier, da vare disse af en saa tilfældig og uvidenskabelig Karakter, at de Resultater, man af slige Samlinger vilde forsøge at uddragte angaaende Vegetationens Beskaffenhed paa de forskjellige Localiteter, maatte blive aldeles falske.

Ved at efterfølge de ovennævnte Veilinier paa Kaartet vil man letteligt overbevise sig om, hvor uændelig meget af dette vidstrakte Land der endnu er tilbage at undersøge; hvor betydelig en Tilvæxt Naturvidenskaben i det Hele og saaledes ogsaa Kundskaben om Landets Bregne-Flora vil kunne vente indtil Mexico er blevne bereist og nøie undersøgt i alle Retninger. Man erindre nemlig, at Mexico er et særdeles vildt Bjergland, imod Øst og Vest begrænset af to Oceaner, og til begge Sider sækende sig i en bred Kyststrækning, hvis største Del ligger indenfor Vendekredsen, altsaa med et reent tropisk Clima; derpaa hævende sig op i Cordillerer af 8—10,000 Fods Middelhøide, medens enkelte Punkter opnaae 13—17,000 Fods Höide, udbredende sig imod det Indre og imod Nord i vidstrakte Höisletter, medens Cordillererne imod Syd jevnt sørnede sig, og danne en Mængde parallellopende Kjeder, adskilt ved overordentlig dybe Floddale, hvilke Parallelkjeder stigeformig hævende sig fra Ø. imod V. indtil de opnaae deres største Höide i Centralknuden Sempaltepec. De østlige Cordillerer ere hyppigen gjennembrudte i vestøstlig Retning af steile og for det meste overordentlig dybe Kløfter af vulkansk Oprindelse (Barancas), og betydelig Udstrækning, hvilke Baranker ere forsynede med en rig og yderst characteristisk Vegetation. Mexicos Vestside ligner Østsiden med Hensyn til Cordillerernes Middelhøide, Middelafstand fra Oceanet, deres jevne Heldning imod Kysten, derimod er der en betydelig Forskjel i Landets betydelig vildere ru Karakter, idelig hævende sig i høie smalle Aase høit op i Naaletærernes Region, og derfra sækende sig i dybe smalle Floddale dybt ned

i Palmernes og Scilamineernes Region, strax efter stigende, og saa fremdeles, uden at den Reisende undes den velgjørende Afvexling af en nok saa liden Slette for den sidste vestlige Aas er overskreden, hvorfra Nedgangen ad den store Skraaplan skeer til Sydhavet. Et Land af den topographiske Beskaffenhed, som det her i faa Træk beskrevne, og med den betydelige geographiske Udstrækning fra 15 til 30° N. B. eier naturligvis betydelige Vegetations-Forskjelligheder: hver Floddal, hver Baranka, hver Bjergkjede, hver enkelt-staaende Bjergkegle har sine eiendommelige Planteformer. Det vil formodentlig af disse faa Antydninger fremgaae, hvor viid en Mark for Naturforskeren Mexico endnu bestandig vedbliver at være.

För vi skride til den systematiske Fremstilling af Mexicos Bregner vil det være hensigtsmæssigt at give en kort litterær-historisk og critisk Udsigt over Forfængernes Arbeider i denne Retning.

I det ældste Værk, som omhandler Mexicos Planter: *Historia plantarum, animalium, mineralium Novae Hispaniae auct. Francisco Hernandez ed. Recch Romæ 1651*, finde vi ingen Bregner omtalte. Botaniken var paa den Tid ikkun et underordnet Anhang til Lægevidenskaben; man skjænkede ikkun saadanne Planter Opmærksomhed, som havde eller antoges at have lægende Egenskaber. Bregnerne, som ingen fremspringende Egenskaber have i denne Henseende, oversaaes. De første Bregner fra Mexico finde vi beskrevne af Antonio José Cavanilles: *Descripcion de las plantas, que demostró en las lecciones publicas del año 1801. Madrid 1802*. Vi finde heri 11 Arter beskrevne fra det vestlige Mexico og Mexicodalen, hjemsendte af Luis Neé, som foretog en Verdensomseilings-Expedition i et spansk Skib; paa denne besøgte det vestlige Mexico, hvorfra han gik til Philipinerne. Af disse 11 Arter ere 3 (*Pteris glauca*, *P. sulfurea* og *P. lutea*) forblevne ukjendte af alle efterfølgende Botanikere. *Pteris aurantiaca* Cav., som ligedeles hørte til de ikke gjenfundne eller ikke gjenkjendte, er uidentivl identisk med *Allosorus ochraceus* Hook. plant. Hartweg. *Adiantum lunatum* Cav., som angives at være funden af Neé ved Acapulco, anseer jeg som tvivlsom Borger af den mexicanske Flora, da jeg antager Muligheden af en Forbytning af Etiquetter, hvorfed en Bregne fra Philipinerne (hvor Bregnene er hyppig) er blevne opført som mexicansk.

Alex. v. Humboldt og Aimé Bonpland besøgte Mexico i 1803; de landede i *A. v. Hum. til holdt og A. Bonpland*. Acapulco, og reiste derfra til Hovedstaden, hvorfra Excursioner foretages imod N. til Minedistricerne Guanajuato, Moran, imod Syd til Nevado de Toluca, imod V. til Vulkanen Jorullo. Ikkun 7 Bregne-Arter findes igagttagne af disse to Naturforskere i Mexico, og beskrevne i *Nova genera et species plantarum Americæ æquinoctialis*, vol. 1, Paris 1815,

og C. S. Kunth Synopsis plantarum, quas in itinere ad plagam aequinoctialem Orbis novi collegerunt Al. de Humboldt et Am. Bonpland, Paris 1822, vol. 1.

Af disse 7 Arter var 1 allerede kjendt som mexicansk ved Cavanilles. Dette var et saare ringe Udbytte i denne Retning. De to Reisende passerede umiddelbart før deres Afreise fra Mexico ned ad den bregnerige østlige Cordillerheldning, men de synes ikke at have kunnet skjenke Planteverdenen nogen Opmerksomhed paa denne sidste Del af deres Reise i hint Land.

Allerede tidligere end disse to Mænds Besög i Mexico havde Böhmeren Thaddæus Hænke undersøgt Mexicos Vestside; men Resultaterne ere sildigere blevne bekjendtgjorte end de humboldt-bonplandske. Hænke afreiste allerede 1789 fra Spanien, ansat som det hedder fisico-botanico comisionado por su Magestad Catolico til at foretage en stor viden-skabelig Expedition til de spanske Coloniallande. Efter at være landet ved la Plata Floden, reiste han over Land til Valparaiso, hvorfra han i Fregatten Descuberto besøgte Coquimbo, Copiapó, Arica, Callao; bereiste derfra de peruaniske Ander, fortsatte Reisen til Trujillo, Guayaquil, Panama, Guatimala og ankom til Acapulco. Efter et kort Ophold der, gik han atter tilbage til Kysten af Californien, og kom lige til Prins Williams Sund. Derfra gik han tilbage, anløb S. Blas og Acapulco; fra sidstnævnte Stad gik han til Hovedstaden Mexico, og kom efter en Maaneds Ophold der i Decbr. 1791 tilbage til Acapulco, hvorfra Expeditionen fortsattes til Marianerne og Philipinerne. Hænke vendte ikke mere tilbage til Europa, men levede i Sydamerica, og døde der i Provindsen Cochabamba i Aaret 1817. De af Hænke paa den ovennævnte Reise vundne Samlinger sendtes efterhaanden til Europa, og kom til Prag, hvor de beskrives i Reliquæ Hænkeanaæ, seu descriptiones et icones plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippinis et Marianis collegit Thaddæus Hænke. Cura musei bohemici, Prag 1825. Bregnerne ere beskrevne af C. B. Presl i Facl. I. 44 Arter opføres heri som mexicanske, men mange af disse bør vistnok ansees som yderst tvivlsomme med Hensyn til Födeland, idet sandsynligviis Planter hen-hørende til Samlingerne fra Manilla og Luzon ere blevne sammenblandede med dem fra Acapulco og Mexico, eller ogsaa en senere tillædig Forvexling af Etiquetter har fundet Sted. At Hænkess Samlinger ikke have været omhyggelig etiquetterede sees deraf, at ingen specielle Localitetsangivelser findes ved Arterne i Rel. Hænk. Det er imidlertid saare vanskeligt senere at rette de Feil, som opstaae i Stedangivelser, fordi det er umuligt ved et fuldstændigt Bevis at godtgjøre Sagen. Ved absolut nye Former lykkes det lettere i den efterfølgende Tid at paavise Feilene. Botryopteris mexicana Presl er et Bevis herpaa, idet denne Bregne, som i Rel. Hænk. angives som mexicansk, senere fandtes at henhøre til Philipinerne Flora. Ved allerede beskrevne og andenstedsfra bekjendte Arter er det langt vanskeligere at paavise den uriktig angivne Localitet, fordi Muligheden dog er tilstede, at Planten kan gjøre store Spring ud over sit tidligere kjendte Udbredningsareal.

Man har da sædvanlig ikkun det at holde sig til, om Planten i den nyere Tid er blevet gjenfundne i det samme Strøg eller ikke. Som saadan til den mexicanske Flora urigtig henregnede Bregnearter i Rel. Hænk. anseer jeg følgende: Notochlæna incana (peruansk?), Polypod. irregulare (asiatisk?), Nephrodium acuminatum, N. semicordatum, N. hirsutulum, N. exaltatum (sydamericanske?), Asplenium laserpitifolium (asiatisk?), Lomaria? juglandifolia, Adiantum lunulatum (asiatisk?). Flere af de hænkeske Bregner ere desuden i systematisk Henseende tvivlsomme paa Grund af en temmelig ufuldstændig Beskrivelse; ligesom de heller ikke ere gjenfundne af nyere Reisende i det vestlige Mexico. Saadan ere: Asplenium? villosum, Lomaria? juglandifolia, Pteris æqualis, Adiantum lucidum, A. incisum, A. amplum, Dicksonia adiantoides, D. multifida, Hymenophyllum pectinatum, Gleichenia nitida. Endelig ere nogle af de i Rel. Hænk. af Presl opstillede Arter uden Twivl uden Grund adskilte fra andre bekjendte Arter, saaledes Aneimia cordifolia fra A. Phyllitidis, A. dissecta fra A. hirsuta, A. carvifolia fra A. adiantifolia. Der bliver saaledes ikkun et ringe Antal af sikkre og til den mexicanske Flora virkelig henhørende Bregner tilbage, som tilkomme ved Hænkes Reise.

Dr. Schiede var den første Botaniker, som i længere Tid opholdt sig paa *Schiede*. Mexicoes bregnerige Østside, og hvem en meget anseelig Tilvækst i vor Kundskab om denne Families Forhold i Mexico skyldes. Schiede reiste fra Aaret 1830 i Mexico; han botaniserede i længere Tid i Omegnen af Jalapa, og foretog derfra en Reise over Chiconquiaco, Jalacingo, Naulingo til Misantla og Papanbla. Senere nedsatte han sig som practiserende Læge i Hovedstaden Mexico, virkede dog indtil sin alt for tidlig indtrufne Død med usvækket Interesse for sin Yndlingsvidenskab, men indskrænkedes i den sidste Tid af sit Liv i sin Virksomhed som Botaniker ved sin practiske Löebbane. Schiede sendte sine botaniske Samlinger efterhaanden til Tydkland, hvor de beskreves i Schlechtendals *Linnæa*. Schlechtental selv bestemte og beskrev i 5te Bind af *Linnæa* 78 af Schiedes mexicanske Bregnearter, hvoraf 16 vare nye, 6 Arter tvivlsomme eller urigtige, 5 Arter vare tidligere bekjendte som mexicanske. Prof. Kunze leverede i 13de Bind af *Linnæa Additamenta ad filices mexicanas*, hvori 44 schiedeske Bregnearter omtales. Heraf vare 11 nye, 10 tidligere kjendte fra Mexico, 5 tvivlsomme. Ved Dr. Schiede er saaledes sendt 122 Arter fra Mexico; 9 af disse ere endnu at betragte som tvivlsomme, 11 som tidligere kjendte, bliver til Rest 98 Arter, som skyldes denne Botaniker.

Ved Dr. Schiedes Sendinger fra Mexico var Opmærksomheden igjen blevet henvendt paa dette Lands botaniske Rigdomme. Lysten til at overføre til Europa saadan Planterformer, som udmarkede sig enten ved Blomsternes Pragt eller ved nyttige Egenskaber, fremkaldte nu Udsendelsen af Gartnerne eller reisende Samlere til Mexico, ved hvilke efterhaanden en meget stor Maengde interessante mexicanske Planter ere blevne indførte i de europæiske Haver og Væxthuse.

Fr. Hartweg sendtes saaledes til Mexico af Horticultural Society for at samle Frøe, *Hartweg*.

levende Planter og Herbarier. De af ham sendte tørrede Planter ere beskrevne af G. Bentham i plantæ Hartwegianaæ, London 1839. De faa tilfældig af en Ikke-Botaniker indsamlede Bregne-Arter ere beskrevne af J. W. Hooker. 42 Arter omtales, af hvilke 3 Arter ere nye (den ene, *Antrophyum ensifolium* Hook. er ufuldstændigt beskrevet), Resten er Arter, som allerede vare kjendte som mexicanske.

Galeotti.

Balgieren Henry Galeotti bereiste Mexico fra 1835 til 1840 som Reisende for nogle engelske Rigmænd og et belgisk Handelsgartneri for at indsamle levende Planter og Frøe. Under sine vidtløftige Reiser i de forskjellige Dele af Mexico anlagde han betydelige Herbarier, som senere efter hans Hjemkomst fordeles i flere mindre Samlinger efter de forskjellige Localiteter, og solgtes særskilt. Et specielt Arbeide over Mexicos Bregner udgaves kort Tid efter hans Hjemkomst i Forening med Prof. M. Martens: *Mémoire sur les Fougères du Mexique par M. Martens et H. Galeotti avec 28 planches*, indført i *Annales de la Société Royale de Bruxelles*, vol. 15, 1841. Dette Arbeide skal her noget nærmere omtales, fordi det særlig behandler det samme Lands Bregner, som Forf. af nærværende Skrift har gjort til Gjenstand for sine Undersogelser, og altsaa vel maa burde kunne ansees som en Hovedkilde ved min Bearbeidelse af samme Emne. Da dette Værk imidlertid i den efterfølgende systematiske Del idelig maa blive Gjenstand for critiske Angreb, er det et bekvemt Sted her at kunne tage det under en almindelig Betragtning og Bedommelse.

Skjöndt man skulde vente at finde samlet Alt, hvad der til den Tid var bekjendt om Bregnerne indenfor det mexicanske Riges Grandser i dette Værk, er det dog kun de af Herr Galeotti samlede Bregner, som deri afhandles. Forf. synes saaledes at have fordelet Arbeidet imellem sig, at Prof. M. Martens har givet Bestemmelserne af Arterne, og udkastet de latinske Diagnoser af de som nye anseete Former; medens H. Galeotti i den franske Text har givet Oplysning om Arternes geographiske Forhold. Dette Arbeide er af det Slags, som langt fra i Sandhed at gavne Videnskaben, tilføre denne en Masse Stof, som ikun en meget kort Tid indlæmmes i samme, men hvortil Tilliden snart forsvinder, saasnart Critiken begynder sin Analyse, og da allevegne finder Urigtheder i Angivelser og Paastande, falske Bestemmelser i utroligt Antal, det mest paaafaldende Ubekjendtskab til den Del af Litteraturen, som netop beskjæftiger sig med samme Emne. Man har i Sandhed Vanskælighed ved at begribe, hvilke Bevæggrunde der have kunnet bringe Forf. til at udgive et saa aldeles overfladisk og i alle Henseender umodent Arbeide. Saaledes som det nu imidlertid foreligger, er det Critikens mōisommelige Sag at følge Forf. Skridt for Skridt, for at rette deres Fejl, stryge störste Delen af deres saakaldte nye Arter, befæste og saa at sige paa ny at indføre i Videnskaben de faa ligesom tilfældige virkelig nye Arter, som blive tilbage efter den store Udrenselse. Forf. sige rigtignok i Fortalen p. 5, at de have gjort Diagnoserne af de nye Arter meget udförlige, fordi det er det eneste Middel til at gjøre Arterne vel kjendte for Botanikerne, og forebygge Forvexling

med andre nærstaende Arter. Desto mere paafaldende er det, at Forff., skjöndt indseende Nödvendigheden af Udförlighed og Nöiagtighed, alligevel give saa unöiagtige og ufuldstændige Diagnoser, at det er nødvendigt at udarbeide aldeles nye, hvis Videuskaben skal kunne tilegne sig dem.

Afbildningerne, som ere af Galeotti, vidne om en mærklig Mangel paa Sagnet; mange af Afbildningerne ere aldeles ubrugelige, saaledes Tab. 2 Fig. 2; T. 7 F. 3; T. 12; T. 15 F. 1; T. 15 F. 3; T. 22; T. 23. Medens den systematiske Del i det hele taget er affærdiget med en Korthed og Ufuldstændighed, som gjør det meget vanskeligt for Critiken at bringe de bestridte Punkter til Evidents af Mangel paa Holdepunkter, og som ikkun tillader den, der selv er nöiere bekjendt med Forhold og Materie ved et længere Ophold i Mexico, at tale med en vis Grad af Sikkerhed; saa finde vi den anden Del af Arbeidet, som er skrevet paa fransk, og som indeholder Oplysninger om Arternes geographiske Forhold i Mexico udført med langt større Vidtlöftighed. Undersøge vi imidlertid denne af den Reisende selv leverede Del, saa finde vi en stor Ordrighed skjulende en stor Fattigdom paa virkelige og nødvendige Oplysninger. Vidtlöftigen fortælles Ting, som ere Sagen aldeles uvedkommende, ja de samme Ting gjentages mangfoldige Gange, medens de vedkommende Meddelelser, som kunne være af Nytte og Interesse ere höist ufyldestgjörende behandlede. Forff. yttre ogsaa i Fortalen p. 6, at de haabe, at denne Del ikke skal være uden Interesse for Geologer og Plantogeographer. For at dette imidlertid skulde være Tilfældet, maatte alle i Memoiren indeholdte Data være sikkre, hvilket ikke er Tilfældet. Ikke engang Angivelsen af Arternes geographiske eller topographiske Forhold er synderlig paalidelig, uagtet det hedder, at der er anvendt megen Omhyggelighed herpaas efter de Noter, som ere samlede paa Stedet af Herr Galeotti. Det efterfølgende vil vise, hvorledes Bregner, som udelukkende ere terrestre, anføres som parasitiske, hvorledes Arter, som ere fremherskende og charakteristiske for den subtropiske og tempererede Region (2—4000 Fod) anføres for den kolde (7—11000'), saaledes *Pteris Orizabæ*, *Xiphopteris serrulata*, o. fl.

Memoiren indeholder 170 Arter (12 Arter Lycopodiaceer ere her fradragne). 42 Arter af disse beskrives som nye, men af efterfølgende Liste vil det fremgaae, at ikkun et meget indskrænket Antal (10) virkelig ere ubeskrevne. Det overveiende Antal af de som nye opstillede Arter ere saadanne, som enten forlangst ere beskrevne af Andre, og i det hele taget ere vel kjendte, eller unge Exemplarer af gamle Arter; stundom er ikke engang Slagten rigtig opfattet. En betydelig Del Arter er aldeles falsk bestemt; andre ere i höieste Grad tvivlsomme, og sandsynligvis ligeledes falsk bestemte, men som ikkun med galcottiske Exemplarer for Øje lade sig opklare. For at give en Prøve af Arbeidets Beskaffenhed, hidsættes et Par Lister, som bedre end mange Ord ville vise, hvad der har foranlediget ovenstaende ugunstige Dom.

Falske nye Arter i Martens og Galeottis Memoire :

<i>Acrostichum fulvum</i>	= <i>Acrostichum vestitum</i> Schldl.
<i>Polypodium cordifolium</i>	= <i>Aspidium trifoliatum</i> Sw. (pl. junior)!
<i>Polyp. birenatum</i>	= <i>P. subpetiolatum</i> Hook.
<i>Polyp. Galeottii</i>	= <i>P. Sloanii</i> Kze.
<i>Notochlaena levvis</i>	= <i>Notoch. sinuata</i> Kaulf. var.
<i>Pteris fallax</i>	= <i>Allosorus intramarginalis</i> Presl.
<i>Pteris triphylla</i>	= <i>Pt. cretica</i> L.
<i>Asplenium minimum</i>	= <i>Asplenium polymorphum</i> Mart. & Gal. (pl. junior) eller <i>Asplen. pumilum</i> Sw. (pl. jun.)
<i>Woodwardia spinulosa</i>	= <i>Woodw. radicans</i> Sw.
<i>Cheilanthes candida</i>	= <i>Notochlæna pulveracea</i> Presl.
<i>Cheil. minor</i>	= <i>Cheil. lentigera</i> Sw.
<i>Cheil. lanuginosa</i>	= <i>Cheil. lentigera</i> Sw.
<i>Allosorus decompositus</i>	= <i>Allos. augustifolius</i> Presl.
<i>Allosorus chaerophyllus</i>	= <i>Allos. ciliatus</i> Presl.
<i>Aspidium pumilum</i>	= <i>Aspid. nobile</i> Schldl.
<i>Aspid. crinitum</i>	= <i>Aspid. parallelogrammum</i> Kze.
<i>Alsophila pilosa</i>	= <i>Polypodium rude</i> Kze.
<i>Alsoph. fulva</i>	= <i>Alsoph. Schanschinii</i> Mart.
<i>Adiantum pellucidum</i>	= <i>Adiant. tenerum</i> Sw.
<i>Aspidium athyroides</i>	= <i>Asp. mexicanum</i> Presl.? sec. Kze.

Urigtig bestemte Arter ere :

<i>Acrostichum citrifolium</i>	= <i>Polypodium lycopodioides</i> L.
<i>Acrost. crinitum</i>	= <i>Acrost. hybridum</i> Bory.
<i>Gymnogramme Totta</i>	= <i>Gymnogr. Linkiana</i> Kze.
<i>Tænitis linearis</i>	= <i>Vittaria graminifolia</i> Kaulf.
<i>Pteris serrulata</i>	= <i>Pteris cretica</i> L.
<i>Notochlaena trichomanoides</i>	= <i>Notoch. rufa</i> Presl.
<i>Polypodium aureum</i>	= <i>Polyp. sporadocarpum</i> Willd.
<i>Diplazium acuminatum</i>	= <i>Diplaz. striatum</i> .
<i>Asplenium denticulosum</i>	= <i>Diplazium lonchophyllum</i> Kze.
<i>Lomaria longifolia</i>	= <i>Lomaria spectabilis</i> Liebm.
<i>Blechum gracile</i>	= <i>Blech. glandulosum</i> Kaulf.
<i>Asplenium falcatum</i>	= <i>Asplen. harpeodes</i> Kze.
<i>Asplen. discolor</i>	= <i>Asplen. semicordatum</i> Raddi.

<i>Asplen. repandulum</i>	= <i>Asplen. riparium</i> Liebm.
<i>Cænopterus millefolium</i>	= <i>Asplen. rhizophyllum</i> Kze.
<i>Alsophila pruinata</i>	= <i>Alsolphil. Schiedeana</i> (pro parte).
<i>Aspidium tuberosum</i>	= <i>Nephrolepis occidentalis</i> Kze.
<i>Aspid. aculeatum</i>	= <i>Polystichum ordinatum</i> Kze.
<i>Marattia laevis</i>	= <i>Maratt. weinmanniæfolia</i> Liebm.
<i>Lygodium scandens</i>	= <i>Hydroglossum spectabile</i> Liebm.
<i>Blechnum ciliatum</i>	= <i>Lomaria campylotis?</i> sec. Kunze.

Tevlvsomme Arter, som ikkun ved galeottiske Exemplarer kunne oplyses:

<i>Acrostichum muscosum.</i>	<i>Polyp. juglandifolium.</i>
— <i>piloselloides.</i>	— <i>pulchrum.</i>
— <i>pumilum.</i>	<i>Pteris arborescens.</i>
<i>Grammitis elongata.</i>	<i>Blechnum polypodioides.</i>
<i>Polypod. glaucinum.</i>	<i>Asplenium erectum.</i>
— <i>araneosum.</i>	— <i>inaequilaterale.</i>
— <i>fulvum.</i>	— <i>nanum.</i>
— <i>ferrugineum</i>	— <i>rhizophorum.</i>
— <i>virginicum.</i>	<i>Aspidium Serra.</i>
— <i>dissimile.</i>	— <i>abruptum.</i>

Artsnavnet maa forandres som allerede brugt uden at Forff. have vidst det, eller som grundende sig paa falske Angivelser:

<i>Antrophyum falcatum</i>	= <i>Antroph. carnosus</i> Liebm.
<i>Allosorus pulchellus</i>	= <i>Allos. formosus</i> Liebm.
<i>Asplenium parvulum</i>	= <i>Asplen. resiliens</i> Kze.
<i>Pteris Orizabæ</i>	= <i>Pteris apicalis</i> Liebm.

Følgende nye Arter blive tilbage som tidligere ubeskrevne, men alle trængende til ny Beskrivelse for at indlemmes i Videnskaben:

<i>Acrostichum affine.</i>	<i>Asplenium polymorphum.</i>
<i>Gymnogramme pilosa.</i>	— <i>mexicanum.</i>
<i>Polypod. delicatulum.</i>	<i>Cheilanthes paleacea.</i>
— <i>affine.</i>	<i>Botrychium decompositum.</i>
— <i>pilosissimum.</i>	<i>Aneimia pilosa.</i>

Prof. Kunze har i Linnaæa vol. 18. 1844 under Titelen Plantæ Leiboldianæ opregnet *Leibold.* 117 i Mexico af Fr. Leibold samlede Bregnearter. Heraf ere 13 Arter nye, 78 ere allerede tidligere bekjendte fra Mexico, 3 ere tvivlsomme. Denne Samling er tilveiebragt saa godt som paa een Localitet (Plantagen Zazuapan, 5 Leguas Ø. for Byen S. Antonio Huatusco),

hvor Samleren, der var kommen til Mexico for at indsamle Planter til Salg, opholdt sig i to Aar, og hvorfra korte Excursioner gjordes i Omegnen.

Klotzsch har i Beiträge zu einer Flora der Äquinoctial-Gegenden der neuen Welt, *C. Ehrenberg, Aschenborn, De Berghes.* Linnaea v. 18, 1844, omtalt 3 for Mexico nye Bregnearter, samlede af C. Ehrenberg og Aschenborn. I Linnaea v. 19, 1847 har C. G. Nees v. Esenbeck omtalt 21 Bregner fra Mexico, samlede af Dr. Aschenborn og De Berghes. Af disse ere 4 nye. Næsten ingen Stedangivelser ere nævnede.

Disse ere de vigtigste Kilder til Studiet af Mexicos Bregner. Ved Udardeidelsen af nærværende Skrift er naturligvis den hele rige Litteratur, som behandler Bregnernes Familie, med største Samvittighedsfuldhed benyttet; ikkun har jeg at beklage, at det ikke er lykkedes mig at erholde Adgang til Giuseppe Raddi Nov. gen. et spec. plant. Brasil. Pars 1 Filices. Florentiae 1825, og Antoine Féé Histoire des Acrostichacées. Strasburg 1844.

Polypodiaceæ.

Acrostichum L.

1. *Acrostichum (Olfersia) tenuifolium* Liebm.:

fronde cæspitosa coriacea, *sterili* 6—7 pollices longa, 3—4 lineas lata, linear-lanceolata vel linear-spathalata, apice acutiuscula vel plerumque mutilata eamque ob causam retuso-spathalata, margine incrassato revoluto integro, basi longissime attenuata, sensimque in stipitem transiente; stipite 4—5 pollicari stramineo hic illic paleis deciduis tenuissime membranaceis flaccidis ovatis laceris instructo, antice canaliculato, postice convexo; lamina glaberrima, antice obscure viridi, postice pallidiori sparsim nigropunctata, costa paginae posterioris planata subimmersa, antice canaliculata, venis immersis antice param prominulis simplicibus vel furcatis postice evanescentibus; *fertili* sterilibus longiori, 9—10 pollices longa lineam lata, stipite 5—6 pollicari, lamina lineari, utrinque acuminata acuta, margine revoluto, costa paginae posterioris glabra applanata, sporangiis flavo-fuscis.

Rhizoma pennam anserinam crassum horizontale repens dense squamosum, squamis membranaceis flavescentibus lanceolatis acuminatis, radiculis plurimi fibrillosis ramosis obsitum.

Denne Art voxer paa halvraadue omstyrtede Træslammer i de tætte Höiskeve, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec i Departementet Oajaca, og findes i en Höide af omtrent 9000'. Af ingen tidligere Reisende er denne Bregne tagget, ligesom jeg heller ikke har bemærket den paa noget andet Voxested.

Assm. Af de indsamlede Exemplarer findes ikun paa faa Lövets Spidse uskadt; paa de fleste synes den afbrudt i meget ung Tilstand, men denne Beskadigelse forhindrer ikke den videre Udvikling, kun bliver Lövet da ikke tilspidset, men spatelformig og udrandet. De frugtbærende Exemplarer fandtes altid uskadte.

2. *Acrostichum (Olfersia) revolutum* Liebm.:

fronde simplici coriacea rigida, *sterili* $1\frac{1}{2}$ — 2 pollices longa, lamina stipitem parum superante, 4 lineas lata, elliptica obtusa, basi longius attenuata, margine incrassato revoluto,

utraque pagina glaberrima, subtus pallidiori, costa antice canaliculata, postice convexa prominula, venis immersis vix conspicuis simplicibus furcatisve curvatis; stipite antice canaliculato marginato, postice convexo, paleis membranaceis lanceolatis laceris subadpressis obsito; *fertili* sterilibus, subduplo longiore, stipite bipollicari, lamina subpollicari elliptica, 3 lineas lata margine incrassato non revoluto.

Rhizoma filum linteum crassum horizontale repens curvatum hic illic radiculis villosis instructum, squamis rufis lanceolatis laceris dense obsitum.

Den voxer paa Barken af gamle Træer imellem Lobani og Petlapa i Districtet Chinantla i det østlige Oajaca paa henved 3000 Fods Höide, og indsaaledes i Juli Maaned-Paa Cuba samlede jeg den ved Bejucal i Skovene, der bedække Kalkhöiene paa omtrent 400 Fods Höide, og fandtes der fructificerende i Marts Maaned.

De cubanske Exemplarer ere fuldkommen overensstemmende med de mexicanske. Undertiden findes det sterile Löv saa indrullet i Randen, at det bliver fuldkommen linieformigt.

Den Art, denne Bregne efter Beskrivelsen at dömmme synes at komme nærmest, er *A. gorgoncum* Kaulf. fra Sandwich-Öerne, men af denne ere ingen Original-Exemplarer seete.

3. *Aerostichum (Olfersia) ovatum* Liebm.:

fronde simplici coriacea, *sterili* 3—5 pollices longa, lamina 1—1½ pollicari, 6—7 lineas lata, elongato-ovala apice obtusa, basi attenuata, margine imprimis apicem versus undulato incrassato revoluto, supra glabra, costa elevata, venis conspicue prominulis curvato-patulis simplicibus furcatisve, obscure viridi, subtus pallidiori hic illic absque ordine squamis rufis adpressis notata, venis immersis, costa elevata; stipite 2—4 pollices longo marginato antice canaliculato postice convexo, squamis membranaceis lanceolatis laceris rufis subadpressis obsito; *fertili* sterilibus longitudine subæquante, lamina bipollicari, 3 lineas lata linearis obtusa, margine incrassato non revoluto, basi longe attenuata, costa antice canaliculata, sporangiis fuscis.

Rhizoma filum emporeticum crassum horizontale repens extensum curvatum, radiculis villosis ramosis, squamis linearis lanceolatis acutis subadpressis rufis dense obsitum.

Den voxer paa gamle Stammer i Höiskove paa Siderne af Cerro de Sempoaltepec i Departementet Oajaca imellem 8—9000 Fods Höide.

Den nærmer sig meget til foregaaende Art, men adskilles dog derfra ved Lövels Störrelse, ved Længden af Stilken, som overgaer Pladens, ved den paa det ufrugbare Lövs Overflade fremtrædende, ikke randede Middelaare, ved de fremtrædende Sideaarer, ved det frugtbare budt linieformige Löv o. s. v.

**4. *Acrostichum (Olfersia) affine Martens & Galeotti* Mem. Foug. mex. p. 24,
tab. 3 fig. 4 (uden Analyser).**

Da Forfatternes Beskrivelse er alt for kort og ufyldstgjørende, idet netop de vigtigste karakteristiske Træk ere upaaagtede, saa at det fornemmelig skyldes den medfølgende Afbildning, at Arten er bleven erkendelig, anseer jeg det for nødvendigt her at give en udførlig Beskrivelse.

Rhizoma pennam gallinaceam crassum repens curvatum rigidissimum, paleis majusculis nigrantibus nitidissimis lanceolatis ciliatis deciduis dense obsitum, frondibus rigidis coriaceis, fertilibus sterilibus dimidio longioribus conformibus. *Frons sterilis* 3—5 pollicaris, stipite 1½—2 pollices longo, lamina 2—3 pollices longa, ½—⅔ pollicem lata, oblongo-lanceolata obtusiuscula, margine incrassato reflexo, basi paululum attenuata, antice obscure viridi glaberrima, postice pallide flavescente sub lente papillata, squamis minutis deciduis sparsis hic illic notata, costa paginae superioris canaliculata, paginae inferioris elevata convexa, venis immersis arcuatim patulis simplicibus furcatisse antice parum conspicuus, stipite antice canaliculato marginato, postice convexa basin versus hic illic squamis deciduis membranaceis flavescentibus parse obsito, 2—3 lineas supra basin geniculato. *Frons fertilis* stipite 4 pollicari, lamina 3 pollicari, ½ pollicem lata, margine inflexo, sporangiis fuscis.

Den voxer paa Vulkanen Orizaba i en Höide af 10,000 Fod, i Skoven som omgiver Vaqueria del Jacal, fornemmelig paa Egestammer, og bærer Frugt i September. Enkelte Exemplarer fandt jeg paa Ege ved Sta Maria Alpatlahua paa 7500'.

Naar Forff. sammeulige *A. affine* med *A. Schiedei* Kze, forekommer denne Sammenligning mig ganske ubegribelig, da der neppe gives to Arter af Afdelingen af Slægten *Acrostichum* med udelt Löv, der kunne være mere forskjellige. Det er unødvendigt for den Sagkyndige at fremhæve de mangfoldige vigtige Forskjelligheder imellem disse to Arter; allene den ene vil her være tilstrækkelig betegnende, at *A. affine* har et overordentlig stift læderagtigt, ja næsten bruskagtigt Löv, medens *A. Schiedei* Kze har et tyndt urteagtigt.

Hos *A. affine* findes en eiendommelig Knædannelse i den nederste Deel af Stilken, der slet ikke omtales af Forff. Det nederste Ledstykke af 2—3 Liniers Længde er noget tykkere end det øverste, og mørkfarvet. Lövets Stilk afløser sig ikke ved selve Grunden, der hvor den er befestet til Rodstokken, men i dette Knæ nden at der dog dannes nogen regelmæssig Ledflade, saaledes at den ældre Rodstok findes besat med disse korte sorte nedre Ledstykker af affaldne Löv. Vi ville senere faae Lejlighed til ved andre Arter af Slægten at gjøre opmærksom paa en lignende Dannelse, der, saavidt jeg veed, hidtil ikke er blevet tagtaget eller paaagtet ved denne Slægt.

5. ***Acrostichum (Olfersia) Lingva Raddi*** Syn. n. 31. Ej. Nov. gen. fil. Bras. p. 5 t. 15 fig. 4. Kunze Syn. fil. Poeppig. p. 27. Martens & Galeotti Mem. s. l. foug. mex. p. 24.

Den voxer i Skove og Klöfter paa Mexicos østlige Side i Regionen imellem 2—3000 Fod paa gamle Traestammer. Saaledes i de dybe skovdækte Klöfter (Barancas) ved Huitamalco i Departementet Vera Cruz, i Skovene omkring Hacienda de Mirador.

Efter Galeotti (l. c.) findes den i Oajacas østlige Bjergegne i Llano verde paa omtrent 7000' Höide, voxende paa Egene sammen med A. Schiedei Kze; dog anseer jeg denne Angivelse for usikker, især med Hensyn til Bestemmelsens Rigthed.

I de systematiske Værker, som behandle Bregnerne, finde vi flere Arter opstillede, som det uden Sammenligning af paahdelige Original-Exemplarer vil være umuligt med fuldkommen Sikkerhed at bestemme, idet Beskrivelserne ere saa korte og flygtige, at man ved at sammenholde Diagnoserne indbyrdes, intet sikkert Holdepunkt finder for Adskillelsen. Saaledes synes A. Lingva Raddi at være identisk med A. conforme Sw., A. laurifolium Thuars, ja selv med A. latifolium Sw., naar hensees til Beskrivelserne. Ikkun en Monograph, i Besiddelse af det fornødne Materiale, vil kunne afgjøre om disse Arter virkelig ere forskjellige, eller om flere eller alle nævnte maa sammendrages.

Vort botaniske Museum er i det hele ikke rigt paa Original-Exemplarer, og saaledes kan jeg ikke løse denne Opgave. Kun det kan jeg bemærke, at i Vahl Herbarium findes et Exemplar fra Montserrat, meddelt af Dr. Ryan, og betegnet som A. simplex Sw., som aabenbart ikke henhører til A. simplex (jevnf. Sw. fl. ind. occid. v. 3 p. 1587), men er aldeles overensstemmende med mine mexicanske Exemplarer af A. Lingva Raddi.

Mine Exemplarer ere af meget forskjellig Størrelse, fra 6 - 13 Tommer lange, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$ T. brede; Lövstilken af $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ Ts. Længde; det frugtbare Löv er noget længere end det ufrugtbare, Stilken nedentil besat med nogle strøede Skjel, næsten firkantet; Lövet glat, læderagtigt.

Jeg formoder, at den som A. simplex Sw. bestemte Art hos Mart. & Gal. l. c. p. 21, henhører til A. Lingva; om den af Kunze (Fil. Leibold. i Linnaea v. 18 p. 309) med Twyl omtalte A. simplex legeledes henhører hertil, tør jeg ingen Mening yttre, da Forf. selv siger, at han kun har havt et eneste monströst Exemplar for sig.

6. ***Acrostichum (Olfersia) Sartorii Liebm. :***

fronde simplici subcoriacea, sterili 2—3 pedali, 2— $2\frac{1}{2}$ pollices lata, lanceolata vel obovato-lanceolata apice acuminata acuta, margine incrassato repando-undulato, basi longissime attenuata, costa utrinque elevata, supra canaliculata, subtus acuta marginata, venis subimmissis horizontalibus simplicibus vel furcatis, supra obscure viridi subtus pallidiori, stipe 5—6 pollicari supra canaliculato, basin versus paleis deciduis brunneis majusculis hic

illuc obsito, 2—3 lineas supra basin geniculato; *fertili* sterilibus breviori, bipedali, stipite 8 pollicari, lamina 12—14 lineas lata, angustiori, obtusa, basi minus attenuata, sporangiis fusco-flavis.

Rhizoma pennam anserinam crassum, horizontale repens paleaceum, frondes plures emittens.

Denne Bregne voxer parasitisk paa gamle Træer i Skovene omkring Hacienda de Mirador i Departementet Vera Cruz paa 3000 Fods Höide, og hører til de almindeligere forekommende Arter. Desto mærkeligere er det, at den ikke tidligere er blevet beskrevet, med mindre den er blevet forvexlet med *A. simplex* eller *A. Lingva*. Den bærer Frugt i Juli.

Den adskilles fra *A. Lingva Raddi* ved sin Størrelse, sit stærkt tilspidsede, ved Grunden langt afsmaldnede Löv, ved den bølgende Rand, ved Middelaaren, som paa Bagg-siden er skarpkantet, o. s. v. Ydre Lighed har den med *A. latifolium Sw.*, som dog afviger ved det frugtbærende Löv dobbelt bredere end det golde, ved den skarpe Lövrand, o. fl. Ligeledes med *A. Sieberi Hook. et Grev. ic. fil. t. 237* har den nogen Overensstemmelse.

Jeg har benævnt den efter Herr Carl Sartorius, Eier af Hac. de Mirador, en ivrig Befordrer og Understøtter af mine videnskabelige Formaal i Mexico.

7. *Aerostichum (Olfersia) Schiedei Kze.* Anal. pterodogr. p. 10. Ej. Addit. enum. fil. Mex. in Linnaea XIII p. 130. Ej. fil. Leib. I. c. p. 309. Schlechtd. Linnaea v. 5 p. 605. Mart. & Gall. I. c. p. 23.

Hører til de mest udbredte Arter i Mexico. Jeg har tagget den paa hele den østlige Cordillere imellem 3 og 8000 Fods Höide; saaledes ved Mirador 3000'; omkring Byen Tiuzutlan og Indierlandsbyen Chinautla i Dep. Puebla paa 7—8000'. Dr. Schiede samlede den omkring Jalapa, 4500'; Galeotti i Depart. Oajaca ved Bjergverksstedet Yavesia 7—8000'. Den voxer saavel i Klipperifter som paa Træstammer, og fructificerer næsten hele Aaret igjennem. I Størrelse afvexler den fra 6 til 12 Tommer.

8. *Aerostichum (Olfersia) hybridum Bory.* Hook & Grev. icon. Fil. t. 21. Kze. fil. Leib. in Linnaea v. 18 p. 309.

Den voxer paa lodrette Fjeldvægge eller i Klippeklofter i den saakaldte tierra fria Region paa Mexicos østlige Cordillerer i en Höide af 6500—7000 Fod; saaledes ved Tiuzutlan, Chinautla i Dep. Puebla. Hr. Leibold har ogsaa fundet den, men Voxestedet angives ikke.

Form og Størrelse er den særdeles foranderlig; det sterile Löv opnaaer en Længde af over 20 Tommer, en Brede af 2½ T., men træffes ogsaa af 3—4 Tommers Længde; Lövets Form er aflang-lanceiformig spids i begge Enden, omvendt ægformig-lanceiformig, eller ren elliptisk. Mine Exemplarer fra Chinautla stemme til Punkt og Prikke med den Hooker-Grevilleske Figur.

Til denne Art henhører formodentlig *A. crinitum* Mart. & Gall. l. c. p. 25; i det mindste fremgaaer det, at Forfis. Plante ikke er den ægte Swartziske, da det hedder: frondes bipollicares ovato-ellipticæ, margine costa et stipite pilos longos setosos fuscos confertos gerentes, hvilket aldeles passer paa de nysnævnte smaae Exemplarer, men aldeles ikke paa *A. crinitum* Sw., som har hele Overfladen af Lövets For- og Bagside stivhaaret. Galeotiske Exemplarer ere ikke komne mig for Øje, hvis min Gisning er rigtig, findes *A. hybridum* ogsaa paa de lodrette Vægge af Baranken ved Zazuapan paa 2500—3000 Fods Höide.

9. *Aerostichum (Olfersia) nitidum* Liebm.:

fronde simplici coriacea, *sterili* 12—15 pollicari, stipite 5—6 pollices longo, lamina 8—10 pollices longa, 3—4 pollices lata, elliptica basi apiceque attenuata, apice acuto, margine incrassato calloso ciliis biserialibus patulis cinnamomeis dense obsito, utraque pagina nitida, anteriore obscure viridi, posteriore parum pallidiora, costa antice glabra canaliculata, postice prominente squamis setosis subulatis patulis cinnamomeis obsita, venis immersis tenuissimis patulis furcatis bifurcativis; stipite angulato compressiusculo marginato antice canaliculato bisulcato, postice convexo, pennam passerinam crasso, squamis patulis setosis obsito, basin versus sensim incrassato squamisque majoribus lanceolatis ciliatis fimbriatisve tenuissime membranaceis flavescentibus instructo; *fertili* non visa.

Rhizoma stuposum in fissuris rupium impressum paleaceum, paleis 3—4 lineas longis membranaceis undulato-crispatis lanceolatis flavescentibus.

Ikkun een Gang har jeg fundet denne smukke Bregne i Klöfter af Basaltvæggene, som danne den dybe Baranka i Nærheden af Indierlandsbyen Chinautla i Departementet Puebla paa henimod 7000 Fods Höide. Den voxer der selskabeligen sammen med *Acrostichum hybridum*, *Woodwordia radicans*, *Pteris aquilina*, overskygget af Buske, som henhøre til *Vaccinium*, *Rhamnus*, *Fuchsia microphylla* o. d.

I Karaktererne viser den megen Overensstemmelse med *A. hybridum*, men er dog derfra forskjellig ved sit bredere, mindre tilspidsede, mere læderagtige glindsende Löv, ved den listeformig fortykkede Rand, der er besat med to Rækker børsteformige Skjel, ved den kæltede noget flattrykte randede, fortil rendede og paa Siden af Middelrenden tofurede Stilk, endelig ved de store krusede hindeagtige Skjel, som bedække Rodstokken.

10. *Aerostichum (Olfersia) venustum* Liebm.:

cæspitosum subcoriaceum, fronde *sterili* 1—5 pollicari, stipite 2—3 pollices longo, lamina 2—2½ pollices longa, pollicem lata, ovata vel elongato ovala, acuminata, apice obtusiusculo, margine integro vel repando parum incrassato squamis setiformibus cinnamomeis patulis dense obsito, basi rotundata, interdum inæquilatero, parum decurrente, utraque

pagina squamis setiformibus subulatis cinnamomeis hic illuc notata, anteriori opaca glauco-viridi, posteriori pallidiori, costa utrimque prominente, venis utrimque prominulis obscuris patulis simplicibus furcatisve ad marginem excurrentibus, ibique clavato- vel capitellato-incrassatis; stipite filiformi sub laminam parum incrassato, flexuoso, sulcato, squamis subulatis cinnamomeis patulis imprimis apicem versus dense obsito; *fertili* sterilibus breviori, stipite 3 pollicari, lamina $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$ pollicem longa, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ pollicem lata ovata rotundata coriacea, pagina anteriori atroviridi, sporangiis fuscis.

Rhizoma cæspitosum stuposum horizontale, radiculis intricatis, rudimentis stipitum squamis castaneis nitidissimis lanceolatis dense obsitum.

Denne meget sirlige Bregne voxer i de dybe vulkanske Kløfter, som allevegne findes paa Pico de Orizaba, beklædende de lodrette Fjeldvægge eller indklemt i Klippe-spalter. Ligeledes finder man den paa de indre Vægge af smaa Klippehuler. Dens Region falder imellem 9—10,000 Fod, og man træffer den, naar man fra Vaqueria del Jacal voyer sig ned i de næsten utilgængelige uhyre vilde Barankas, som findes i Nord for denne Vulkanens øverste Menneskebolig. Den fructificerer rigelig i September.

A. Jamesonii Hook & Grev. ic. fil. t. 86 fra de peruanske Cordillerer er den nærmest staaende Art, men dog tilstrækkelig forskellig.

Om A. pumilum Mart. & Gal. l. c. p. 23 tab. 2 fig. 2 er en egen Art, eller identisk med A. venustum er umuligt at afgjøre efter den slette i alle Henseender usyldestjørende Beskrivelse; den raa Afbildung ligner aldeles ikke vor Plante. Forff. sammenligne deres Plante med A. piloselloides Presl., hvormed A. venustum ikke har ringeste Lighed.

11. ***Acrostichum (Olfersia) setosum* Liebm.:**

cæspitosum herbaceum, *fronde sterili* 5—7 pollicari, stipite 2—3 pollices longo, lamina 3—4 polices longa, 5—7 lineas lata elongato-lanceolata, utraque parte acuminata, apice obtusiuscula, opaca viridi, concolori, costa margine utraque pagina squamis setiformibus subulatis cinnamomeis patulis sparse obsitis, margine repanda, costa antice obsolete canaliculata, subtus applanata parum prominente, venis arcuato-patulis simplicibus furcatisve remotiusculis ante marginem apice punctiformi desinentibus, obscuris utraque pagina prominulis; stipite filiformi angulato sulcato, squamis setosis patulis obsito; *fertili* sterilibus duplo breviori, stipite 3 pollicari, lamina vix $\frac{3}{4}$ pollicem longa, 2—3 lineas latâ, lanceolata torta, pagina anteriore squamis castaneis lanceolatis sursum adpressis obsita, sporangiis fuscis.

Rhizoma breve horizontale dense fibrillosum, squamosum, radiculis villosis.

Den voxer i Klippeprækker i den dybe skyggefulde Baranca de Huitamalco i Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

Departementet Vera Cruz paa 2500—3000 Fods Höide, i Selskab med slyngende Philodendrer, tuedannende Piperaceer, krybende Selagineller, odl.

Denne Art kan let forvexes med *A. villosum* Sw., der hører til de mest foranderlige i Udsende, og hvoraf Kunze (Jvf. Fil. Poep. p. 31) har karakteriseret de tre mærkeligste Former. Jeg har kunnet sammenligne et Original-Exemplar af *A. villosum* Sw. i Vahls Herbarium med min Plante, hvoraf fremgaer, at *A. villosum* adskiller sig ved et til begge Sider mindre tilspidset Löv, ved større Haarrighed, længere Haar, tykkere Stilk, som er tydelig og dybt rendet fortil; mest dog ved det frugtbærende Löv, som er af samme Form som det golde.

12. *Acrostichum (Olfersia) vestitum Schldl.* Linn. v. 5 p. 605. Kze. fil. Leib. in Linnaea v. 18 p. 309. *A. fulvum* Mart. & Gal. l. c. p. 24, tab. 3, fig. 2.

Den voxer i Klippesprækker paa lodrette Fjeldvægge i Baranken ved Chinautla i Dep. Puebla paa 7000'; ligeledes paa Egetræer omkring S. Antonio de Huatusco (4500') Dep. Vera Cruz. Galeotti fandt den paa Östsiden af Vulkanen Orizaba uden at Höiden nærmere angives. Dr. Schiede fandt den paa Træer ved Jalapa (4500'); Leibold: in arboribus regionis temperatae.

Der er ikke den ringeste Tyvl om at *A. fulvum* Mart. & Gal. er identisk med den mange Aar tidligere beskrevne *A. vestitum* Schldl. Ubekjendtskab til eller Ligegyldighed for Litteraturen har bragt disse Forff. til at opstille som nye en Mængde Arter af den mexicanske Flora, som tidligere vare langt bedre beskrevne.

Naar Mart. & Gal. sammenligne denne Plante med *A. villosum* L. (skal være Sw.), beviser dette kun, hvor lidet de kjende de Planter, hvorom de tale. *A. vestitum* har slet ingen Affinitet til *A. villosum* Sw., men derimod en meget stor til *A. squamosum* Sw.

Forresten er denne Art meget foranderlig; mine Exemplarer ere af Størrelse fra 5 til 13 Tommer, Schlechtendal angiver den endog af 2—3 Fods Længde, men af denne Størrelse har jeg aldrig seet den; sædvanlig er Lövet lancetformigt jevnt tilspidset, paa nogle har Lövet sin største Brede under Spidsen, som pludselig afsmalner sig og fremtræder med en lang linieformig liniebred Spids af en Tommes Længde, hvorved en Tilmærmelse skeer til *A. cuspidatum* Wild.

13. *Acrostichum (Olfersia) rufescens Liebm.:*

cæspitosum coriaceum, fronde sterili 3—4 pollicari, stipite $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ pollices longo, lamina $1\frac{1}{2}$ —2 polices longa, 5—7 linea lata, elliptica, apice obtusa, basi attenuata sensim in stipitem decurrente, margine revoluta, pagina anteriore squamis adpressis detergibiliibus ellipticis laceris excoloribus rufescensibusve obsita costaque obsolete canaliculata, pagina posteriore strato denso lepidoto rufescente obducta costaque prominula sed squamis velata, venis immersis utraque pagina inconspicuis; stipite subtereti squamis castaneis variegatisve

membranaceis lanceolatis ciliatis obsito; *fertili* sterilibus æquante, margine non revoluto,* apice et basi obtusiori, costa paginæ posterioris squamis adpressis instructa, sporangii brunneis.

Rhizoma obliquum stuposum crassum squamis nigrantibus, rudimentis stipitum emortuorum, radiculis incrassatum.

Den voxer paa Vulkanen Orizaba i Fjeldklöfter, og paa Fjeldvægge i 10–11000 Fods Höide. Rigelig frugtbærende i September Maaned. A. Raddiana Hook & Grev. ic. fil. t. 4 fra Serra Estrelli i Brasilien, er den nærmest beslægtede Art, men forskjellig.

Om den i Martens & Galeottis Memoire omtalte *A. piloselloides* Presl. fra Sierra de Oajaca (8000), Cerro de la Virgen, Zocatepec skulde henhøre til denne Art kan jeg ikke afgjøre, da jeg ikke har seet Galeottiske Exemplarer, og Texten ingen Oplysning indeholder.

14. *Aerostichum (Olfersia) nanum* Liebm.:

coriaceum, fronde sterili $\frac{2}{3}$ ad pollicem longa, tota pilis rufis dense obsita, stipite 2–4 lineas longo, lamina 4–6 lineas longa, 3–4 lineas lata, ovata obtusa, basi parum in stipitem attenuata, margine integro, costa usque ad medianam laminam conspicua indeque evanescente, venis immersis inconspicuis, utraque pagina squamulis orbicularibus umbilicatis hyalinis obtecta; stipite marginato antice obsolete canaliculato postice convexo; fertili non visa.

Rhizoma filiforme horizontale flexuosum longe procurrent (10–12 pollicare), irregulariter ramosum, radicans, squamis rufis subadpressis subulatis obsitum.

Denne lille Bregne, hvis Löv neppe opnaer en Tommes Længde, hører til de faa eiendommelige fra Mexicos Vestside. Den findes krybende paa Egestammerne i Skovene paa de steile vestlige Cordillerer i Departementet Oajaca imellem Indierlandsbyerne S. Miguel Coatlan i Districtet Miahuatlan og La Galera i Districtet Pochutla paa 7–8000' Höide, og fandtes i October Maaned, destoværre uden Frugt.

15. *Aerostichum (Olfersia) peltatum* Sw. Schlechd. t. c. p. 605. Mart. & Gal. l. c. p. 26.

Denne velbekjendte Bregneart har en betydelig Udbredning i Mexico. Den kan ansees som eiendommelig for Østcordillerernes Egeregion imellem 3 og 5000 Fod, voxende i fugtige skyggefulde Skove paa gamle Træstammer, som blive ligesom overvævede af dens krybende Rodstok; ligeledes paa fugtige Klipper og löse Blokke, som forekomme i Skovbunden. Efter Galeotti skal den i Departementet Oajacas østlige Bjergkjeder stige höiere, og være almindelig i Regionen imellem 5 og 7500 Fod, hvilket jeg ikke kan bekræfte.

Dr. Schiede fandt den ved Jalapa (4500'), paa Cuesta grande de Chiconquiaco

*imellem Jalapa og Misantla. Galeotti fandt den ved Jalapa, S. Antonio Huatusco, Mirador, samt i Oajacas østlige Dele. Selv har jeg samlet den ved Mirador (3000'), Huatusco (4500'), i Baranca de Huitamalco, i Skovene omkring Teotalcingo i Dep. Oajacas District Chinantla (4000'). Den træffes i Frugt næsten hele Aaret rundt.

* **16. Acrostichum aureum L.** Schlecht. l. c. p. 605. Kunze Linnæa v. 18, p. 310.

Denne i det tropiske America saa udbredte Bregne, er i Mexico ciendommelig for de hedeste Strøg af den tropiske Østkyst, hvor den findes i Sumpe saavel af fersk som salt Vand. Dr. Schiede fandt den i Rhizophoreterne ved Tecoluta; jeg fandt den i ferske Sumpe ved Morro og Rancho nuevo i Dep. Vera Cruz paa Kysten mellem Antigua og Colipa; ligeledes ved den sumpige Bred af en Brakvands Lagune ved Ranchoen Laguna verde.

17. Acrostichum (Gymnopteris) hastatum Liebm.:

fronde sterili herbacea glabra 18—26 pollices longa, stipite 6—8 pollicari, lamina 10—15 pollices longa, 8—10 pollices lata, lato-lanceolata, longe acuminata, profunde pinnatifida, basi cuneata attenuata, laciniis infimis oppositis, dein alternis inæqualibus falcato-lanceolatis acuminatis acutis margine irregulariter repandis, inferioribus longioribus 8—9 pollices longis, 2 pollices latis, sursum sensim decrescentibus demum confluentibus, terminali longissima lanceolata acuminata, incisuris sinuatis rotundatis, costa primaria utriusque paginae prominente postice acuta glabra, costis secundariis lacinarum infimarum oppositis, dein alternis, venis ramosissimis prominulis tenuibus in areola hexagonoidea irregularia lateribus curvalis anostomosantibus, venulis e latere superiore et interno areolarum pendulis liberis rectis simplicibus vel pluries furcatis hamatis, apice clavato-incrassatis, interdum in areola rotundata confluentibus; colore frondis ultraque pagina opaco-viridi; stipite subterragono antice bisulcate, lateribus duabus planis, dorso acuto, basin versus squamis deciduis brunneis instructo; *fertili* subcoriacea sterilibus quoad laminam multo minori, stipite 12 pollicari, lamina 6 pollices longa, 5 pollices lata, trianguli-hastata acuminata pinnatifida, laciniis falcato-lanceolatis obtusiusculis, sursum decrescentibus demum confluentibus, terminali longe acuminata, basi inferiori decurrentibus, margine obsolete repandis, venulis antice prominulis, pagina anteriori atrovirenti, sporangiis rufis.

Denne mærkværdige Bregne, hvis Löv har nogen Lighed med en stor Polypodium, f. Ex. P. Phymatodes eller P. aureum, og som med Hensyn til sin oven beskrevne Veneforgrening henhører til den presl'ske Slægt Gymnopteris, stiller sig sammen med den efterfølgende Art i en naturlig Gruppe, hvoraf ingen tidligere vare bekjendte fra Mexico. Bregnen har jeg kun fundet een Gang, og den hører upaatvivlelig til de allersjeldneste i Mexico. Den voxer i en dyb uhyre planterig Baranka ved Arroyo de Isapa paa Hacienda

de Jovo i Nærheden af Sta Maria Tlapacoy i Dep. Vera Cruz i den subtropiske Region paa henimod 1800—2000 Fods Höide. Fandtes i Frugt i Mai Maaned.

Kun faa Exemplarer ere reddede af Indholdet af en Kiste tørrede Planter, som paa Kystfarten fra Mundingen af Tecoluta Floden til Vera Cruz var bleven beskadiget af Fugtighed. Det er saameget beklageligt, som den indeholdt en stor Mængde af de markeligste Plante-Opdagelser.

18. *Acrostichum (Gymnopteris) irregularare Liebm.:*

fronde sterili $2\frac{1}{2}$ pedali, stipite 8—12 pollices longo, lamina 20 pollices longa, 10—12 pollices lata, herbacea, pinnata apicem versus pinnatifida lato-lanceolata acuminata glabra, pinnis alternis, infimis brevipetiolatis sursum sessilibus; infimo pinnarum pari ceteris dispari, 7 pollices longo, 6 pollices ad basin lato, irregulariter pinnatifido, triangulato-falcato acuminato acuto, basi oblique cuneato, latere superiori irregulariter repando-sinuato margine hic illuc denticulato, latere inferiore falcato-pinnatifido, lacinia infima ceteris longe superante falcato-lanceolata, 4—5 pollices longa, pollicem lata acuminata acuta irregulariter denticulata, laciiniis ceteris subito decrescentibus falcato-rotundatis obtusis denticulatis; pinnis insequentibus lanceolatis subfalcatis acuminatis, 7 pollices longis, $1\frac{1}{3}$ pollices latis, latere inferiori rotundato-laciinito, magis inciso ac latere superiori, sinibus acutis sursum decrescentibus, latere superiore irregulariter repandis; pinnis superioribns dein sessilibus ad basin inferiorem decurrentibus; summis demum confluentibus et solumnodo pinnatifido-incisis acuminatis acutis denticulatis; costis pinnarum utraque pagina prominentibus, venis costaformibus pinnatis ante marginem solutis, venuisque secundariis e latere superiore et interno areolarum pendulis hamatis furcatis dichotomise apice clavato-incrassatis vel in areola rotundata confluentibus; stipite et rhachide postice acutis antice 4 sulcatis glbris; *fertili* subcoriacea $2\frac{1}{2}$ —3 pedali, stipite 20—24 pollices longo, lamina 8—11 pollices longa, 6—7 pollices lata, pinnata, pinnis irregularibus suboppositis, infimis brevipetiolatis linearilanceolatis inaequilateris latere inferiori basin versus laciiniis 1—2 falcatis obtusis instructis; mediis sessilibus linearilanceolatis parum curvatis obsolete repandis acutis, superioribus basi inferiore decurrentibus connatis; terminali longe acuminata margine reponda.

Color pinnarum sterilium utraque pagina concolor obscure viridis subopacus, fertili antice atrovirens opacus.

Der gives vist faa Bregner, som ere saa uregelmæssige i de forskjellige Deles Form, som denne; denne Uregelmæssighed nødvendiggjør og undskylder ovenstaaende vidtlöftige Beskrivelse.

Ikkun een Gang har jeg samlet denne Bregne, som voxer paa de trachytiske næsten lodrette Klippesider af Baranca de Sta Maria Tlatellá (Dep. Vera Cruz) i Nærheden

af det saakaldte Fortin, en gammel indiansk Befæstning. Den findes især ned imod Bunden af Baranken, og jeg ansætter dens Höideregion til 15—1800'. Denne Baranka er utilgjængelig, med mindre man er forsynet med Lasoer for at fire sig ned over de steileste Fjeldvægge. I Januar Maaned fructificerer den.

Naar man tager Hensyn til Nervationen, da henhører denne Art til Anapausia Presl, Underslagt af Gymnopteris, af hvilken, saavidt jeg veed, ikun to americanske Arter hidtil vare kjendte: A. nicotianæfolia og acuminata, og hvortil nu denne kommer som den tredie. Det frugtbærende Löv har ikke ringe Lighed med efterfølgende Art, hvis Veneforgrening dog er aldeles forskjellig.

19. *Aerostichum (Poecilopteris) umbrosum Liebm.:*

fronde sterili herbacea glabra $2\frac{1}{2}$ pedali, stipite 14—16 pollicari, lamina 14—16 pollices longa, 12 pollices lata, lato-lanceolata acuminata, basi pinnato-bipinnatifida, superne bipinnatifida; pinnis infimis suboppositis 6—8 poll. long., 4—5 poll. lat., elongato-deltoides inaequilateris, brevipetiolatis, petiolis basi dilatatis, basi oblique cuneatis in petiolum decurrentibus, patulis acuminatis acutis, latere superiori profunde pinnatifidis, lacinias inaequilongis falcato-lanceolatis obtusiusculis denticulatis, sinibus rotundatis denticulo uno alterove instructis, latere inferiori profundius incisis, lacinias infimis longioribus 2—3 pollicaribus rotundato-runcinatis denticulatis acuminatis acutis, insequentibus repandis acutis, ultimis falcato-lanceolatis obtusis denticulatis; penultimo pari pinnarum sessili elongato-lanceolato profunde pinnatifido; insequentibus sursum alternis sessilibus basi inferiori decurrentibus; ultimis sensim confluentibus; costis costulisque pinnarum laciniarumque utraque pagina prominentibus acutis, costis postice hic illuc squama lanceolata fusca instructis, venulis prominulis in areola irregulariter angulata anastomosantibus hinc inde venulam secundariam liberam apice clavato-incrassato emittentibus, infimis in arcum transversum elongatum rotundato-obtusissimum 4—5—6 angulatum anastomosantibus; utraque pagina concolori obscure viridi opaca; stipite rhachique antice 4 sulcatis, postice acutis striatis, stipite basin versus hic illuc squamis deciduis obsito.

Fertili dispari bipedali, lamina 10 pollices longa, 5—6 pollices lata, pinnato-pinnatifida, sursum pinnatifida elongato-lanceolata acutiuscula, pinnis inferioribus brevipetiolatis inaequilateris elongato-deltoides subfalcatis obtusis pinnatifidis, lacinias inaequilongis rotundatis obtusis obsolete repandis; pinnis mediis sessilibus adnatis basi inferiori decurrentibus horizontalibus rectis rotundato-repandis obtusis; superioribus sensim confluentibus decurrentibus subintegris lanceolatis rectis vel subrecurvatis, pagina anteriore atrovirente, sporangiis fuscis.

Rhizoma subterraneum breve carnosum radiculis numerosis validioribus ramosis fuscis emittens.

Denne prægtige, hidtil af alle i Mexico reisende Botanikere upaaagtede Art, voxer i de dybe, vanskelig tilgjængelige Baranker i Nærheden af Plantagen Mirador i Departementet Vera Cruz paa 2000—2500 Fods Höide. Man finder den paa de steile fugtige stærkt overskyggede Klippevægge voxende i det der afleirede tynde Muldbag, ligeledes imellem Klippeblokke, som ere sammenstyrtede i det af tusinde smaa Vandfald bestaaende Vanddrag, som altid betegner Bunden af disse dybe vulkanske Svælg, hvor Tropenaturens bugnende Planterigdom udfolder sig i den mest forbausende Pragi. I Baranca de S. Francisco, Baranca de Consoquilla, Baranca de Sta Maria Tlatetla, alle i Nærheden af Mirador, hører denne skyggeelskende Bregne til de almindeligste. Den bærer Frugt fra October til Februar.

Af den presl'ske Slægt *Poecilopteris* ere hidtil meget faa Arter fundne i America, hvorimod de fleste bekjendte ere fra Java og Sydhavsöerne. Dens nærmest beslægtede Art synes at være *A. brunneum* W. fra Ny-Granada.

20. *Aerostichum (Polybotrya) cervinum* Sw. Syn. fil. p. 14. *Polybotrya cervina* Kaulf. Hook & Grev. ic. fil. t. 81. *Olfersia cervina* Presl.

Denne smukke Bregne er ikke tidligere kjendt fra Americas Fastland, men ikkun fra de vestindiske Øer. Den findes i dybe skyggefylde shovfulde Kløfter paa Mexicos Østside, i Regionen imellem 1000—2000 Fods Höide, voxende i sort fugtig Muldjord; saaledes i Baranca de la Hacienda de Jovo ved Arroyo de Isapa, i Baranca de Huitamalco, begge i Dep. Vera Cruz. I Mai Maaned findes den med Frugt.

Tvivlsomme Arter.

Foruden de nævnte anføres af Forfatterne adskillige Arter fra Mexico, som jeg af forskjellige Grunde maa ansæ deels som tvivlsomme, deels som urigtig bestemte, uden at man dog kan vide, hvilke Arter have foreligget. De anføres derfor her, men uden Nummer.

***Aerostichum simplex* Sw. (?) Mart. & Gal. l. c. p. 21. *Kunze fil. Leib. Linnæa* v. 18 p. 309.**

Mirador (3000'), Llano verde i Oajaca (7000') Galeotti; i den tempererte Region, Leibold. Jfr. Bemærkningen til A. Lingya p. 166.

***Aerostichum muscosum* Sw. (?) Mart. & Gal. l. c. p. 22.**

Pico de Orizaba (9500—11000').

Sandsynligvis have vi her med en falsk Bestemmelse at gjøre. Forff. kalde deres

Plante A. muscosum W., men en saadan existerer ikke, derimod gives der en A. muscosum Sw., som findes paa Jamaica, og som Kunze med Tivli anfører fra den peruvianske Skov-region ved Pampayaco (Kze fil. Poep. l. c. p. 29). At denne samme Art skulde findes i den betydelige Höide af inttil 11000' paa Orizaba forekommer mig utroligt. Jeg har intet Spor af en saadan seet paa Vulkanen, hvor jeg har opholdt mig omtrent til samme Aarstid som Hr. Galeotti, og i længere Tid. Den eneste Bregne, jeg i den angivne Höide fandt voxende paa Egene var *Polypodium lepidopteris*.

Allene Besidderne af Galeottis solgte Samlinger Nr. 6265 kunne give Oplysning i denne Sag.

***Aerostichum piloselloides Presl*(?) Mart. & Gal. l. c. p. 22.**

Sierra de Oajaca (8000'), Cerro de la Virgen, Zocatepec, paa Ege, Laurns persea, Myrtineer; ligeledes ved Vandfaldet Tzaracua paa Basallklipper, paa Lava ved Uruapan, Obsidianklipper ved Guadalajara, paa Træer og Kalkgrund ved Arumbaro og Tzitzio; dens Region falder imellem 3000—8000'.

Efter disse Angivelser synes denne Art altsaa at høre til de mest udbredte i Mexico; desuagtet har jeg ikke truffet nogen Bregne, jeg med mindste Rimelighed kunde henføre til *A. piloselloides* Presl. Da Forff. ikke give anden Oplysning end ovenstaende Stedangivelser, maa jeg lade det henstaae, om de i Collect. H. Galeotti uddelte Nummere 6272, 6355 og 6434 ere rigtig bestemte eller ei. Jfr. Anmærkning til *A. rufescens* p. 171.

***Aerostichum pumilum Mart. & Gal.* l. c. p. 23 tab. 2 fig. 2.**

Pico de Orizaba (9—12000').

Intet lader sig afgjøre af en saadan Beskrivelse og en saadan Afbildung, som Forff. give. Jfr. Bemærkningen til *A. venustum* p. 169.

***Aerostichum citrifolium* (L.?) Mart. & Gal. l. c. p. 25.**

Medellin paa Stammer af *Castilloa elastica*, Sapoteer etc.

Idet Forff. citere Plumier fil. t. 116, tager jeg ikke i Betænkning at erklaære, at den Plante, som voxer ved Medellin paa de store Skovtræer, ligesom langs hele Mexicos tropiske Østkyst i Kystskovene, er en krybende Bregne, som sjeldent traffes fructificerende, og som godt har megen habituel Lighed med den citerede Figur, men som er saa langt fra at være den ægte Linneiske Plante, at det meget mere er — *Polypodium lycopodioides* L.!, og som slet ikke er omtalt i Forff. Memoire.

***Aerostichum erinatum* Sw.(?) Mart. & Gal. p. 25.**

Hacienda de Zazuapan i Klippesprækker. Urigtig Bestemmelse, jfr. Bemærkning til *A. hybridum* p. 168.

***Aerostichum squamosum* (Sw.) Nees ab Esenb. i Linnaea v. 19 p. 682.**

Sendt af Aschenborn fra Mexico uden Stedangivelse. Mon rigtig bestemt?

Mon det ikke snarere skulde være *A. vestitum*, som her har foreligget?

Hemionitis L.

1. Hemionitis palmata L. Plum. fil. t. 151.

Voxer selskabeligen i Klippekløfter og under Steen i fugtige Enge i Nærheden af en lille Flod imellem Colipa og Misantla ved en Sukkermølle paa omrent 800—1000 Fods Höide; ligeledes paa Klipper i Bundens af Dalen imellem Trapiche de la Concepcion og Zapotekbyen Comaltepec (Dep. Oajaca, Districtet Chuapam) i Nærheden af en lille Flod, som strømmer til Alvarado, paa 2500—3000' Höide. Den findes i Frugt i April og Juli. Tidligere ikke kjendt fra Mexico, som overhovedet fra Americas Fastland.

Antrophyum Kaulf.

1. Antrophyum (Loxogramma) discoideum Kze. Bot. Zeitg. 1848, p. 702. A. falcatum Mart. & Gal. I. c. p. 49. tab. 12 (pessima!)

Da der allerede findes en Antroph. falcatum Blume er det nødvendigt at forandre Navnet, som Martens og Galeotti have givet. Desuden er det dog et Spørgsmaal, som fortjener at tages under alvorlig Overveielse af Botanikerne, om en hvilkensomhelst Diagnose, selv den allersletteste og ukjendeligste, skal kunne hævde Forfatternes Ret til Artens Benævnelse for hele Eftertiden, Ret til at figurere som Autoritet for Arter, som de ikke have sørget for at indføre i Videnskaben paa en saadan Maade, at Videnskaben med Nytté kan tilegne sig deres Arbeide. Fortjenesten ved at have opstillet en ny Art bliver dog mere end mislig, naar det bliver Efterkommernes Sag at rette Feil, at udføre det af Forf. forsømte nødvendige videnskabelige Arbeide, kort sagt, at sørge for at skaffe Arten en virkelig videnskabelig Begrundelse. Denne Bemærkning finder jeg Anledning til at gjøre ved at see den overfladiske Maade, hvorpaa de ovenciterede Forff. opstille falske Arter, opkalde andre ved Navne, som forlængst ere optagne af andre Forfattere, endelig give Beskrivelser, som for det meste ere ukjendelige og fulde af Urigtheder. Vel medgives en Del Afbildninger, men disse ere yderst ufuldstændigende — raa, stundom falske Conturer, ingen, eller unøjagtig Angivelse af den rigtige Nervation, eller andre Analyser. Man eftersee Beskrivelsen af A. falcatum (I. c.) og Afbildningen, og man vil ikke undres over denne Dadel.

Uagtet jeg allerede i Marts Maaned 1848 havde udkastet en nøjagtig Beskrivelse af denne Art i nærværende Afhandling, som fuldendtes i Sommerens Löb, og fremlagdes i Videnskabernes Selskabs første Møde i November Maaned, er Prof. Kunze kommen mig i Forkjøbet med sin trykte Beskrivelse i Botanische Zeitung af 6te October 1848, og jeg

udsletter derfor gjerne min Benævnelse og Beskrivelse, sættende Kunzes Navn isteden, henvisende til hans fortrinlige Beskrivelse.

Den voxer snyltende paa gamle Træstammer i Bunden af den dybe fugtige skov-dækte Baranka ved Huitamalco i Dep. Vera Cruz paa omtrent 2500 Fods Höide; ligeledes funden paa Laurineer og Artocarpe i Baranken ved Arroyo de Isapa paa Hacienda de Jovo paa 15—1800 Fods Höide.

Galeotti fandt den i Depart. Oajaca's District Villa alta paa Egene i Llano verde (7000'), hvilken Angivelse forekommer mig noget paafaldende efter de andre Höideforhold, hvorfra Arten er mig bekjendt. I Mai og Juni er den i Frugt.

2. *Antrophyum (Loxogramma) ensiforme Hook.* i Plantæ Hartwegianæ p. 73 n. 522. Ej. ic. plant. t. 394. Kze bot. Zeit. I. c. p. 704.

Denne mig ubekjendte Art er af Hartweg funden snyltende paa Traer paa Bjerg-höider over Totontepec i Districtet Chuapam i Dep. Oajaca. Höideangivelsen af 10,000 Fod er efter mit Kjendskab til Stedforholdene i det mindste sat et Par Tusinde Fod for höit. Arten nærmer sig efter Beskrivelsen at dömme i flere Henseender til foregaaende, men er dog tilstrækkelig forskjellig.

3. *Antrophyum lanceolatum Kaulf.* Schlechd. Linnaea v. 5 p. 613.

Henhører til den mexicanske Östsides subtropiske og tempererte Region imellem 2 og 5000' Höide. Jeg fandt den parasitisk paa Egene i Skovene omkring Hacienda de Mirador, fructificerende i Juli Maaned; ligeledes i Skovkløfter paa Hac. de Jovo i Nærheden af Tlapacoyo paa Trophis, Ficus, etc., frugtös i Mai.

Dr. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco.

4. *Antrophyum (Polytaenium) lineatum Kaulf.* Kze. fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 337. Vittaria lanceolata Sw. neue Schrift. d. Gesell. z. Berlin II. t. 7 f. 2. Schk. Farrn. t. 101 b.

Findes i Skovene paa Cordillerernes östlige Skraaning i Egenes nedre Region, saaledes paa Ege omkring Hac. de Mirador (3000'). Leibold fandt ligeledes Bregnene, men hans Exemplarer have ingen anden Stedangivelse end den ubestemte Reg. temp.

Den findes i Frugt næsten hele Aaret igennem; jeg har samlet den i Mai, August og November.

Den er meget foranderlig baade i Længde og Brede, fra halvanden Linies til en Tommes Brede, fra 5 til 10 Tommers Længde; Antallet af de parallele linieformig fortløbende Frugthobe afhænger af Breden, fra 1 til 4 paa hver Side af Middelaaren.

Tænitis Sw.

1. **Tænitis angustifolia Sprl.** Syst. veg. 4 p. 42. Kze fil. Leibd. l. c. p. 323.
Pteris angustifolia Sw. Pteropsis angustifolia Desv. Presl. Pteridgr. t. 10 f. 3.

Jeg fandt den voxende selskabelig paa Trachytklipper over et lille Vandfald ved Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca sammen med Polypodium angustifolium Sw. Af Leibold er den funden paa Træer i Mexicos tempererte Region.

Anm. Tænitis linearis Mart. & Gal. l. c. p. 44 = Vittaria graminifolia Kaulf.

Gymnogramme Desv.

1. **Gymnogramme pedata Kaulf.** Kze Addit. l. c. p. 130. Kze fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 310. Mart. & Gal. l. c. p. 26. Sw. Syn. fil. t. 1 fig. 3.

Denne Art er meget udbredt i Mexico, baade i den østlige, vestlige og centrale Deel. Man finder den især paa fugtige Klipper i Regionen imellem 2500—4500'. Jeg fandt den paa fugtige Trachytvægge ved Indierhyen Comaltepec i Dep. Oajacas østlige Deel paa henimod 2500 Fods Höide. C. Ehrenberg sendte den fra Temascaltepec; Andrieux fandt den paa Cerro de S. Felipe. Galeotti tog den i Lavahuller ved Uruapan ved den østlige Fod af Pico de Tancitaro i Michoacan (3500—4500').

Var. β palmata Kze. Addit. l. c. p. 130, paa Klipper i Baranca de Tioselo funden af Schiede.

2. **Gymnogramme trifoliata Desv.** Kze Addit. l. c. p. 131. Presl. Rel. Hæk. 1 p. 17. Schk. Farrn. t. 3.

Dette er en Sump- eller Grøft-Bregne, som i Mexico hører til Sjeldenhederne. Jeg fandt den imellem el Ingenio og Aculzingo (5—6000') i og ved Grøfter langs Landevejen, voxende imellem Typha, Cyperus, Mariscus, Krat af Mimoser, Taxodium distichum, Budleja, o. dl.; ligedeles i Dep. Oajaca Districtet Chuapam ved Trapiche de la Concepcion ved Flodbredten. — Imellem Hækkes Samlinger findes den uden nærmere Angivelse end den urigtige: in montanis Mexicanis.

- 3. Gymnogramme tartarea Desv.** Schldl. Linnæa. v. 5 p. 605. Kze Addit. l. c. p. 131.
Ej. fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 310. G. dealbata Link. hort. Berol. 2 p. 52. Mart.
& Gal. l. c. p. 28. Willd. h. Berol. t. 40. H. B. K. Syn. 1 p. 69.

Findes paa tørre Klipper i Kløfter i den subtropiske og tempererte Region baade paa Cordillerernes østlige Heldning og i Central-Cordillererne fra 2000 til 5000' Höide. Jeg fandt den paa Kalkklipper ved Huitamalco, ved Mirador, ved Consoquitla; imellem Hac. de Sta Gertrudes og Talea i Dep. Oajaca. Galeotti angiver den fra Jalapa, Gilotepec og Puente nacional. Schiede fandt pen paa Skrænter ved Jalapa, og C. Ehrenberg paa Porphyrlipper af Cuesta blanca. Humboldt og Bonpland fandt den ved Guanaxuato paa 1200 Toisers Höide.

- 4. Gymnogramme peruviana Desv.** Link. hort. Berol. 2. p. 53. Kze Farrn. t. 32.
G. dealbata Presl. Ceropteris peruviana Link. Fil. spec. h. Berol. p. 142.

Den var ikke tidligere kjendt fra Mexico, eller er muligen bleven forvexlet med den foregaaende nærbeslægtede Art. Den findes paa tørre Klipper i samme Region som foregaaende; ved Mirador (3000'), paa Syenitklipper ved Sølvværket Castresana tæt ved St. Pedro Nolasco i Dep. Oajaca, Districtet Ixtlan (7000').

- 5. Gymnogramme Calomelanos Kaufl.** Schlecht. l. c. p. 606. Kze Addit. l. c. p. 131.
Bentham pl. Hartweg. p. 97. Langsd. & Fisch. fil. t. 3. H.B.K. Syn. 1 p. 67.

Voxer paa tørre Klipper, paa Leerbanker paa Hac. de Jovo ved Tlapacoyo; ved Teotalcingo i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca (5000'). Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco, paa Hac. de la Laguna og paa Mexicos Vestside paa Vulkanen Jorullo. I plantæ Hartwegianæ angives den i montibus Mixco, en Stedangivelse som er mig ubekjendt. Humboldt og Bonpland ved Guanaxuato (1200 Toiser).

- 6. Gymnogramme leptophylla Desv.** Kze fil. Leibd. Linnæa. v. 18. p. 310. Hook.
& Grev. ic. fil. t. 25. G. lept. var. mexicana Mart. & Gal. l. c. p. 27.

Galeotti fandt den paa Klipper ved Mirador, Huatusco, Orizaba (2500–4000'); Leibold sendte den fra samme Steder, Hegewisch fra Angangueo; mig er denne lille Bregne ikke kommen for Øie i Mexico.

- 7. Gymnogramme Linkiana Kze.** fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 310. G. polypodioides
Link. h. Berol. 2 p. 50. G. Totta (non Schldl.) Mart. & Gal. l. c. p. 26.

Voxer i fugtige skyggefulde Skove i dybe Baranker i den varm tempererte

Region imellem 2—3000'; saaledes i Baranken ved Arroyo de Isapa paa Hac. de Jovo, i Skovene omkring Hac. de Mirador, og i de forskjellige Baranker, som omgive denne Plantage. Leibolds Exemplarer betegnes blot med reg. temp. Galeotti angiver den ogsaa fra Mirador. Den findes i Frugt i Mai, August og Februar, sandsynligviis hele Aaret rundt.

Det er udenfor al Tivl at den af Martens og Galeotti for G. Totta Schlechd. bestemte Plante hører til denne Art, og ikkun ved en aldeles overfladisk Undersøgelse har kunnet modtage hin Bestemmelse, da baade Schlechtendals Beskrivelse og gode Afbildning i Adumbrationes filicum t. 6, den lille Afbildning i Presl's Pteridographie t. 9 fig 4, og endelig G. Lovei Hook. & Grev. ic. fil. t. 89, som ansees for Synonym til G. Totta, maatte kunne vise Forff. talrige Uoverensstemmelser imellem begge.

Mine Exemplarer ere meget foranderlige i Størrelse fra $\frac{2}{3}$ til 3 Fod.

8. Gymnogramme polypodioides Sprl. Kze fil. Leibd. Linnaea. v. 18 p. 310.

Findes i de hede fugtige skyggefulde Skove omkring Colipa, hvor den fandtes i Frugt i April. Et eneste usfuldkomment Exemplar er sendt af Leibold med Paaskrift in reg. temp.

9. Gymnogramme pilosa Mart. & Gal. I. c. p. 27. t. 4 fig 1 (bona).

En Art, som tilhører de koldere Fjeldregioner, hvor den voxer i Skovene under Fyrre og Ege. Paa Bjergene i Nærheden af Chinautla paa Klippeaasen Tepeyecuapa's Sider (8000'). Galeotti fandt den paa Pico de Orizaba paa 9—10500' Höide.

Det vil ikke ansees for overflodigt at jeg her giver en ny Beskrivelse af Arten, da Forff.'s ikke i alle Punkter er fyldestgjørende.

Frons 8—10 pollicaris, stipite 5—6 pollices longo, lamina 4—6 pollices longa, 1½ poll. lata, ovato-lanceolata pinnato-pinnatifida, sursum bipinnatifida, demum confluente pinnatifida; pinnis infimis alternis suboppositisve patulis $\frac{2}{3}$ poll. longis, 4 lineas latis elongato-ovatis sessilibus breviaminatis obtusiusculis grosse crenatis (vel falcato-pinnatifidis), crenis obtusiusculis, basi superiori auriculatis; pinnis mediis alternis adnatis, basi inferiori subdecurrentibus, superiori auriculatis, falcato-lanceolatis, grosse crenatis; sursum sensim magis magisque confluentibus et decrescentibus, summis integris falcato-lanceolatis; costa pinnarum, venis utrinque, margine incrassato parum revoluto pilosis, venis flexuosis pinnatis, venulis excurrentibus incurvatis; soris dorso venularum insidentibus brevibus maculæformibus irregularibus, sporangiis castaneis; stipite rhachique molliter pilosis postice convexis antice canaliculatis.

Grammitis Sw.

(?) Grammitis elongata (Sw.) Mart. & Gal. l. c. p. 28. (Coll. H. Gal. no. 6264, 6328, 6421.

Paa gamle Ege ved Jalapa (4—5000'), paa Ege og Kalkbjerge ved Yavesia i Dep. Oajaca (6500—8000'), i Mistece paa Ege (7—8000') Gall.

Jeg frygter for at en betydelig Feiltagelse ligger til Grund for denne Angivelse, og at det enten er golde korte bredløvede Exemplarer af *Polypodium angustifolium* Sw., som ere blevne bestemte for denne Grammitis, hvormed de vel have nogen habituel Lighed, men dog lettelig kunne adskilles fra ved Nervationen; eller ogsaa, og det synes mig rimeligt, er det *Polyp. (Pleopeltis) lepidotum* W., som er bleven forvexlet med denne. Da jeg ikke har seet Galeottiske Exemplarer, maa jeg anføre Grundene til min Mistanke og Formodning. *Grammitis elongata* Sw. er hidtil kun kjendt fra de vestindiske Öer Jamaica og Cuba; ingen Botaniker før eller efter Galeotti har fundet den i Mexico, og dog angiver han den som meget udbredt i dette Land. Man vil lægge Mærke til at *Galeottis* Plante fornemmelig findes i de höiere og koldere Bjergregioner (7—8000), medens den vestindiske Bregne findes paa Cubas hede Layland eller paa Jamaicas ikke höie Bjerge. Fremdeles seer man (l. c. p. 29) Galeotti hensætte *Polyp. angustifolium* Sw. til den tempererte Region imellem 2—4500', og alene nævne den fra Omegnen af Plantagen Mirador, uagtet denne Art netop har sin sterkeste Udbredning i Regionen imellem 7—8000 Fod, hvor den udfolder sig baade i Længde og Brede langt betydeligere end paa dens nedre Grændse ved Mirador. *P. lepidotum* W., som er sædeles almindelig i den samme Region paa Egene, findes slet ikke angiven i Mart. & Galeottis Memoire. De noget aflange Sori hos denne Art kunne vel forlede til Miskjendelse af Slægten, men tillörlig Hensyu til Nervationen, som vel er indsænket i det læderagtige Löv, men som bliver tydelig efter nogen Tids Opblödning og ved gjennemfaldende Lys, vil lettelig kunne forebygge denne.

Xiphopteris Kaulf.

1. Xiphopteris serrulata Kaulf. Mart. & Gal. l. c. p. 29. Kze fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 311. *Grammitis serrulata* L. Schk. Farn. t. 7.

Den hører til Mexicos almindeligere Bregner, voxende parasitisk paa Stammer især af Ege i den tempererte Region imellem 3—4500'; saaledes i Skovene omkring Mirador, i de fugtige Skove ved Aguas santas imellem Mirador og Totulla, ved Dos puentes imellem Totulla og Huatusco; ligeledes omkring Lobani i Dep. Oajacas østlige District Chinantla.

Galeottis Angivelse (l. c.) at den skulde høre til tierra fria Regionen, og navnlig

forekomme paa Pico de Orizaba imellem 9500—10000 Fods Höide, maa jeg paa det bestemteste benægte. Enten maa den gamle velbekjendte Art ikke have været kjendt af Forff., hvilket dog skulde synes uantageligt, eller ogsaa maa en Forbyttelse af Etiqueter have givet Anledning til den urigtige Angivelse. Den udbredte Bregnes Stationer i andre americanske Lande modstrider ogsaa aldeles dens Forekomst paa 10,000 Fods Höide paa Orizaba.

2. *Xiphopteris myosuroides* Kaulf. Kze Addit. Linnæa v. 13 p. 131, Mart. & Gal. l. c. p. 29. Schk. Farrn. t. 7.

Dr. Schiede fandt den paa gamle Træstammer ved Jalapa i Mai; Galeotti anfører den fra Llano verde i Oajaca paa 7000' Höide; mig er denne lille Bregne ikke forekommet.

Meniscium Schreb.

1. *Meniscium sorbifolium* Willd. Langds. & Fisch. fil. t. 4!

Denne hidtil ikkun fra Martinique og Brasilien kjendte smukke Bregne voxer i fugtige skyggefulde Urskove paa Bjergheldningerne imellem Lacoba og Jocotepec i Districtet Chinantla Dep. Oajaca imellem 2500—3000' Höide. Mine mexikanske Exemplarer afvige ikke det mindste fra den citerede Figur.

2. *Meniscium falcatum* Liebm.:

fronde 5—6 pedali oblonga coriacea glabra pinnata, pinnis alternis numerosis (35—40) linear-lanceolatis falcatis longe acuminatis acutis undulato-repandis marginatis basi oblique cuneatis in petiolos breves (infimarum subpollicares) attenuatis; infimis longioribus 15—16 pollices longis 1½—1½ poll. latis; superioribus sensim brevioribus, summis 8—9 poll. longis pollicem latis, terminali parum evoluta linear-lanceolata inaequilatera 4 poll. long., ¼ poll. lata; costis pinnarum utrinque prominentibus, antice canaliculatis, postice convexis, glaberrimus, flavescentibus; venis omnino M. sorbifolii sed crassioribus magis distantibus utrinque prominulis flavescentibus; soris dorso venularum transversalium insidentibus maculeformibus nunquam confluentibus; stipite vix pedali una cum rhachi glaberrima nitida, basin versus pennam anserinam crasso subtetragono, antice canaliculato, lateribus adplanatis vel concavis, dorso convexo.

Rhizoma breve subterraneum crassum.

Dette er upaatvivleligen en af de meest udmarkede Arter af denne ikke artige Slægt. Jeg opdagede den i de varme fugtige Urskove omkring Indierlandsbyen Lacoba i Districtet Chinantla, Dep. Oajaca, paa 2000—2500' Höide. Den bærer Frugt i Juni og Juli.

Polypodium L.

Denne gamle og store Slægt har de nyere Bregneforskere forsøgt at dele i flere Slægter eller Underslägter, følgende forskjellige Principer. Bory de St. Vincent tog Hensyn til Fordelingen af Sori, Lövets Beklædning og Deling, og udskilte derefter flere Slægter fra Polypodium. Gaudichaud inddelte Slægten i flere Hoved- og Underafdelinger efter Lövets Beskaffenhed, uden at dog Charakterer angaves for Afdelingerne. Kaulfuss var den første, som tog Hensyn til Nervationen (Wesen der Farrnkräuter p. 88) som Moment for Slægtens Systematik, men tillagde dog dette Forhold underordnet Vægt. Blume (Flora Javae) inddelte Slægten Polypodium i to Hovedafdelinger: P. vera og P. spuria efter Nervationen, og disse efter i 4 Afdelinger hver, for hvilke Nervationens særlige Beskaffenhed og Frugtforholdene ligge til Grund. Presl opstiller i Tentamen pteridographiae et Tribus Polypodiaceæ, som inddelles i 3 Sectioner og 15 Slægter, ved hvis Begrænsning allene Hensyn tages til Nervationen.

Frugthobenes Forhold afhænger som bekjendt hos Bregnerne aldeles af Nerverne; derfor tillægger man med Rette Nervationen særdeles Vigtighed i systematisk Henseende. Hvor Frugtorganerne afgive systematiske Momenter, der træde disse naturligvis ogsaa i første Række. I den følgende Fremstilling af Mexicos talrige Polypodia benytter jeg som Underslägter fornemmelig blumeske og presl'ske Afdelinger, da disse forekomme mig baade lettest opfattelige og bedst begrundede i Naturen.

A. *Pleopeltis H.B.* venis tenuibus in areola irregularia anastomosantibus, interne venulas aut breves furcatas liberas aut anastomosantes emittentibus; soris globosis magnis ad apicem duarum plurimarumque venularum convergentium affixis.

1. *Polypodium lepidotum Willd.* Schlechtd. adumb. t. 8. Ej. Linnaea v. 5 p. 606.
Kze fl. Leibd. Linnaea v. 18 p. 314.

Den findes paa gamle Stammer fornemmelig af Ege i den tempererte og kolde Cordillere-Region. Jeg fandt den imellem St. Antonio Huatusco og Foden af Vulkanen Ori-zaba i September; paa Ege ved Sta Maria Alpatlahua paa Siden af Vulkanen paa 7500'; omkring og over Chinaulta i Dep. Puebla paa 7—8000' i Mai.

En smalløvet næsten glat Form fandt jeg ved Huitamalco og ved Sta Maria Tlapacoyo i Dep. Vera Cruz.

Schiede fandt den ved Jalapa i August; Leibold angiver den fra den tempererte Region.

Den er særdeles foranderlig; jeg har taget Exemplarer af 10 Tommers Længde, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ T. Brede; andre havde det golde Löv noget længere og bredere (12 T. langt, $\frac{2}{3}$ T. bredt) end det linieformige frugtbare. Skjælbedækningen er ogsaa foranderlig; nogle have forreste Flade næsten glat, andre ere næsten lige stærkt besatte med Skjæl paa begge Sider.

Frugtpletterne hos denne og de to efterfølgende Arter ere ikke kredsrunde, som sædvanlig hos Polypodier, men aflange, hvorved man kan forledes til at henføre dem til Grammitis; men den i det tykke læderagtige Löv indsænkede Veneforgrening er aldeles overenstemmende med den for Pleopeltis hos Presl angivne.

2. Polypodium polylepis de Roemer. Kze Addit. I. c. p. 131.

Voxer paa Ege og Fyrestammer i de höiere Regioner imellem 6500—14000'. Jeg har fundet den ved S. Juan Coscomatepec 6500'; paa Fyrretræer i det saakaldte Mal-pays de la Hoya 7500—8000'; omkring Chinautla 7000' paa Ege; endelig paa Pico de Orizaba som den sidste og höiest gaaende Bregne paa 12—14000' voxende paa forkrypledé Pinus Montezumæ Stammer. Kunze anfører den fra Mineral del monte, sendt af C. Ehrenberg, og fra forskjellige Steder i Mexico uden Angivelse af Stedet ved Hegewisch og Karwinski.

Den ligner foregaaende, og lader sig neppe erkjende som forskjellig efter den korte usfuldstændige Diagnose af Roemer. Den er imidlertid bestemt forskjellig fra *P. lepidotum*, adskilt ved sit mindre Löv (3—5 Tommer langt, $\frac{1}{2}$ T. bredt), som er meget tykkere næsten bruskagtigt, Ribben fortil fremtrædende med en fordybet Rende paa hver Side, Overfladen næsten glat med sorte indtrykte Prikker, Underfladen tæt belagt med større navleformig-befastede lasede næsten kredsrunde eller æg-lancetformige noget budte Skjæl; Stilk'en med en nedløbende Rand paa hver Side; Rodstokken belagt med tiltrykte lancetformige i Randen lasede stive sprøde kjödsfarvede Skjæl med sortagtig Middelstribe. Nervationen bliver ikke tydelig selv efter en halv Dags Udblødning.

3. Polypodium astrolepis Liebm.:

fronde coriacea 2—3 pollices longa, 2—3 lineas lata linearis acuta margine involuta utrinque squamulis nivatis hyalinis umbilicatis orbiculatis stellato-partitis, costa nigra utrinque prominente sensim in stipitem ancipitem 2—4 lineas longum transeunte; soris oblongis; sporangiis pedicellatis obovatiss. Rhizoma horizontale procurrente villo fusco radiculisque ramosis obsitum.

Den voxer parasitisk paa gamle Træstammer ved Mirador (3000') fructificerende i August; ligeledes funden ved Trapiche de la Concepcion i Districtet Chuapan i Dep. Oaxaca (3000'), i Frugt i Juli. Den hører saaledes til den varm-tempererte Region paa 3000', medens de to foregaaende fornemmelig ere herskende i den kolde.

Det er ikke uden efter gjentagne nöiagtige Undersøgelser, at jeg har beqvemmet mig til at opstille denne Art, som henhører til den skjældække Afdeling af Pleopeltis med heelt Löv, hvilken frembyder saa store Vanskærligheder for Arterskjendelsen, hidrørende paa den ene Side fra Ensformigheden i Bygningen, paa den anden Side fra den betydelige Foranderlighed i Habitus. Jeg har fundet det umuligt at indtvinge denne Form under

nogen af de to foregaaende Arter, og troer, at de angivne Characterer i Dignosen ville godtgjøre Forskjelligheden. Men foruden disse kan endnu andre anføres. Sporangerne ere ikke saa kjölleformig langstrakte som hos *P. lepidotum*, men kortere og omvendt-afgormige; Ringen er mere bugtet ujevn paa Ryggen. Nervationen frembyder især Forskjel: baade hos *P. lepidotum* og *P. polylepis* findes i samtlige uregelmæssige kantede Masker, som dannes af de sammenløbende Vener, korte fri punktformig endende Smaavener; disse sidste mangle hos *P. astrolepis* med Undtagelse af den midterste Maskerække, hvori Frugpletterne udvikle sig, og dernæst yderst imod Randen, som ikke naaes af de korte frie Smaavener.

4. Polypodium lycopodioides L. Plum. t. 1'9. Kze. Addit. l. c. p. 132. Ej. fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 311.

Denne Art er indskrænket til den hedeste tropiske Skovregion, og forekommer almindelig i Kystskovene langs hele Mexicos Østkyst parasitisk paa Stammer, neppe overskridende 800 Fods Höide. Bærer Frugt fra Marts til Mai. Jeg fandt den ved Boca del rio, S. for Vera Cruz, ved Antigua, S. Carlos, Hac. de Sta Barbara, Colipa, Yecocatla, Papantla. Schiede fandt den i Marts paa Stammer i aabne Skove ved Misantla. Leibold angiver den i reg. temp., hvilket er urigtigt. Den er meget foranderlig i Lövets Længde og Brede; golde Löv blive indtil 7 T. lange og 2 Tommer brede; det frugtbare Löv er sædvanlig 4—5 T. langt, 4—5 Linier bredt; man finder den snart spids, snart buddt, eliptisk, afgormig o. s. v.

Angaaende *Acrostichum citrifolium* Mart. & Gal. see ovenfor.

* * fronde pinnatifida.

5. Polypodium angustum. Pleopeltis angusta Humb. Bonpl. pl. æq. 2 p. 182 t. 140. Mart & Gal. l. c. p. 44.

Tilhører Skovregionen imellem 2—7000' baade paa de mexicanske Cordillerers østlige og vestlige Heldning, voxende paa Træstammer, og bærende Frugt i Mai og Juni.

Jeg fandt den i Chinantla ved S. Pedro Tepinapa (2500') paa Ege omkring Tiuzulan og Chinautla (7000'). Galeotti fandt den ved Juquila paa Dep. Oajacas vestlige Side. Humboldt og Bonpland fandt den tidligere ved Ario paa 994 Toisers Höide.

6. Polypodium areolatum W. Schlechd. Linnaea v. 5. p. 606. Kze fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 312. P. sporadocarpum W. Chrysopteris sporadocarpa Link. fil. hort. Ber. p. 121.

Meget udbredt i Mexico. Jeg fandt den i Skove og paa enkelte fritstaaende Træer; ved Mirador paa Ege i Januar, ved Colipa i Marts, ved Chinautla (7000') i Mai. Schiede

fandt den paa Træer ved Jalapa i August. Leibold angiver den, skjöndt neppe rigtigt: ad tumulos Indorum.

Særdeles foranderlig; man finder den fra 1 til 3 Fods Længde, snart blaadugget paa begge Lövflader, snart uden Dug af en mat sögrön Farve; sædvanlig er den fuldkommen glat, men jeg har ved Mirador fundet den paa Bagsiden ved de nederste Flige bedækket med brune traadformige infiltrede let afgnidelige Skjæl især langs Fligenes Middelribbe og Lövets Hovedribbe. Maaskee er denne Form identisk med *P. fulvum* Mart. & Gal. Den fortykkede og noget indrullede Rand er snart hel og bølget, snart buddt og uregelmæssig fintandet. Arten har habituel Lighed med *P. aureum*, men besidder aldrig mere end en enkelt Række Frugthobe paa hver Side af Middelribben omrent midtsyv imellem denne og Randen. Sandsynligviis ere flere af Angivelserne for *P. aureum* at henføre til denne Art. Rodstokken er læder-træagtig horizontal krybende fingertyk belagt med lanceiforme Skjæl og forsynet med korte valseformige glat afskaarne Rester af Lövstilke.

Tvivlsomme.

Polypodium aureum (L.) Mart. & Gal. I. c. p. 31. Benth. pl. Hartw. p. 55.

Galeotti angiver den voxende snart paa Ege, snart paa Basalklipper ved Jalapa, Gilotepec, Coatepec, Mirador; paa Kalk og Skifer, paa Ege og Erythrina ved Villa alta, og ansætter dens Region imellem 1000 - 7000'. Hooker angiver den som samlet af Hartweg ved Regla.

Uagtet vi her have en Mængde Stedangivelser, hvorefter man maatte udlede, at Planten er udbredt over hele Landet, betvivler jeg dog höiligen at den ægte linnæiske *P. aureum*, som er saa hyppig paa de vestindiske Øer, virkelig findes i Mexico. Mig er den aldeles ikke forekommet; Alt, hvad der ved første Blik syntes at henhøre hertil, viste sig ved näagtigere Undersøgelse at være *P. areolatum* W.

Polypodium fulvum Mart. & Gal. I. c. p. 33 t. 6. Coll. H. Galeotti no. 6463.

Galeotti angiver den fra Kalkklipper ved Villa alta i Dep. Oajaca.

Denne Bregne er mig ubekjendt; Beskrivelsen er ikke meget fyldestgjörende, og Afbildningen ucorrect med Hensyn til Nervationen, samt ikke stemmende med Beskrivelsen. Det hedder saaledes: laciniis oblongis obtusis, men afbildes lanceolatis acutis; fremdeles: ad nervos venasque squamuoso-lanata, men paa Afbildniugen finder man den kun ad costas rhachinque lanata. Nye Undersøgelser maa vise, om denne Plante' er andet end Form af *P. areolatum* W.

Polypodium glaucinum Mart. & Gal. l. c. p. 32. t. 5 fig. 1. Coll. H. Galeotti no. 6430.

Galeotti angiver den som voxende paa Ege og Basaltklipper i Omegnen af Zimapam og Actopan (7--7500').

Den sammenlignes med *P. aureum*, men af den maadelige Beskrivelse fremgaaer Intet, som kan have Vægt. Baade af Beskrivelsen og Afbildningen anseer jeg den som henhørende til *P. areolatum* W.

Polypodium araneosum Mart. & Gal. l. c. p. 33. t. 5. fig. 2. Coll. H. Galeotti no. 6460.

Galeotti fandt den paa Kalkklipper ved Villa alta (3500--5000').

Dette er sandsynligvis en særegen Art, som efter Beskrivelsen og Afbildningen vil kunne gjenkjendes. Mig er den ikke kommet for Öie i Mexico. Nervationen paa tab. 5. 2 a. er ikke rigtig ansat.

B. Marginaria Bory, Prest. venis tenuissimis in areolas angulatas irregulares anastomosantibus, venulis ex angulo vel latere interno areolarum oriundis solitariis liberis apice globuloso soriferis.

* fronde simplici.

7. **Polypodium angustifolium Sw.** Raddi fil. Bras. t. 23. f. 2. Kze. fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 311. Mart. & Gal. l. c. p. 29; Polyp. tæniostum W. Schlechd. Linnæa v. 5 p. 606. Marginaria dimorpha Link. fil. h. Berol. p. 119.

Almindelig i den varm- og kold-tempererte Region, men manglende i den hede og kolde; den voxer paa Træstammer i Skove, fornemmelig paa Ege, og er især hyppig paa 6--7000 Fods Höide, hvor den tillige opnaaer sin største Udvikling; den stiger ned til 2000 Fod paa Cordillerernes Östside. Den træffes hele Aaret i Frugt. Jeg fandt den ved Mirador (3000'), S. Pedro Tepinapa i Dep. Oajaca (2000'), Trapiche de la Concepcion (Dep. Oajaca 3000') paa Stene, Chinautla i Dep. Puebla (7--8000'). Schiede fandt den paa Traær ved Jalapa; Galeotti paa Hac. de Zazuapan, men ansætter dens Region alt for indskrænket imellem 2--4500'.

Da den er temmelig foranderlig, har dette givet Anledning til forskjellige Benævnelser af Forfatterne, saaledes som ovenstaaende Synonymer vise. I Mexicos koldere Bjergregioner ere Exemplarerne fra 4--5 Tommer indtil 2 Fod lange og $\frac{2}{3}$ T. brede; i lavere Regioner er Lövet meget smalt, sædvanlig kun $1\frac{1}{2}$ Linie. Ved Chinautla fandt jeg Exemplarer med tokløftet Löv.

* * fronde pinnatifa.

- 8. Polypodium incanum Sw.** Schk. Farrn. t. 44. b. Kze. fil. Leib. l. c. p. 312.
Schechd. Linnaea v. 5 p. 608. Mart. & Gal. l. c. p. 35.

En særdeles vidt udbredt Art, der i Mexico findes næsten igjennem alle Regioner paa Træer. Jeg fandt den ved Colipa og Papantla i den hede Kystregion, ved Mirador paa 3000', ved Chinautla paa 7000', ved Yavesia i Dep. Oajaca paa 7—7500'. Schiede sendte den fra Jalapa, Mineral del monte; Galeotti tog den ved Zazuapan (2500—3000'), Yavesia 6—7500', samt ved Guadalaxara paa Klipper i Baranker.

- 9. Polypodium squamatum L.** Schlechtd. Linnaea 5 p. 608. Kze fil. Leibd. l. c. p. 318. Plum. fil. t. 79. Kze. Addit. l. c. p. 133.

Forekommer parasitisk paa Træstammer paa Cordillerernes østlige Hældning fra 2 til 7000 Fod; saaledes fandt jeg den ved Sta Maria Tlapacoyo i Dep. Vera Cruz, ved Chinautla i Dep. Puebla og ved Hac. de Mirador. C. Ehrenberg i Mineral del monte. Schiede fandt den ved Jalapa.

- 10. Polypodium furfuraceum Schlechtl.** Linnaea v. 5 p. 607. Kze fil. Leibd. l. c. p. 312. Mart. & Gal. l. c. p. 42.

Findes i den varm- og kold-tempererte Cordillere-Region parasitisk paa Ege. Jeg fandt den ved Mirador (3000') og ved Chinautla (7000'), fructificerende i Mai og August. Schiede tog den ved Jalapa; Galeotti ved Sola i Dep. Oajaca (6500—7500'), men angiver den som voxende i Sprækker af Kalkbjerge, hvilket neppe er rigtigt.

- 11. Polypodium Lepidopteris Kze.** Addit. l. c. p. 132. Kze. fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 312. P. hirsutissimum Raddi fil. t. 26. Mart. & Gal. l. c. p. 41. P. sepultum Kaulf. P. rufulum Presl., Acrostichum Lepidopteris Langsd. & Fischer fil. t. 2.

Er udbredt igjennem hele Egeregionen baade paa Øst- og Vestsiden af Mexicos Cordillerer. Jeg fandt den ved Zazuapan og Mirador i November og Marts; Schiede traf den paa Klipper (?) ved Hac. de la Laguna; Galeotti fandt den paa Ege ved Jalapa, Mirador, Zazuapan, samt ved Morelia (6—7000') i Dep. Michocan.

- 12. Polypodium plesiosorum Kze** fil. Leibd. Linnaea v. 18 p. 313.

En meget almindelig Art i den tempererte Region paa Mexicos Østsider imellem 3—4500' voxende paa Ege i Skovene. Jeg fandt den omkring Mirador, Aguas santas, Chistla, S. Antonio Huatusco, fructificerende fra November til April.

Til Prof. Kunzes fortrinlige Beskrivelse har jeg kun lidet at tilføie. Af alle Mexicos Polypodier udmarkør denne Art sig ved sin smukke lysgrønne Farve, som ufor-

andret bevarer ved Törning. Prof. Kunze beskriver Texturen som tyk læderagtig, saa at ikun Aarerne nærmest Middelribben blive synlige. Mine talrige Exemplarer ere ikke af en saa tyk Textur eller saa uigjennemsigtige. Nervationen er meget tydelig ved gjennemfaldende Lys, og bliver saaledes at beskrive. Venæ alternæ, alterne ramosæ, ramulis penultimis venarum oppositis in arcum aculum anastomosantibus et areolam 5—7agonam formantibus, ramulis ceteris liberis apice clavato incrassato desinentibus, ramulo infimo in areola inclusu apice sorifero. Heraf fremgaer altsaa, at Arten henhører til Marginaria, og allene ved denne ene Charakteer er langt lettere at adskille fra de nærbeslægtede Arter af *P. vulgare*, end ved alle ydre Formforhold. Retningen af Lövets Flige er temmelig foranderlig: næsten ret udstaende, noget opadböiede og da ofte lidet segiformige, de nederste enten vandrette eller nedad böiede. Randens Indskjæring ogsaa foranderlig, helrandet, uregelmæssig smaatandet lige til Grunden af Fligene, sædvanlig kun smaatandet imod Spidsen.

13. *Polypodium rhodopleurum* Kze. fil. Leibd. I. c. p. 315. *P. californicum* Kaulf.? Schlechtd. Linnaea v. 5. p. 606.

Hører hjemme i den samme Region som foregaende, og voxer paa Ege. Schiede fandt den ved Jalapa, Leibold ved Zazuapan; mig er den ikke forekommet.

14. *Polypodium deltoideum* Liebm.:

fronde coriacea glaberrima, 7—9 pollices longa, 4 poll. lata, stipite 3—4 pollicari, deltoidea profunde pinnatifida acuminata, lacinii 6—8 cujusque lateris, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longis, $\frac{1}{2}$ poll. latis, alternis suboppositivs lanceolatis breviacuminatis obtusiusculisve, margine undulato repando irregulariter et minutissime crenulatis, basi dilatata confluentibus, subhorizontalibus, infinitis reflexis basi inferiori truncatis, sinibus acutis, colore frondis rubro-virente, costa utrinque prominula, venis obscuris flexuoso-ramosis, venulis ante marginem in areolam angulatam anastomosantibus, ceteris liberis apice clavato incrassatis, soris inter marginem et costam mediis, junioribus ovalibus oblique transversis; rhachi stipiteque utrinque acutangulis flavidis.

Rhizoma horizontale repens flexuosum pennam anserinam crassum squamis scariosis umbilicatis adpressis ovato-lanceolatis rubello-flavidis pellucidis dense obsitum.

Det eneste Sted, jeg har samlet denne Art er i den kolde østlige Cordillere-Region ved Chinautla i Dep. Puebla paa 7—8000 Fods Höide, voxende paa Egestaæmer. Frugthobene vare ei fuldstændig udviklede i Mai Maaned.

Denne Art har megen Lighed med *P. Catharinæ Langsd. & Fisch.* fil. t. 9, men adskiller sig derfra: fronde majori latiori, lacinii crenulatis, soris inter costam et marginem mediis, nec nervo contiguis, stipite antice acutangulo nec trisulcato, colore diverso.

15. *Polypodium confluens* Liebm.:

fronde tenuiter coriacea, $1\frac{1}{2}$ –2 pedali, 4 pollices lata, stipite 8 pollicari, lanceolata apice breviacuminata pinnatisecta, laciiniis alternis suboppositisve lanceolatis acutis subhorizontibus margine repando-crenulatis, basi dilatatis confluentibus superiori angulatis dilatatis, inferiori rotundato-subauriculatis, sinibus angulatis acutis, laciiniis inferioribus remotioribus divaricatis basi magis alato-dilatatis, costa utrinque prominula atrosanginea, antice fusco-puberula, postice subglabra, venis obscuris flexuoso-ramosis ante marginem apice clavato desinentibus, venulis in areolam angulatam anastomosantibus; soris costae approximatis rufis uniseriatis; rhachi utrinque puberula antice canaliculata postice convexa; stipite glabrescente.

Rhizoma horizontale repens flexuosum pennam anserinam crassum, squamis umbilicatis rubellis ovatis adpressis obsitum.

Denne anseelige og udmarkede Art findes paa Egestammer i Skovene ved Chinautla (7000'), og bærer Frugt i Mai.

Med Hensyn til dens Henførelse till Marginaria har jeg været noget i Tvivl, da Aaremaskerne, som hos denne Underslægt dannes af de sammenløbende Aaregrenene, ikke altid kommer til at danne sig, idet Aaregrenene ikke forlænge sig tilstrækkeligt til at støde sammen. I de fleste Tilfælde skeer dog dette saaledes, som jeg ovenfor har beskrevet det. Da jeg til Underslægten Enpolypodium ikkun henregner alle de Arter, hvis Aarer ikke løbe sammen i Masker, staaer denne Art altsaa paa Grændsen imellem Marginaria og Enpolypodium. I Habitus nærmer den sig meget til *P. latipes* Langsd. & Fisch. fil. p. 10 t. 10, men adskilles derfra ved flere væsenlige Charakterer, som den enkelte Rakke af Frugthobe, Lövaxens og Middelaerernes Laaddenhed o. fl.

16. *Polypodium Falcaria* Kze. fil. Leibd. l. c. p. 316.

Denne med *P. loriceum* L. og *P. dasyleurum* Kze. nærbeslægtede Art findes i den tempererte østlige Region paa Træer.

17. *Polypodium rhachipterygium* Liebm.:

fronde herbacea glabra viridi pedalii, 5–6 pollices lata, stipite 5–6 pollicari, ovata, pinnatisecta, laciiniis alternis distantibus patulis 6–7 cujusque lateris, 3–5 poll. longis, pollicem latiss. lanceolatis, apice modo acutiusculis modo obtusatis, margine irregulariter repandulis, supra basin parum conniventibus, basi utrinque dilatalis decurrentibus, sinibus amplissimis rotundato-angulatis; terminalibus confluentibus; costa utrinque rotundato-prominula straminea, venis antice immersis postice prominulis flaccidis flexuoso-ramosis, venulis ante marginem in areolam magnam angulosam anastomosantibus, ceteris liberis; soris uniserialibus inter costam et marginem mediis ellipticis rufis; rhachi stipiteque utrinque convexis rufescentibus iman ad basin alatis.

Rhizoma obliquum repens flexuosum pennam anserinam crassum squamis lanceolatis dilute rufescentibus imbricatis obtectum, radiculos longos ramosos fuscos deorsum, frondes 3—4 sursum emittens.

Jeg fandt denne Art paa gamle Træstammer i Bjergskove ved Teotalcingo Dep. Oajaca, Districtet Chinantla imellem 4—5000 Fods Höide, i Juni Maaned.

Arten har megen habituel Lighed med *P. dissimile* Schk. Crypt. t. 14, hvorfra den dog adskilles ved kortere Löv, færre Lövflige, som ere kortere, bredere, mindre tilspidsede, Randen uregelmæssig smaabugtet, Frugthobene midt imellem Rand og Middelribbe og af lange, Lövstilken tydelig vinget lige til Grunden.

* * * fronde pinnata.

18. *Polypodium nerifolium* Schk. Farrn t. 15. Kze. fil. Leibd. Linnæa v. 18. p. 321. Mart. & Gal. I. c. p. 39.

Denne udmarket smukke Bregne er meget udbredt i Mexico paa Östsiden voxende paa Træstammer i den hede og tempererte Region. Jeg fandt den ved Colipa (5—800') i Marts, i den dybe Baranke ved Huitamalco i Mai, ved Mirador i October, ved Teotalcingo i Dep. Oajaca (5000'), ved S. Pedro Tepinapa Dep. Oajaca i Juli. Galeotti anfører den fra Mirador og Jalapa.

Den er meget foranderlig med Hensyn til Størrelse og Finnernes Brede; mine Exemplarer ere fra 1—3 Fod lange, Finnerne fra $\frac{1}{2}$ til over 1 Tomme brede.

19. *Polypodium sessilifolium* Liebm.:

fronde tenuiter coriacea, $1\frac{1}{2}$ 2 pedali, 5—6 $\frac{1}{2}$ poll. lata, stipite 4—6 pollicari, elongato-lanceolata acuminata pinnata, pinnis distantibus 13—15 cujusque lateris patulis aut horizontalibus, 3 poll. longis $\frac{1}{2}$ poll. latis, elongato-lanceolatis acuminatis acutis sessilibus, basi rotundatis margine crenulatis, pinnis superioribus adnatis, terminali 3—4 pollicari basi auriculata, utrinque imprimis ad costam & marginem tenuissime puberulis, costa utrinque prominula, venis ramosis ante marginem apice globuloso desinentibus, venulis in areolam majuseculam 5angulatam anastomosantibus; soris inter costam et marginem mediis ferrugineis sparsis uniseriatis; rhachi stipitique antice canaliculatis postice convexis; rhachi puberulis, stipite glabrescente nitido flavido.

Rhizoma breve subglobosum squamis ferrugineis lanceolatis dense obsitum, radiculis ramosis fusco-villosis.

Voxer paa gamle Træstammer i Baranca de Huitamalco i Dep. Vera Cruz paa heninmod 2500 Fods Höide.

Bemærkningen fra *P. confluens* gælder ogsaa for denne og efterfølgende Art med Hensyn til Aarernes Anastomose.

20. **Polypodium insigne Liebm.**:

fronde coriacea, 4 pedali, 12 poll. lata, stipite 15 pollicari, elongato-lanceolata pinnata, pinnis alternis patulis deorsum suboppositis horizontalibus distantibus 6—7 pollices longis, sursum decrementibus, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ poll. latis linear-lanceolatis acutis sessilibus basi oblique latocuneatis, margine rotundato-crenatis, costa utrinque prominula, venis obscuris 5—6 furcatis, venuis in areolam elongato-5agonam anastomosantibus, soris costæ approximatis majusculis ferrugineis uniseriatis, rhachi costa pinnis utrinque tenuissime puberulis, pube facile detergibili et evanescente, rhachi antice bisulcata, postice rotundata, stipite glabrescente nitido fusco. Rhizoma repens paleis ferrugineis lanceolatis ciliatis obsitum.

Denne anseelige Bregne voxer paa gamle Ege i den tempererte Egeregion imellem Hac. de Mirador og Totutla, og fructificerer i November.

Tvivlsom.

Marginaria Hænkeana Presl. *Polypodium ciliatum* Presl Rel. Hænk. p. 20.

Den anføres som samlet af Hænke i Mexico, men uden nogen nærmere Angivelse. Kunze gjorde i fil. Poep. p. 36 opmærksom paa, at den i Rel. Hænk. omtalte Plante ikke var den ægte *P. ciliatum* W., men hverken han eller Presl, som synes at have taget denne Bemærkning til Følge, idet han i Pteridographien opstiller den under nyt Navn, have omtalt hvori Forskjellen bestaaer. Ingen anden Botaniker har i Mexico fundet nogen Bregne, som kunde henregnes hertil. Jeg anseer derfor Sagen for meget tvivlsom, da det er bekjendt, at betydelige Urigtheder i Stedangivelserne have fundet Sted ved de hænkeske Plantesamlinger.

C. Anaxetum Schott. venis costæformibus, venuis primariis in areolas irregulares anastomosantibus, venuis secundariis iterum in areolas irregulares anastomosantibus aut liberis simplicibus furcatis rectis hamatisve apice incrassatis; soris inter venas costæformes mediis.

21. **Polypodium crassifolium L.** Plum. fil. t. 123. Presl Pter. t. 8. f. 9. Schlechdl. Linnæa 5 p. 606. Mart. & Gal. l. c. p. 30. Kze fil. Leibd. l. c. p. 312.

Denne Bregne er en af de meest characteristiske Arter i Mexicos østlige tropiske Urskove, hvorfra den stiger op indtil 4500' i Ege og Liquidambar Skovenes fugtige varm-tempererte Region. Den voxer parasitisk i store Tuer paa Træernes Stamme og Grenne sammen med Anthurium, Tillandsier, Orchideer, Piper, o. dr. Jeg fandt den i Kystskovene

ved Boca del rio, Antigua, Colipa, Sta Maria Tlapacoyo, i Baranken ved Huitamalco og ved Mirador. Schiede fandt den ved Jalapa; Galeotti ved Jalapa og Mirador. Den findes hele Aaret igjennem i Frugt.

D. Campyloneurum Presl. venis costæformibus, venulis oppositis in arcum angulatum anastomosantibus, venulis secundariis ex angulis arcus exorientibus liberis apice globulosis; Soris apice aut dorso venularum secundiarum insidentibus parvis globosis.

22. Polypodium Phyllitidis L. Plum. fil. t. 130. Presl Pter. t. 7 f. 18. Mart. & Gal. l. c. p. 30. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 312.

Har nöagtig den samme geographiske Udbredning i Mexico, som den foregaaende, og findes paa de samme Træer, som den. Mine Exemplarer ere fra Jicaltepec ved Rio Nautla, Colipa, Hac. de Sta Maria Tlapacoyo. Galeotti fandt den ved Jalapa og Mirador, men han ansetter dens Region imellem 3—4500', medens den netop er meget udbredt i de laveste Kystskove.

23. Polypodium costatum Kze. fil. Poep. p. 38. Presl Pter. t. 7 f. 21. Mart & Gal. l. c. p. 30.

Denne Art tilhører Egeskovenes Region imellem 3—4500', voxende paa gamle Træstammer, og bærende Frugt i Foraarsmaanederne. Jeg fandt den ved Aguas santas og Mirador, samt i Baranca de Huitamalco; Galeotti ved Jalapa og Mirador.

Den har nogen Lighed med foregaaende, men adskilles ved Lövets tyndere Substants, mindre fremtrædende ribbeformige Vener, 1—2 Tommer lang smal Spids af Lövet, og endelig ved en forskellig Venation.

E. Eupolypodium: venis liberis pinnatis simplicibus furcatisve apice globulosis.
1. soris in apice globuloso venarum venularumve.

* venis simplicibus.

24. Polypodium fallax Schlechtd. Linnæa v. 5. p. 609. Mart. & Gal. l. c. p. 44. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 323.

Denne lille Bregne, som saa meget ligner en lille Asplenium germanicum, voxer paa Træstammer i den varm-tempererte Regions fugtige Skove. Jeg fandt den ved Sta Maria Tlapacoyo og ved Mirador; Schiede fandt den ved Misantla; Galeotti ved Jalapa og Mirador. Den fructificerer hele Aaret.

Til Schlechtendals meget gode Beskrivelse, har jeg kun nogle faae Bemærkninger og Tillæg at gjøre. Naar Forf. først skriver radices caudexque junior subterranea og strax derpaa habitat in truncis arborum, da bliver denne Modsigelse at rette til: rhizoma vase ramosum supra corticem arborum longe procurrentes, radiculis numerosis ramosis ferrugineo-villosis dense affixum. Lövet opnaaer sædvanlig kun 2 Tommers Længde, men bliver stundom 4 Tommer lang. Lövstilen er af $\frac{1}{2}$ til $1\frac{1}{2}$ Tommes Længde, yderst fin traadformig; Finnernes Antal er sædvanlig større end det angivne, nemlig inttil 13. Underfladen af Lövets Finner er besat med strøede navleformig befæstede og lancetformige tilspidsede i Randen spidstandede rustbrune Skjæl, som kun i ældre Alder ved Afgnidning af Spidsen blive kredsrunde.

Der har været Tivl, om Planten virkelig henhørte til Polypodium, navnlig var det usikkert, om ikke Indusier vare tilstede, da ikun ældre Exemplarer vare blevne undersøgte. Jeg kan bekræfte, at det er en virkelig Polypodium, at de store enkelsiddende Sori ere befæstede paa de punktformige Spidser af de frie Vener. Nervationen kløfter sig saaledes, at en enkelt fri for Randen punktformig ophørende Nervegreen findes i hver af Lövets Flige.

25. *Polypodium heteromorphum* Hook. & Grev. ic. fil. t. 108. Schlechtd. Linnaea v. 5 p. 609. Mart. & Gal. l. c. p. 41.

En höist sirlig fin Bregne, hvis nedhængende selskabelig voxende Löv over-dækker de lodrette Klippevægge eller Væggene af Klippehuler i de höiere Fjeldregioner paa Vulkanen Orizaba imellem 10500—12500 Fods Höide. Jeg fandt den paa Orizaba i Nærheden af Cueva de Temascal, samt paa steile Klipper over Vaqueria del Jacal paa venstre Side af Baranken; Schiede og Galeotti fandt den ligeledes paa Vulkanen. Den fructificerer rigelig i September.

26. *Polypodium moniliforme* Sw. Mart. & Gal. l. c. p. 34. Schk. Farrn. t. 8. c.

Hører paa de mexicanske Cordillerer til de höiere Fjeldregioners characteristiske Bregnemormer. Jeg fandt den paa Pico de Orizaba imellem 9 og 10,000 Fods Höide i September, og paa Cerro de Sempoaltepec i Dep. Oajaca paa 9—10,000' i Juni; paa begge Steder traf jeg den kun parasitisk paa Egestammer. Galeotti, som ligeledes havde fundet den paa Orizaba, og som ansætter dens Region imellem 9 og 12000 Fod, angiver den formelig voxende paa Trachyt og Obsidian Klipper, hvorpaa jeg aldrig mindes at have seet den.

Lövet af den normale Form opnaer en Længde fra 2—4 Tommer, og en Brede af 2—4 Linier. I Lövets Halvfinne er Middelribben aldrig synlig, men ligger indsenket i den tykke læderagtige Substans. Frugthobenes Antal er fra 1—4 paa hver Halvfinne.

P. moniliforme var. major: a forma typica differt: fronde 6—8 pollicari, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ poll. lata, laciniis lanceolatis obtusissimis, costa laciniarum utrinque conspicua, soris 8—10 demum confluentibus, stipite rhachique magis pilosus.

Denne kraftige Form fandt jeg paa Cerro el Pelado i Dep. Oajaca imellem 9—10,000' paa Ege, rigelig fructificerende i September; ligeledes paa Pico de Orizaba paa 8—10,000' i September.

27. **Polypodium xiphopteroides** Liebm. **P. ferrugineum** Mart & Gal.?

fronde coriacea 3—5 pollices longa, 4—5 lineas lata, lineari-lanceolata pinnata vel potius pinnatisecta, laciniis alternis patulis lineari-lanceolatis subfalcatis obtusiusculis marginibus parum undulatis revolutis, basi dilatatis vix autem confluentibus, sursum et deorsum decrescentibus, pagina posteriori rhachi utrinque stipite pilis cinnamomeis strigosis dense obsitis, costa laciniarum venisqne immersis, venis simplicibus ante marginem apice globuloso desinenteribus; soris 6—8 cujusque laciniæ majusculis confluentibus; colore frondis antice olivaceo-viridi, postice ferrugineo; stipite $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{1}{2}$ pollicari tereti.

Rhizoma horizontale repens ramosum pennam anserinam crassum squamis imbricatis lanceolatis nitidis subpellucidis versicoloribus obsitum, radiculisque longissimis ramosis fusco-villosis instructum.

Denne lille læderagtige Bregne voxer selskabelig paa Træstammer imellem Mosser paa Cordillere-Heldningerne imellem 3—7000 Fods Höide. Jeg fandt den ved Mirador, Totutla, og i Dep. Oajacas østlige Dele ved Trapiche de la Concepcion, endelig ved Yavlesia i Districtet Ixtlan (7000'); alle Steder paa Ege.

Smaa Exemplarer have Lighed med Xiphopteris myosuroides. I tør Tilstand slaaer Fligene sig sædvanligvis sammen bagtig, og Lövaxen böier sig kredsformig tilbage. Paa ældre Exemplarer findes de temmelig sprøde stive forholdsvis lange Haar afgnedne, hvorved Planten ved overfladisk Betragtning viser sig næsten glat. Formodenlig er det saadanne Exemplarer, som have foreligget Galeotti ved Beskrivelsen af *P. ferrugineum*. Da imidlerid flere andre Forhold i Beskrivelsen og Afbildningen afvige fra min Plante, kan jeg ikke bestemt afgjøre Sagen, og maa altsaa foreløbig sætte *P. ferrugineum* Mart. & Gal. iblandt de tvivlsomme Arter.

28. **Polypodium delicatulum** Mart. & Gal. l. c. p. 35. t. 7. f. 1.

Galeotti fandt den paa gamle Ege ved Llano verde (7—8000') i Dep. Oajaca; jeg

traf den paa Cerro de Sempaltepec paa Ege imellem 8—9000' Höide, rigelig fructificerende i Juni.

29. *Polypodium cultratum* Willd. Mart. & Gal. l. c. p. 39.

I fugtige skyggefulde Skove i den varm-tempererte Region paa de østlige Cor-dillerer imellem 3—4500', fornemmelig voxende paa Stammerne af de træagtige Bregner *Cyathea mexicana* og *Alsophila Schiediana*. Jeg fandt den ved Mirador, Aguas santas; Galeotti sammesteds, og ved Jalapa.

30. *Polypodium suspensum* L. Mart. & Gal. l. c. p. 34. Plum. fil. t. 87.

Den findes i de fugtige Bjergskove i det østlige Oajaca omkring Tonaguia og Tepitongo (4—5000') paa Skovtraernes Bark, og bærer Frugt i Juli og August. Galeotti fandt den ligeledes ved Tonaguia.

31. *Polypodium jubæforme* Kaulf. in Bot. Zeit. 1823 v. 1. p. 364. Kze. Addit. l. c. p. 433.

Jeg fandt denne sjeldne og endnu lidet kjendte Art i Bjergskoven omkring Teotalcingo i Districtet Chinautla Dep. Oajaca imellem 4—5000 Fods Höide paa Træstammer. Iblandt Schiedes Samlinger fandtes et Exemplar, som Prof. Kunze med Twivl henførte til denne Art, og hvis Localitet ikke var angivet.

32. *Polypodium pilosissimum* Mart. & Gal. l. c. p. 39. t. 9. f. 2. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 313.

Galeotti fandt denne mig ubekjendte Bregne ved Hac. de Zacuapan i Dep. Vera Cruz, og ved Tonaguia i Dep. Oajaca, baade paa Træer og Klipper. Leibold fandt den formodentlig ved Zacuapan. Prof. Kunze antager Arten for vel begrundet, men siger dog at Beskrivelsen er mindre overensstemmende med Afbildningen. Nervationen er ikke omtalt af Forff. eller antydet paa Tegningen, det er derfor ikke ganske sikkert, at den hører til denne Afdeling.

Tivilsom.

***Polypodium ferrugineum* Mart. & Gal.** l. c. p. 36. t. 7. f. 2.

Efter Galeotti findes den paa Træer og Gneisklipper i Skove ved Zacatepec og Juquila paa Vestsiden af Dep. Oajaca (3—4500'), og angives som meget sjeldnen. Skjöndt jeg aldeles ikke betvivler, at denne Art er identisk med min *P. xiphopteroides*, har jeg dog troet at burde henstille den her iblandt de tivilsommne Arter, fordi flere af Angivelserne ere alt for paafaldende afvigende fra de hos hin forekommende. Diagnosen af *P.*

ferrugineum er i det Hele alt for usfuldstændig til at noget Bestemt deraf kan udledes, og Afbildningen er aabenbart kun en flygtig Skizze, som i en saa vanskelig Afdeling af Polypodium, som nærværende, ikke yder megen Oplysning. Forff. sige i Diagnosen: fronde subglabra, men afbilde dog fig. 2 a. Lövets Underflade tydelig korthaaret. Rhachis nævnes som pubescent, men der siges ikke, om Stipes er det ogsaa; paa Afbildningen sees ikke Spor af Haarrighed paa Stilkken. Rodstokken er unaturlig tegnet, uden al Skjælbedækning. Endelig finde vi en tydelig tegnet Middelribbe i Lövets Flige, hvilken ikke sees hos *P. xiphopteroides*. Galeottis Angivelse om Bregnens Sjeldenhed og Forekomst paa Mexicos Vestside passer heller ikke for min Plante. Sammenligningen med *P. incanum* Sw. er aldeles upassende, da begge Arter ikke engang høre til samme Underslagt, men *P. incanum* er en Marginaria, og denne en ægte Eupolypodium.

* * venis furcatis ramosisive.

33. *Polypodium plebejum* Schlecht. Linnaea v. 5 p. 607. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 319.

Voxer parasitisk paa Træer i den tempererte og kolde Skovregion imellem 2—7000'. Jeg fandt den imellem la Isleta og Maloapam i Dep. Vera Cruz, og paa Ege omkring Chinautla (7000'); Schiede fandt den paa Træer ved Jalapa; Leibold i den tempererte Region.

Den er saa fortrinlig beskrevet af Prof. Kunze, at jeg Intet behöver at tilföie.

Sandsynligvis er den af Martens og Galeotti omtalte *P. virginianum* L., hvilken er synonym med *P. vulgare* L. ikke i Virkeligheden denne, men derimod *P. plebejum*.

34. *Polypodium affine* Mart. & Gal. l. c. p. 37. t. 8. f. 1.

Galeotti fandt den paa Vulkanen Orizaba i Ege- og Naaleskovene imellem 9—10,000 Fods Høide. Jeg fandt den i Skovene over Chinautla imellem 7—8000', fornemmelig paa Ege.

Mine Exemplarer ere fra 7—9 Tommers Længde, og overensstemmende med Forff.'s Beskrivelse og Afbildning. En meget charakteristisk Del, som Forff. ikke omtale, og som især bliver af Vigtighed med Hensyn til efterfølgende Art, er Rodstokken, hvis Beskrivelse her tilföies:

Rhizoma horizontale repens digitum crassum squamis membranaceis undulatis pellucide-rufis lanceolatis longe acuminatis ciliatis denticulatisve 3—4 lineas longis densissime obtectum, radiculis rufo-villosis.

35. *Polypodium griseum* Liebm.:

fronde herbacea, tota incano-pilosula, 1— $2\frac{1}{3}$ ped. longa, 2—3 pollices lata, stipite 2—5

pollicari, elongato-lanceolata acuminata pinnatisecta pinnatavæ, laciiniis sursum et deorsum crescentibus horizontalibus parallelis remotis alternis suboppositisve linear-i-lanceolatis 1—2 polices longis 3—4 lineas latis obtusiusculis obsolete repandis basi parum dilatatis utrinque decurrentibus, costa utrinque prominulis, venis immersis ramosis, soris inter marginem costamque mediis flavidis; stipite rhachique convexis.

Rhizoma horizontale repens pennam cygneam crassum, squamis rigidis castaneis lanceolatis acutis lineam longis obsitum.

Denne Art tilhører den kolde østlige Cordillere-Region imellem 7—8000 Fod. Jeg fandt den voxende paa Egestammer omkring og over Chinautla i Dep. Puebla.

Den adskilles fra foregaaende ved sin Størrelse, Halvfinnernes større Adskillelse, den fine graalaadne Beklædning, Rodstokkens mindre Tykkelse og aldeles forskjellige Skjælbedækning.

36. *Polypodium olivaceum* Liebm.:

fronde coriacea 7—15 polices longa, 4—5½ poll. lata, stipite 1½—4 pollicari, tota fusco-puberula lato-lanceolata acuminata pinnatisecta, laciiniis alternis oppositisve lato-lanceolatis basi dilatatis confluentibus margine crenulatis, crenaturis dorso emarginatis, apice obtusiusculis vel subito acutiusculis, insimis divaricatis, mediis horizontalibus, superioribus sensim sursum subfalcatis, colore olivaceo-virescenti, costa utrinque prominulo, venis subimmersis ramosis, rhachi utrinque convexa, soris inter marginem et costam mediis magnis densis hemisphaericis ferrugineis uniseriatis e basi ad apicem laciniarum prorumpentibus, sporangiis fulvis, stipite antice canaliculato postice convexo.

Rhizoma horizontale repens flexuosum pennam cygneam crassum squamis dilute ferrugineis pellucidis lanceolatis acutis 2 lineas longis dense obsitum.

Denne hidtil upaaagtede Art fandt jeg paa den østlige Heldning af Cordillererne paa Egetræer i Skovregionen imellem 4500—7000'; saaledes imellem S. Antonio Huatusco og S. Juan Coscomatepec, og omkring Sta Maria Alpatlahua ved Foden af Vulkanen Orizaba i September.

P. olivaceum var. elatum: fronde bipedali 6 poll. lata, stipite 6—7 pollicari, substantia tenuiori, laciiniis profundius et remotius crenatis, ceterum simili.

Denne fornemmelig ved sin Størrelse, og Halvfinnernes dybere Indkarvning udmarkede Afart fandt jeg i Egeskovene omkring Mirador i November frugtlös.

37. *Polypodium Hartwegianum* Hook. in Benth. pl. Hartw. p. 54.

Hartweg fandt den paa Bjerget Sunate i Real del monte paa 9500 Fods Höide.

Jeg kjender den kun af Beskrivelsen, hvorefter den fornemmelig synes at udmaрke sig fra alle andre Arter af denne Afdeling ved aflange skjævt stillede Frugthobe.

- 38. Polypodium macrocarpum Presl** Rel. Hank. vol. 4. p. 23. t. I. f. 4. Kze.
Addit. Linnæa v. 13. p. 132. Kze. Farrn. t. 43. f. 2. Pleopeltis pinnatifida Hook.
& Grev. ic. fil. t. 157.

Den er sendt fra Omegnen af Hovedstaden Mexico af Hegewisch, og ikke senere gjenfunden *).

- 39. Polypodium Filicula Kaulf.** Enum. fil. p. 275.

Denne hidtil ikke i Mexico fundne Art er imidlertid ikke sjeldent i den hede og varmttempererte Region paa Cordillerernes Østside. Jeg fandt den paa Træer ved Misantla og Colipa i Marts, ved Teotacingo i Dep. Oaxacas østlige District Chinantla i Juni, og ved Mirador i Januar. Mine Exemplarer stemme fuldkommen med et i Hornemans Herbarium opbevaret Original-Exemplar fra Brasilien. Maalene af mine Exemplarer ere af 5—8 Tommers Længde, 1½ T. Brede, Lövets Flige en Linie brede, Stilkene 1—2 Tommer. Nervationen er enkelt kløftet. Det unge Löv er overordentlig elastisk, Lövfligene saa fast indrullede, at de ikke engang efter længere Udblodning rulle sig ud.

- 40. Polypodium Plumula Willd.** HBK. Syn. 1. p. 74. Schlechd. Linnaea v. 5. p. 607. Kze. fil. Leibd. I. c. p. 313.

Tilhører den hede og tempererte Østregion voxende paa Træer; jeg fandt den ved Colipa i Marts, Yecoaatl, ved Sta Maria Tlapacoyo i Mai, og ved Mirador i Januar. Schiede fandt den ved Jalapa; Leibold angiver blot reg. temp.

Den er meget vekslende i Størrelseforholdene; mine Exemplarer ere fra 10 Tommer til 30 T. lange, 4—5 Tommer brede, Stilkene 9—11 Tommer, Lövfligen 2—3 Linier brede. Fligene mere eller mindre budte i Spidsen; de nederste Flige ere indtil ¼ T. fjerne fra hverandre, opad til mere tilnærmede, snart ikke aftagende snart aftagende imod Löbets Grund; Randen fortykket oftest noget tilbageslaat; Frugthobene udviklede lige til de nederste Flige. IVahls Herbarium findes den med Paaskrift P. elasticum Act. soc. h. Par., meddeelt af Richard.

* **Polypodium affin. vulgari:**

fronde tenuiter coriacea ubique pubescente utrinque viridi, 3 poll. longa, ½ poll. lata, stipite 1—1½ poll. longo, lanceolata pinnatisecta, lacinis divergentibus usque ad rhachim incisis linear-lanceolatis apice obtusis 4 lin. longis, 2 lin. latis, sursum decrescentibus, margine integris incrassatis dense pubescens, sinibus rotundatis, costula nigra flexuosa, venis medio furcatis ante marginem desinenteribus apice incrassatis; rhachi antice plana, postice convexa, stipite tenui antice canaliculato, postice convexo brunneo nitido puberulo demum glabrescente.

Specimina sterilia solummodo visa; species sine dubio indescripta medium tenet inter P. vulgare et P. macrocarpum Presl.

Faa Exemplarer fandtes parasitisk paa Ege ved Chinautla (7000') Dep. Puebla, men da de alle være ufrugbare vover jeg ikke at opstille den som ny Art. Muligen er det denne Bregne, som i Mart. & Gal. Mem. opfores under Navn af P. virginianum.

41. *Polypodium pectinatum Schk.* Farrn. t. 17. b. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 313.

Mart. & Gal. l. c. p. 34(?)

Er af Leibold funden sammen med foregaaende. Hvis Martens og Galeottis Bestemmelse er rigtig er den af Galeotti funden baade paa Klipper og Træer omkring Mirador og Zacuapann. Mine Samlinger indeholde ingen Plante, som jeg kunde henføre til denne.

Høist ønskeligt var det om den Forvirring, som aabenbart finder Sted hos Forff. med *P. pectinatum* kunne blive oplyst, og derved hævet. *P. pectinatum* Schk. er ganske forskjellig fra *P. pectinatum* Sw., hvortil citeres Plum. t. 83.

I Vahls og Schumachers Harbarier findes under Navn af *P. pectinatum* Exemplarer af *P. Plumula*, som ogsaa paa andre Steder benævnes *P. Otites*.

42. *Polypodium Otites L.* Plum. fil. t. 85. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 313. Mart. & Gal.

l. c. p. 35.

Angives af Galeotti fra Moran og Real del monte (7–8000'), voxende paa Ege og Porphyrklipper. Leibold angiver reg. temp; jeg har den ikke.

43. *Polypodium conterminans Liebm.*:

fronde tenuiter coriacea, 16–24 pollices longa, 4–7 poll. lata, stipite 6–8 pollicari, elongato-lanceolata acuminata profundissime pinnatifida, lacinii 2–3½ poll. longis, 4–6 lineas latis, sursum decrescentibus, elongato-lanceolatis modo acutiusculis modo obtusiusculis, leviter falcatis, alternis, infimis deflexis, basi superiori sursum alato-dilatatis, inferiore subrectis non decurrentibus, margine undulato-repandulis ciliatis, sinibus amplis angulato-rotundatis, sursum angustioribus, lacinia terminali elongato-lanceolata curvata; costa utrinque rotundato-prominula antice fusco-puberula postice parce puberula, venis flexuosis 3 furcatis apice clavulatis plerunque liberis uno alterøe loco anastomosantibus; soris inter marginem et costam mediis ovalibus oblique transversis fulvis; stipite rhachique antice canaliculatis postice convexis utrinque puberulis.

Rhizoma horizontale flexuosum nodosum pennam anserinam crassum squamis ferrugineis adpressis lanceolatis obsitum.

Denne Art fandt jeg hyppig i Omegnen af Mirador (Aguas santas, Consoquila (2–3000'), saavel paa Klipper som paa Træstammer i Skovene og Barankerne; den var i Frugt i Marts og November.

Med Hensyn til Nervationen danner denne Art en Overgang imellem Afdelingen med frie Aarer og den med sammenløbende. Det fremherskende Forhold er unaegtelig det, at de 2–3 Gange kløftede Aarer ophøre foran Randen med en lille kjølleformig fortykket fri Ende; men hist og her seer man Aaregrenene forlænge sig, og løbe sammen, dannende Aaremasker som hos Marginaria. Man synes saaledes med samme Ret at kunne henføre Arten til Marginaria og Eupolypodium; her er taget Hensyn til

det fremherskende Forhold. Jeg har nogen Formodning om, at *P. dissimile* (Schk.) Mart. & Gal. l. c. p. 39 ikke er den ægte Schkuhrske Plante, men falder sammen med nærværende Art. Galeotti angiver ligeledes Mirador som Voxested for sin Plante.

44. *Polypodium puberulum* Schildt. Linnaea. v. 5. 607. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 320.
Mart. & Gal. l. c. p. 38.

Denne Art er vidt udbredt i Mexico i Østeordillerernes tempererte Region. Jeg fandt den paa Træer i Skovene ved Mirador, Aguas santas og Teotalcingo i Oajaca. Schiede sendte i sin Tid ikun et Exemplar uden Stedangivelse. Leibold fandt den i den tempererte Region. Galeottis Angivelse Llano verde i Dep. Oajaca 6—7500' anser jeg for usikker.

Til Prof. Kunze's fortrinlige Beskrivelse har jeg kun at tilføje, at Plantens Størrelseforhold ere foranderlige; jeg har Exemplarer af 1, $1\frac{1}{2}$, 3 Fods Længde, Fligene ere fra $1\frac{1}{2}$ til 5 T. lange, 4—6 Linier brede.

45. *Polypodium subpetiolatum* Hooker in Benth. pl. Hartweg. p. 54. Hook. ic. pl. t. 391. 92. *P. biserratum* Mart. & Gal. l. c. p. 38 t. 9. f. 1.

Tilhører den kolde tørre Bjergregion i Mexicos indre Provindser; jeg fandt den i Omegnen af Yavesia i Oajaca (7—7600') paa Ege. Galeotti fandt den ved Llano verde, Yavesia, Capulapan i Oajaca i Egeskove og paa Kalkklipper, og ansætter dens Region imellem 6500—7500'. Hartweg sendte den fra Regla.

Da mine Exemplarer ere fra samme Localitet som Galeottis, tvivler jeg intet Öeblig, at jo min Plante er identisk med *P. biserratum*. Forff.s Beskrivelse indeholder imidlertid uagtet sin Korthed flere væsenlige Fejl, som have ledet til at Prof. Kunze antog den forskjellig fra *P. subpetiolatum* (cfr. Linnæa v. 18 p. 320), uagtet de aabenbart ere synonyme.

Martens og Galeotti kalde Planten glat, uagtet baade Stængel, Lövaxe, Middelribber, tildeels Nerver paa Underside og Randen ere finhaarede; fremdeles hedder det pennis reticulatis, hvilket strider imod deres egen Afbildning, hvor det rigtige Forhold findes; videre duplcato-serratis skjöndt de ere subpinnatifido-crenulatis. Navnet biserratum er derfor aldeles upassende. Hookers Beskrivelse er god og betegnende, dog vil det ikke være overflødig at give en udförligere Beskrivelse, især tjenende til at vise Identiteten af de to opstillede Arter.

Frons tenuiter coriacea, 6—8 pollicaris, 3—4 poll. lata, stipite 2—4 pollicari, pinnata, sursum pinnatifida, pinnis alternis divergentibus elongato-lanceolatis acutiusculis aut obtusiusculis, margine basin versus irregulariter incisis vel subpinnatifidis, laciiniis obtusissimis, ceterum repandis, tenuiter et irregulariter crenulatis, sparse ciliatis, basi obliquis, pinnis inferioribus brevissime petiolatis, sursum sessilibus, basi inferiori adnatis excisis parum decurrentibus,

superiore oblique truncatis, costa utrinque prominula tenuiter pubescente, venis 3—4 furcatis postice hic illic puberulis; soris costæ approximatis uniseriatis fuscis; stipite rhachique antice applanatis marginatis postice convexis, sursum utrinque puberulis.

Rhizoma repens crassitie pennæ auserinæ, squamosum (sec. Hooker).

46. Polypodium fraternum Schlechtl. Linnæa v. 5. p. 608. Mart. & Gal. l. c. p. 37.

En af de mest udbredte Bregnearter i Mexico igjennem den hede og varm-tempererte Region fra Kystkovene langs mexicanske Bugt til Oajacas Central-Cordillerer paa 5—6000'. Jeg fandt den paa Traer ved el Morro de Boquilla og Rancho nuevo (Dep. Vera Cruz) umiddelbart ved Golfen, ved Colipa, Mirador (3000'), S. Bartolome (4500), Tanete i Dep. Oajaca (5—6000'). Schiede opdagede den ved Jalapa; Galeotti fandt den sammesteds, og ved Zazuapan. Den findes i Frugt hele Aaret. Man finder en Form af Qvarter Længde, og en anden af 3—3½ Fods Længde.

Tvivilsomme af denne Afdeling.

Polypodium pulchrum Mart. & Gal. l. c. p. 41. t. 8. f. 2.

Galeotti angiver den som voxende paa *Quercus jalapensis*, *Liquidambar* *Styraciflua* i Skovene om Jalapa, og erklærer den for temmelig almindelig. Ved Sammenligning imellem Beskrivelse og Afbildning fremgaaer saa store Uoverenstemmelser, at der ikke bør tages Hensyn til denne som ny opstillede Art, da det er umuligt at vide, om man skal tilfælde Beskrivelsen eller Afbildningen Paalidelighed, eller ingen af Deleae. I Beskrivelsen hedder det saaledes: *lacinias linearibus elongatis, versus apicem serrulatis, men paa Afbildningen fig. 2 og 2 a, tegnes laciniae linear-lanceolate acutæ integerrimæ; fremdeles hedder det: soris minutis submarginalibus, men tegnes snarere majusculi inter marginem & costam medii.* Af dette sidste Forhold er det at formode, at Venerne, hvorom Forff. intetsomhelst anføre, ere kløftede, og altsaa hører til denne Afdeling, men da bliver Sammenligningen med *P. taxifolium* L., som har venæ simplices upassende.

Ester min Mening er denne *P. pulchrum* vel ikke andet end *P. Plumula* Kaulf.

Polypodium virginianum (L.) Mart. & Gal. l. c. p. 37.

Efter Galeotti paa Ege, *Liquidambar*, *Erythrina* og paa Stene ved Jalapa, Coatepec (3—4500'), og i Llano verde i Oajaca (7000').

P. virginianum L. er Form af *P. vulgare* L., som ikke af nogen Anden er funden i Mexico, og vel heller ikke i Virkeligheden findes. Det er formodentlig *P. plebejum* eller *P. macrocarpum*, som er bleven forvexlet. Muligen er det den i Anm. til p. 200 omtalte Bregne.

Polypodium (Goniophlebium) Hænkei Presl. Pterol. p. 186. t. 7. f. 14. P. attenuatum Presl Rel. Hænk. 4. p. 23.

Uden anden Angivelse end Mexico. Ingen anden Botaniker har fundet denne Plante i dette Land.

Polypodium dissimile (Schk.?) Mart. & Gal. I. c. p. 39. med Synonom P. attenuatum Willd.

Paa Ege ved Mirador Galeotti; neppe rigtigen bestemt.

2. Soris in dorso medio venarum venularumve.

* venis simplicibus.

47. **Polypodium laxifrons Liebm.:**

fronde tenuiter coriacea bipedali et ultra, 2 pollices lata, stipite 5—7 pollicari, linearis-lanceolata profunde pinnatisecta utrinque decrescentibus, lacinias pollicem longis, 3 lineas latius, alternis horizontalibus lanceolatis rectis aut parum falcatis obtusiusculis, margine integris ciliatis, basi dilatatis utrinque decurrentibus, sinibus ellipticis, costa utrinque prominulus glabris, venis simplicibus dorso medio incrassato soriferis, rarius venis medio furcatis soris que angulo venarum insidentibus, soris inter costam et marginem mediis uniseriatis fuscis, rhachi et stipite tenuibus varie curvatis utrinque pilosis rotundatis atropurpureis.

Rhizoma horizontale frondes cæspitosas emittens villo castaneo obductum.

Denne ved sit smekkre Löv og Stilk udmærkede Bregne har jeg kun fundet i de steile Baranker omkring Mirador, nedhængende fra de gamle Træstammer, og rigelig fructificerende i Januar.

Den ligner meget den i Presls Pteridgr. t. 6. f. 28. afbildede P. asplenifolium, som imidlertid hverken kan være L's, andre Forfatteres, ja ikke engang den P. asplenifolium, som Presl i samme Værk p. 178 opfører. Denne Afbildung afviger i de vigtigste Characterer, som angives for P. asplenifolium, af hvilke jeg blot skal anføre den: soris venulas simplices terminantibus, hvorfor ogsaa Presl anfører P. asplenifolium L. til Afdelingen med Sori befæstede paa Spidsen af en Aare, men paa Afbildungen fremstiller Sori paa Midten af Aarerne. Denne Uoverenstemmelse veed jeg ikke at løse. P. laxifrons har aldeles samme Nervation og Sori befæstede til samme Sted, som hos hin Figur, men Fligene selv ere længere, smallere, mere udvidede ved Basis til begge Sider, Bugten imellem Fligene mindre afrundet, fremdeles tydelig randhaaret, Lövaxen og Stilken stærkt haaret.

48. **Polypodium concinnum Willd.** Schlechtl. Linnaea 5. p. 609.

I den hede og varm-tempererte Skovregion paa Mexicos Østside. Schiede fandt den ved Jalapa og Misantla; jeg samlede den omkring Mirador i October og November. Mine Exemplarer ere fra 1½—4 Fods Længde.

49. Polypodium rude Kze. Addit. l. c. p. 133. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 322.
Alsophila pilosa Mart. & Gal. l. c. p. 78. t. 22. (mediocris).

Udbredt i Skovregionen paa Cordillerernes østlige Side, fornemmelig imellem 3 indtil 6500 Fods Höide. Den voxer paa fugtige skyggefulde Steder, især i Nærheden af Skovbække. Jeg fandt den meget hyppig omkring Mirador i Januar, og i Baranker ved Chiautla (Dep. Puebla 6500) imellem Krat ved en lille Flod i Mai. Schiede opdagede Arten ved Jalapa; Leibold angiver den fra den tempererte Region. Galeotti, som miskjendte Arten, opstillede den som ny Alsophila i en maadelig Beskrivelse og Afbildning, anfører den fra Totutla, to Leguas Vest for Mirador, men nævner den urigtigen som sjeldent.

Hooker har efter Martens og Galeottis Autoritet opført den i Spec. fil. p. 47, dog iblandt de tvivlsomme Arter af Alsophila, men bemærker udtrykkelig, at det er umuligt at yttre nogen Mening om Artens Affinitet efter en saadan Beskrivelse og en saadan Afbildning.

50. Polypodium litigiosum Liebm.:

fronde herbacea 1½—2 pedali, 3—4 pollices lata, stipite 3—4 pollicari, pinnato-pinnatifida elongato-lanceolata acuminata, sursum deorsumque attenuata, pinnis suboppositis sessilibus elongato-lanceolatis patulis acuminatis, deorsumque remotioribus valde decrescentibus, pinnis mediis 1½—2 pollicaribus, 3—4 lineas latis, infimis vix semipollicaribus, pinnatifidis, laciniis falcato-lanceolatis obtusis margine revoluto revolutis ciliatis, infimis majoribus subrectis patulis, sinibus obtusiusculis, costa antice canaliculata, postice convexa, utrinque pilosula, costulis utrinque prominulis antice glabris postice pilosulis, venis simplicibus postice hic illic sparse pilosulis, soris dorso medio venarum affixis margini approximatis minutis globosis contiguis non confluentibus, 2—3 in quoque laciniarum latere, rarius 4—5, apicem laciniae non attingentibus brunneis, rhachi stipiteque antice canaliculatis postice convexis, sursum pilosulis deorsum glabrescentibus.

Rhizoma subterraneum breve crassum e basibus frondium cæspitosarum constipatum radiculos longissimos ramosos emittens.

Paa skyggefalte fugtige Steder i de tempererte Skove paa Østsiden; saaledes omkring Mirador.

Hvis Frugthobene ikke var fuldkommen runde, og dersom der viste sig Spor af Sammensmeltnng af Frugthobene, skulde jeg have henfört denne Art til Slægten Gymnogramme, og stillet den ved Siden af G. Linkiana og polypodioides, hvis Plads i hin Slægt ikke forekommer mig ganske naturlig. Da imidlertid nöiagtig Undersøgelse af alle Slægtscharaktererne viste en ny Polypodium, har jeg ikke kunnet undlade at opføre den paa denne Plads. Arten har habituel Lighed med P. Plumieri Desv. Plum. fil. t. 47.

Ved denne Leilighed synes det Spørgsmaal med Rette at kunne fremsættes: gives der bestemte Charakterer mellem Gymnogramme, Grammitis og Polypodium. Dersom man, saaledes som de fleste nyere Pteridographer, opfører Former med runde Sori iblandt Gymnogramme eller Grammitis, Former med aflange Sori iblandt Polypodium, maa vi tilstaae, at vi ikke længer have nogen eneste faststaaende Charakteer tilbage, hvorved disse Slægter lade sig adskille. Exempelvis vil jeg fremhæve det vilkaarlige, og derhos unaturlige i at henføre Gymnogramme (Grammitis) polypodioides Sprl, G. villosa Lk., G. Linkiana Kze. til en Slægt, og Polypodium rude Kze., P. concinnum W., P. exsudans Liebm. til en anden: De høre nødvendigvis sammen i en Slægt, deres Habitus og alle Enkeltheder i deres Charaktere vise den største Affinitet. Jeg troer det vil være rigtigt at føre dem alle til Polypodium, og det især af den Grund, at Sori hos G. polypodioides Sprl., villosum Lk., ja selv hyppigt hos P. Linkiana Kze. ere fuldstændig udviklede i Begyndelsen runde, men siden blive meget formløse ved Afslad af Kapsler; ved Herbarieexemplarer bliver det især Tilfældet ved Presning og Afgnidning. Angivelserne hos Forff. om Frugthobenes Form hos disse Arter ere ogsaa modsigende. Link. hort. Berol. v. 2. p. 51. siger om Gymn. polypodioides (= G. Linkiana Kze): sori initio subrotundi, demum super nervos laterales partim effusi, og strax derpaa i Beskrivelsen: sori subrotundi at minus circumscripti ac in Polypodiis, hinc inde in formam oblongam aut linearem transeuntes. Derimod hedder det i samme Forf.'s Fil. spec. h. Berol. p. 136 om samme Art: sori initio depauperati demum completi lineares. Den første Beskrivelse fandt jeg mest overestemmende med Sandhed. Om G. villosa Lk. hedder det i h. Berol. v. 2. p. 51: sori initio subrotundi, demum partim effusi. Man vil ved nærmere Overveielse af disse Angivelser see, at der j. al Fald er mere Grund til at henføre disse Arter til Polypodium end til Gymnogramme eller til Grammitis, hvortil Presl henfører dem. Dette bliver til en Nødvendighed af Conseqvents ved Sammenligning med Polyp. rude Kze., P. exsudans Liebm. P. rude med sine smaa, først runde, senere noget aflange Sori, nærmer sig saa sterktil G. polypodioides, at man vilde være i sin gode Ret ved at henstille den iblandt Gymnogramme. En tilkommende Systematiks Sag vil det upaatvivlelig blive at forene disse kunstigen i forskjellige Slægter adskilte Arter.

51. **Polypodium glanduliferum** Liebm.:

fronde tenuissima utrinque punctis glandulosis obsita, 4—8 poll. long., 1—3 poll. lata, stipite 1—3 poll. longo, lanceolata, bipinnato-pinnatifida, pinnis primariis suboppositis sursum alternis divergentibus subsessilibus remotiusculis lanceolatis acuminatis acutis; pinnulis alternis elongatis inaequilateris, infimis sessilibus basi oblique acute cuneatis, sursum adnatis basi inferiori decurrentibus, profunde pinnatifidis sursum sensim confluentibus, laciiniis patulis remotiusculis infimis oblique-ovatis ceteris lanceolatis apice obtusiusculis margine irregulariter adpresso

dentatis, sinubus curvatis acutis, venis simplicibus, soris in dorso medio venarum adfixis castaneis numerosis; rhachi universali antice applanata marginata, postice convexa, partialibus alatis, stipite tenui antice canaliculato postice convexo, squamis lanceolatis acutis membranaceis hyalinis carneis basi nigricantibus obsito. Rhizoma parvum globosum squamis carneis linearibus obsitum, frondes 3—4 emittens.

Denne fine herlige Bregne voxer i stor Mængde selskabeligen paa vaade Klipper, som overskygges af Krat, imellem Trapiche de la Concepcion og Comaltepec i Dep. Oajaca (2500').

Det er en meget udmærket Art, meget afvigende fra alle mig bekjendte Former, og i Habitus snarere lignende en Cheilanthes, f. Ex. Ch. Schimperi Kze. end en Polypodium.

* * venis furcatis aut ramosis.

52. Polypodium angustifrons Kze. Addit. l. c. p. 134.

Denne mig ubekjendte Art, som allene efter Sammenligningen med *P. monosorum* Desv. stilles paa dette Sted i denne Afdeling, er af Prof. Kunze opstillet efter Exemplarer sendte af Dr. Schiede fra las Trojas.

53. Polypodium Sloanii Kze. Syn. fil. Poepp. Linnaea v. 9. p. 51. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 322. *P. Galeottii* Mart. & Gal. l. c. p. 43. t. 7 fig. 3. (mala!)

Denne storløvede (6 Fod) Bregne findes paa skyggefulde Steder i Skove og Baranker i Østsids tempererte Region imellem 2—3000 Fod. Jeg fandt den hyppig omkring Hac. de Mirador i Marts og November, i Baranca de Huitamalco i Mai, og i en Skovkløft paa Hac. de Jovo i samme Maaned. Leibold fandt den i den tempererte Region; Galeotti paa Klipper og i fugtige Skove om Zazuapan. Det glæder mig at kunne befrie Videnskaben fra en slet begrundet Art, som allerede paa Forff's Autoritet begyndte at finde Indgang, medens den dog kun skylder overfladisk Undersøgelse sin Oprindelse, jeg mener *P. Galeottii*. Som den, der er meget nøje bekjendt med de botaniske Forhold i den Deel af Mexico, hvorfra Herr Galeotti har bragt sin formeentlig nye Art, kan jeg forsikke, at sammesteds ikkun findes den med Kunzes Beskrivelse af *P. Sloanii* overenstemmende Bregne. Forff's Beskrivelse vidner noksom om Flygtighed, og dette gjælder i højeste Grad om Afbildungen, som er et rent Phantasystykke, og bærer de tydeligste Præg paa Tegnerens Mangel paa Sagkundskab. Det vil ikke være nødvendigt at oplyse dette videre, kun skal jeg bemærke, at den paastaadte Mangel paa Skjælbeklædning af Stængel og Lövaxe, hvorpaa en af de vigtigste Forskjelligheder af *P. Galeotti* fra *P. Sloanii* beroer, ikke existerer uden paa gamle afgnede Exemplarer, hvorpaa dog nedhængende Trevler vise Beskaffenheden af den tidlige Beklædning. Laciniae integerimæ opstaae ogsaa kun derved, at der ikke tages Hensy til at Randen er tilbagerullet, hvorpaa den svage Indkaryning findes. Endelig

maa bemærkes, at fig. 3. a. fremstiller Nervationen, som for det meste er tydelig kløftet, paa en aldeles naturstridig Maade. P. Sloanii har forøvrigt en saa stor Lighed i Lövet med Alsophila Schiedecana, at man først ved Undersögelse af Ringens Bygning, og ved Mangelen af ophöjet Receptaculum overbevises om ikke at have en Alsophila, men en virkelig Polypodium for sig.

53. *Polypodium alsophioides* Liebm.:

fronde tenuiter coriacea $1\frac{1}{2}$ pedali, stipite 6—7 poll. longo, lato-lanceolata tripinnato-pinnatifida sursum minus composita; *pinnis primariis* suboppositis alternis patulis remotis petiolatis, *secundariis* alternis divergentibus divaricatisse, elongato-lanceolatis, inferioribus brevi-petiolatis basi cuneatis, sursum adnatis basi inferiori parum decurrentibus; *pinnulis* $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ poll. longis, 2—3 lin. latis, elongatis sessilibus adnatis basi inferiori cuneato-decurrentibus, apice obtusis, pinnatifidis, laciniis falcato-ovatis, apice truncato-rotundatis, margine parum revolutis obsolete repandulis, sinibus angustis acutis, *pinnulis* sursum sensim confluentibus falcato-crenatis; pagina anteriori atroviridi, posteriori olivacco-virente, venis simplicibus furcatisse, costula utrinque prominula squamulis bullatis adpressis adpersa, soris in medio dorso venarum affixis majusculis cinnamomeis seriatis, rhachibus tertiaris utrinque prominentibus fuscis antico squamulis setosis brevibus adpressis, postice squamis monbranaceis tenuissimis bullatis instructis, rhachi universali secundariis stipiteque subtetragonis, antice canaliculatis postice convexis villo detergibili rufo squamisque membranaceis hyalinis obductis. Rhizoma subterraneum breve squamosum, frondes 3—5 emittens.

Voxer paa skyggefulde Bjergsider i Nærheden af Trapiche i Dep. Oajaca paa 3000 Fods Höide.

Lövets Lidenhed fraregnet, har den Lighed med en Alsophila. Den indrangeres i Nærheden af *Polypodium amplum* Humb.

54. *Polypodium dilatatum* Liebm.:

fronde herbacea ampla 3—4 pedali, stipite $1\frac{1}{2}$ pedali, lato-lanceolata supradecomposita, quadripinnato-pinnatifida; *pinnis primariis* alternis remotis petiolatis, *secundariis* alternis petiolatis lanceolatis acuminatis acutis, *tertiariis* alternis brevipetiolatis inaequilateris $1\frac{1}{2}$ circ. poll. longis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ poll. latis, lanceolatis acutis, *quaternariis* sessilibus alternis, infimis basi utrinque cuneatis, sursum adnatis sensim confluentibus, omnibus alato-decurrentibus, oblique-ovatis vel elongato-ovatis acutis, pinnatifidis, laciniis falcato-lanceolatis acutis margine incrassato parum revoluto obsolete repandulis, sinibus angustis acutis; colore utrinque læte viridi, venis simplicibus furcatisse; soris dorso medio venarum affixis rotundis cinnamomeis in quavis lacinia solitarii; costa utrinque prominulis glabris, *rhachibus* *quaternariis* utriusque elevatis cinnamomeo-puberulis alatis, *tertiariis* secundariis universalique

stramineis nitidis, antice canaliculatis, sulco cinnamomeo-puberulo, marginatis, postice convexis glabris; stipite bisulcato glabro.

Denne store hidtil i Mexico overseeete Bregneart er udbredt i de østlige varm-tempererte Skove og Baranker især paa 3000 Fods Höide. Jeg fandt den ved Mirador og ved Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca, frugtbærende i Juli og November.

Af de beskrevne Arter nærmer den sig mest til *P. effusum* Sw. og *P. divergens* Jacq.; er forskjellig fra begge.

55. *Polypodium longicaudatum* Liebm.:

fronde tenuiter herbacea glaberrima 3—4 pedali, 10—12 pollices lata, stipite pedali, lato-lanceolata acuminate acuta, deorsum pinnata, sursum pinnatisecta, demum pinnatifida, pinnis inferioribus suboppositis 6—7 poll. longis, pollicem latis petiolatis (petiolis 3—4 lineas longis basi dilatatis) linear-lanceolatis longissime acuminatis acutis patentibus falcatis grosse et irregulariter crenatis, basi oblique cuneatis; pinnis insequentibus sessilibus alternis basi inferiori adnatis; dein sursum pinnatisecta sensim decrescente, laciiniis pinnis similibus basi superiori adnatis inferiori rotundato-auriculatis et oblique alato-decurrentibus, sinibus acutis angulatis; apice frondis solummodo pinnatifido, laciiniis falcato-lanceolatis repandis; costa antice canaliculata postice convessa, venis utrinque prominulis flavidis parallelis alternis pinnato-ramosis, ramulis suboppositis patentibus incurvatis liberis 2—3 paribus medio dorso soriferis, soris junioribus minutis nigris, adultioribus majoribus fuscis; rhachi stipiteque antice canaliculatis postice convexis; stipite squamis membranaceis brunneis lanceolato-ovatis obtusiusculis deciduis sparsis instructo.

Rhizoma subterraneum breve crassiusculum, frondes cæspitosas emittens.

Denne udmarkede Bregne opdagedes i den dybe skovdækte Baranca de Huitamalco i Dep. Vera Cruz paa henimod 2000 Fods Höide paa fugtige skyggefulde Steder i stor Mængde, og rigelig fructificerende i Mai.

F. *Goniopteris* Presl: venis pinnatis frondem lineantibus, infimis 1—4 superioribus et tot oppositis inferioribus in arcum acutangulum anastomosantibus, venula ex apice anguli in sinum laciniarum exurrente; soris medio dorso incidentibus globosis parvis.

56. *Polypodium faucium* Liebm.:

fronde coriacea 1—1½ pedali, 7—9 pollices lata, stipite 6—10 pollicari, lato-lanceolata acuminate pinnata, pinnis 6 poll. longis, pollicem et insuper latis, terminali longiori latiori, alternis aut suboppositis patulis petiolatis (petiolis 1—2 lineas longis), 4—6 utriusque lateris elongato-ellipticis utrinque attenuatis, basi oblique cuneatis, margine subpinnatifido-grosse-crenatis, crenis 1½—2 lin. longis, 2lin. latis, margine scabriusculis sursum et deorsum decrescentibus sensim evanescitibus, apice longe acuminatis acutis integris; pagina anteriori atrovirente nitida glabra, posteriori

dilutiori; costa antice canaliculata glabra, postice acuta, marginata puberula, venis utrinque prominulis postice scabriusculis parallelis pinnato-ramosis, ramis 4 oppositis in arcum anastomosantibus, venulis 2 infimis ex angulo ramorum prodeuntibus liberis apice clavato terminantibus, reliquis 2 in sinum crenarum procurentibus; soris medio dorso venarum affixis minutis rufis; rhachi stipiteque antice canaliculatis postice angulatis, sursum rufo-puberulis, deorsum glabrescentibus. Rhizoma subterraneum cæspitosum.

Af Underslægten *Goniopteris* var hidtil kun en Art, *P. tetragonum* bekjendt fra Mexico, og i det hele taget ere kun faa Arter bekjendte fra America. Desto behageligere har det været for mig at berige Videnskaben med tre nye Arter, der alle hører til de sjeldneste forekommende Former i Mexico. Den nærværende Art opdagedes i den plante-rige Baranke ved Arroyo de Isapa paa Hac. de Jovo (Dep. Vera Cruz), en Station, som har leveret mig en stor Mængde mærkelige nye Planteformer.

P. faucium nærmer sig til *P. fraxinifolium* Jacq., adskiller sig ved kortstilkede Finner, dybere Karvning af Randen, Mangelen paa Øre hos Endefinnen, Nervationen, som hos denne har 4 sammenstødende Aaregrene, hos hin ikkun to, Beklædningen af Lövaxen, Undersiden af Middelribberne, Aarerne og Randen. Fra *P. crenatum* Sw. adskilles den ved langstrakte elliptiske Finner, dybere Indskjæring, Nervationen, som hos *P. crenatum* har et større Antal sammenløbende Aaregrene. Mærkelige ere de to nederste fric ikke ud-løbende Smaaaarer, som udspringe fra den øvre Vinkel af de sammenstødende Aaregrene.

57. *Polypodium imbricatum* Liebm.:

fronde tenuiter coriacea, pedali, 6–7 poll. lata, stipite 6 pollicari, lato-ovata pinnata, pinnis 4–5 poll. longis, pollicem circiter latis, 6–7 cujusque lateris alternis suboppositis patulis elongato-lanceolatis brevipetiolatis sursum sessilibus, basi oblique rotundatis obtusissimis, margine pinnatifidis, laciiniis 3 lineas longis 2½ lin. latis falcatis obtusis approximatis subimbricatis margine obsolete repandis ciliolatis, sinibus angustissimis acutis, apice repando brevacuminatis, pagina anteriori atrovirente nitida glabra, posteriori opaca scabriuscula, costa antice canaliculata, postice convexa utrinque pilosula, venis utrinque prominulis pinnato-ramosis, ramo infimo cum opposito in arcum acutangulum anastomosante, indeque in sinum laciinæ procurrente; pinna terminali ovata acuminate 3 poll. longa, pollicem et insuper lata, laciiniis ½ poll. longis; stipite rhachique tenuibus tetragonis incano-pilosis, antice obsolete canaliculatis. Rhizoma subterraneum

Differt a præcedente: fronde breviori minus acuminate, pinnis minoribus basi oblique et obtusissime rotundatis, margine profundius incisis, nervatione omnino diversa, stipite rhachique tenuioribus, cet.

Dette er en af de sjeldneste Bregner, som i Mexico ere komne mig for Øie; ikkun engang har jeg truffen den i Skoven ved Papantla (Dep. Vera Cruz) i Mai.

Med Hensyn til Nervation og Fligernes Form ligner den *P. appendiculatum* Blume (Presl Pter. t. 7 f. 11), men adskiller sig i mange andre Henseender fra denne javanske Art.

58. ***Polypodium meniscooides* Liebm.:**

fronde rigida coriacca, bipedali, $1\frac{1}{2}$ ped. lata, stipite 6—8 pollicari, lato-ovata pinnata, pinnis inferioribus suboppositis brevipetiolatis, superioribus alternis sessilibus 8—9 cujusque lateris distantibus subhorizontalibus, 7—9 poll. longis, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ poll. latis, elongato-ellipticis longe acuminatis acutis rectis aut leviter deflexo-falcatis interdum leviter sigmaeideis, basi oblique cuneatis, margine integro undulatis, costa antice canaliculata glabra, postice acuta marginata puberula, venis utrinque prominulis flavidis parallelis regulariter pinnato-ramosis, ramulis 10 cujusque lateris oppositis e costa ad marginem usque in arcos acutangulos anastomosantibus, venulis ex angulo supero cujusque arcus brevibus liberis nec confluentibus (2—3 supremis solummodo exceptis) prodeuntibus; soris medio dorso ramulorum insidentibus (ideoque 10 serialibus) junioribus minutis nigris, adultioribus rufis; stipite rhachique fusco-puberulis antice et ad latera canaliculatis postice acutangulis.

Denne smukke Bregne, som udmærker sig ved sit store læderagtige Löv, og fornemmelig ved sin Nervation, der i en langt höiere Grad end Pol. (Marginaria) meniscifolia Langds. & Fisch. ligner en Meniscium, voxer i de tykke varme fugtige Urskove i Districtet Chinantla Dep. Oajaca imellem 3—5000 Fods Höide; f. Ex. ved Teotacingo.

Der gives ingen Art af denne Underslägt hvormed den kan forvexles, eller hvorfra Forskjellen behöver at udhæves. Den hele bølgede selv stundom foldede Rand af de seglformig nedadböiede eller undertiden svagt S-formig böiede Finner, og fornemmelig Nervationen, som er aldeles den samme som hos *Meniscium sorbitifolium* (cfr. Presl Pterid. t. 9 f. 6) betegner den noksom.

59. ***Polypodium tetragonum* Sw.** Schk. Farrn. t. 18. b. Kze. fil. Leibd. I. c. p. 322. Mart. & Gal. I. c. p. 43.

Findes i Östkystens fugtige Skovregion indtil henimod 3000 Fods Höide. Jeg fandt den ved Indierbyen Pital ved Rio Nautla i Mai, ligeledes ved Colipa; Galeotti anfører den fra Zazuapan, Leibold fra reg. temp.

Tvivlsomme.

***Polypodium (Amblia) juglandifolium* Willd. (?)** Mart. & Gal. I. c. p. 40.

Anføres af Galeotti som voxende paa Træer og vulkanske Conglomerater ved Zazuapan, og fra Llano verde i Dep. Oajaca 7000' paa Kalkklipper.

Besidderne af Galeottis solgte Samlinger maa det tilkomme at give Oplysning om No. 6282 og 6343 virkelig er den angivne *P. juglandifolium*.

Polypodium (Dictyopteris) irregularare Presl. Rel. Hæk. 1 p. 25 t. 4 f. 3.
Ej. Pteridogr. p. 194 t. 8 f. 7.

Angives uden nærmere Opgivelse af Voxestedet som samlet af Hænke i Mexico, men dette beroer vist paa en falsk Etiquette. Det maa nemlig erindres, at Underslagten Dictyopteris tilhører det sydøstlige Asien og Nyholland, og der er langt større Rimelighed for, at den hænkeske Plante er tagen paa Luxon end i Mexico. Det har ogsaa været mig paaafaldende at see Presl i Pteridographien p. 194 skrive: Species (Dictyopteridis) una extratropica Novo-Hollandica reliqua intratropicæ *indicæ*, uagtet han selv i Rel. Hæk. har anført P. irregularare som mexicansk, og det ikke er mig bekjendt, at han andetsteds har tilbagekaldt dette.

Tillæg.

1. b. **Polypodium lanceolatum (L?)** Nees v. Esenb. Linnæa v. 19. p. 683.

Aschenborn exsicc. n. 194 og 704. Formodentlig fra Omegnen af Hovedstaden Mexico.

Men dette ikke snarere skulde være den i Mexico hyppige lidet skjællede eller næsten glatte Form af P. lepidotum W., der her er blevet henført til P. lanceolatum?

8. **Polypodium incanum Sw. ♂ umbrosum Liebm.:**

fronde tenuiori longiori, 7—9 poll. longa, $\frac{2}{3}$ ad pollicem lata, stipite 2—3 poll. longo, laciiniis antice nudis, postice multo sparsius ac in forma typica squamulosis.

Voxer i varme skyggefulde Skove i Districtet Chinantla Dep. Oaxaca; saaledes ved Teotalcingo (4—5000') paa gamle Træstammer. Paa Grund af den betydelig større Udvikling af alle Lövets Dele, og den deraf følgende sparsommere Skjælbedækning paa Lövets Underside kan man let ved første Betragtning af Planten antage den for en egen Art.

38. **Polypodium macrocarpum Presl.** Nees v. Esenb. I. c.

Sendt fra Mexico af Aschenborn.

48. b. **Polypodium lanuginosum Nees v. Esenb. I. c.**

Sendt fra Mexico af Aschenborn.

Forf. gjør selv opmærksom paa Artens Slægtskab med P. concinnum, og jeg giver den derfor Plads efter hin. Beskrivelsen er Forresten alt for kort til at man kan opfatte Arten. Den synes i nogle Henseender at nærme sig til min P. litigiosum, men denne er fuldkommen finnet-halvfinnet, ikke dobbelt halvfinnet, Finnerne ere tilspidsede, ikke budte, Beklædningen meget finhaaret, ikke blöddunet, o. s. v.

Notochlæna R. Br.

* species stellato-pilosæ.

1. ***Notochlæna sinuata* Kaulf.** Kze Farrn. p. 95 t. 45! Ej. Addit. I. c. p. 135. Ej. fil. Leibd. I. c. p. 324. Mart. & Gal. I. c. 45. Presl Rel. Hæk. I. p. 49. Nees v. Esenb. in Linnaea v. 19. p. 683.

Denne i de botaniske Haver nu saa almindelig blevne Art har en meget viid Udbredning i Mexico fra 2000 indtil over 7000 Fods Höide. Den voxer selskabelig i Klippekløfter, fornemmelig paa Trachyt og Conglomerater. Jeg fandt den paa golde solbrændte Trachytklipper paa Randen af Baranca de Consoquita, Ö. for Mirador, omkring Tehuacan de las granadas (5000'), og ved Chinautla (Dep. Puebla, 7—7500'). Schiede fandt den paa Murene af Jalacingo, i Lavaspækker af det saakaldte Malpays de Naulingo; Andrieux fandt den paa Cerro de S. Felipe; Thibaud ved Guadelupe i Nærheden af Mexico; Karwinski og Hegevisch i Omegnen af Mexico; Galeotti paa Trachytklipper i Baranca de Rio grande de Lerma ved Guadalaxara (3—4000'); De Berghes og Aschenborn ved Chapultepec.

- N. ***sinuata* var. *integra*.** N. lavis Mart. & Gal. I. c. p. 46. Kze fil. Leibd. I. c. p. 323.

Galeotti angiver denne med Urette som ny opstillede Art ikkun fra de vulkanske Klipper ved Sola i Dep. Oajaca 6500'; den er dog ligesaa udbredt som Hovedformen, og findes sædvanlig sammen med denne, hvilket allerede antyder Identiteten.

Dér er ikke den ringeste Anledning til med Martens og Galeotti at opstille denne som egen Art. Benævnelsen N. lavis kan ikke tænkes uheldigere. Enhver, der har seet N. sinuata i dens Fødeland vil have seet Finnernes Overflade saavel paa Hovedformen som paa denne Afart, sædvanlig bedækkede med et graat Lag af stjerneformige Haar, men ogsaa ganske glatte ved Haarbeklædningens Afgnudning. Lige saa uholdbare ere de øvrige angivne Charakterer for N. lavis. Det er urigtigt, at Finnerne ere fjernlægende, de ere netop tættere end paa Hovedformen, fordi Formen tilkjendegiver en yngre Tilstand eller en sparsommere Ernæring. Det eneste Forhold, som synes at kunne beholde nogen Vægt er Finnernes hele og svagt indtrykte Rand, men hertil sees idelige Antydninger paa den større mere udviklede Hovedform, navnlig i Spidsen og ved Grunden. Skjælbeklædningen er den samme, Skjællenes Form ligesaa, hvilket være sagt med Hensyn til Kunzes Ytring (I. c.) om Forskjel i denne Henseende. Den knollede Rodstok og sammes tætte rustrøde Uldbeklædning ere fuldkommen lige; kort vi see etter her en usornöden opført ny Art, som maaskee knap fortjener at antegnes som Afart.

- 2. Notochlæna rufa Presl.** HBK. Syn. 1. p. 68. H. B. nov. gen. 1. p. 3. Kze Addit. I. c. p. 135. Ej. fil. Leibd. I. c. p. 324. Mart. & Gal. I. c. p. 43. Cheilanthes ferruginea W. Schlechtl. Linnæa 5. p. 615. Notochlæna trichomanoides (non R Br.) Mart. & Gal. I. c. p. 45. Pellæa ferruginea N. ab E. in Linnæa v. 19. p. 684.

En af de almindeligste Bregner i de høiere Cordillererregioner imellem 6500—8000 Fod; den voxer selskabelig i Klippeklofter, paa Steengjælder, og findes i Frugt hele Aaret. Jeg fandt den paa Klipper ved Yavesia i Dep. Oajaca (7—7500'), i Klofter paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7000'), ved Chinautla Dep. Puebla 7—8000', ved Talea i Oajaca. Humboldt og Bonpland angive den fra Sta Rosa ved Guanaxuato paa 1420 Toisers Höide. Schiede fandt den paa Hacienda de la Laguna, i Malpays de Naulingo, imellem Tenestepque og Quantotalapa, endelig paa Mexicos Vestsidé i Playa de Jorullo. C. Ehrenberg fandt den ved de varme Kilder ved el Grande; Galeotti ved S. Pedro, ved Real del monte (7—8000'), paa Lava og Basalt ved Zimapan ved Rio Tula (6500—7000'), ved Sola i det østlige Oajaca (7500—8000'); Aschenborn ved Chapultepec. Urigtigt er det, naar Leibold angiver reg. subtropica som denne Bregnes Zone.

3. Notochlæna bipinnata Liebm.:

fronde rigida coriacea incana 7—8 pollices longa, 1½ poll. lata, stipite 2—2½ poll. longo, elongato-lanceolata acuminata obtusiuscula, bipinnata, pinnis alternis pollicem circiter longis 2½ lin. latis linearibus obtusis sessilibus patulis circinato-involutis, 20—30 cujusque lateris, sursum decrementibus magisque approximatis pinnato-pinnatifidis demum pinnatifidis; pinnulis sessilibus oppositis divergentibus 1½ lin. longis lineam latis, 9—10 cujusque lateris cordato-lanceolatis obtusis basi superiore rotundato-subauriculatis ceterum integris, sursum confluentibus; pagina anteriore pinnarum pilis stellatis incana, posteriori squamis lanceolatis umbilicatis adpressis longissime ciliatis incano-rufis obsita; costis costulisque omnino tectis; sporangiis marginalibus inter squamas immersis globosis castaneis, sporis sphæricis nigris; stipite rhachique tibus squamosis, squamis lanceolatis intus rufo-reticulatis margine hyalino-ciliatis, denudatis nigerrimis.

Rhizoma subterraneum breve cæspitosum squamis rigidissimis adpressis lanceolatis acutis margine laceris glanduloso-ciliatis obsitum.

Tilhører de tørre Kalkklipper af Juraformationen V. for Tehuacan over Landsbyen S. Lorenzo (5400'), voxende i Klofter, og fructificerende i December.

Den udmarkrer sig ved sin overordenlige Elasticitet, hvorved den spiralformig indruller sin Hovedaxe, Finernes Axer og Smaafinnerne. Ikkun Opbloden i kogende Vand og stærk Presning formaer at skaffe den udbredt, men alligevel sammenruller den sig siden atter i Herbariet. Denne Egenskab finde vi i høi Grad hos de Bregner og Lycop-

diaceer, som beboe de tørre Klipper i Mexicos Indre, saaledes *Notochlæna cretacea*, N. *pulveracea*, *Cheilanthes pulveracea*, *Selaginella leptophylla*.

* * species farinosæ.

- 4. *Notochlæna pulveracea* Kze** Addit l. c. p. 135. (excl. syn. *Cheilanthes pulveracea* Presl), Kze fil. Leibd. l. c. p. 338. *Cheilanthes candida* Mart. & Gal. l. c. p. 73 t. 20. f. 1. (mediocris).

Det er en uheldig Skjæbne, der har svævet over denne Bregne i Videnskaben. Først opstillet af Prof. Kunze som en *Notochlæna*, forvexledes den med *Cheilanthes pulveracea* Presl, ogsaa mexicansk, men aldeles forskjellig, og under Forudsætning af disse to Planters Identitet blev den ikke beskrevet af denne fortinlige Forsker. Endnu i Kunze's *Farrnkräuter* p. 44 ansees disse to Planter for identiske. Først 1844 retter Kunze dette i *Linnæa* v. 18 p. 338, men han henfører dernæst *Cheilanthes candida* Mart. & Gal. t. 20 f. 1 a til N. *pulveracea* Kze, medens t. 20 f. 1, ligesom ogsaa Beskrivelse og Localiteter af *Cheil. candida* skal henhøre til *Cheilanthes pulveracea* Presl. Dette kan jeg ikke give Medhold. Saavel efter Beskrivelsen som Afbildningen i Martens og Galeottis Memoire, hvorvel begge ere maadelige og uvidenskabelige, maa jeg paastaae, at Ch. *candida* = *Notochlæna pulveracea* Kze, og ikke *Cheilanthes pulveracea* Presl. Men saaledes viser den omhandlede Bregne sig i det hele taget som ikkun meget ufuldkommen kjendt, idet vor hele Kundskab om samme reducerer sig til den i Mart. og Gal. Memoire givne, der lader meget tilbage at ønske. Det er saaledes nødvendigt at udkaste en ny Beskrivelse af Arten, for at sikre den for fremtidig For vexling.

Frons tenuiter coriacea supra glabra dilute viridis subtus tartaréo-albescens, 6—10 pollicaris, 3—4 poll. lata, stipite 4—6 pollicari, bipinnato-pinnatifida, sursum pinnato-pinnatifida, apice pinnatifida, lato-lanceolata acuminata obtusiuscula, pinnis laciniisque oppositis suboppositis divergentibus scissilibus, pinnis inferioribus 2—2½ poll. longis ad basin pollicem latis inaequilateris elongato-deltoideis apice obtusis, pinnulis adnatis profunde pinnatifidis, laciniis oblique ovatis obtutis sursum decrescentibus basi decurrentibus; pin-nis mediis 1½—2 poll. longis ad basin ¼ poll. latis; summis subintegris adnatis decurrentibus; stipite rhachique, costis costulisque nigerrimis nitidis teretibus fragillimis, venis immersis omnino inconspicuis, sporangiis marginalibus nudis majusculis sphæricis nigris nitidis, annulo densissime articulato, sporis sphæricis obscuris minutissime granulatis.

Rhizoma brevissimum cæpitosum.

Den findes især paa solabne tørre vulkanske Klipper i Sprakker, sandsynligvis temmelig udbredt i Østcordillerernes tempererte Region, og i det indre tørre Høiland. Jeg fandt den paa tørre Trachyklipper i Potrero de Consoquilla Ö. for Mirador i November.

Galeotti traf den i Baranca de Rio grande de Lerma N. for Guadalaxara (2500—4000'); efter Kunze er deu samlet af Karwinski uden Angivelse af Stedet.

5. *Notochlæna cretacea* Liebm.:

fronde coriacea 6—9 poll. longa, lamina $1\frac{1}{2}$ —2 pollices longa, $1\frac{1}{2}$ poll. lata, stipite 5—7 pollicari, subrhomboidea parum acuminata obtusa bipinnato-pinnatifida, sursum crescente pinnato-pinnatifida, demum pinnatifida, pinnis patulis oppositis sessilibus adnatis, infimis basin versus pinnato-pinnatifidis sursum pinnatifidis, inaequilateris, latere exteriori imprimis basin versus superius superante, deltoideis, pollicem longis et latis, pinnulis lanceolatis obtusis alternis, lacinii suboppositis oblique ovatis obtusissimis decurrentibus, sinubus acutis curvatis; pinnis mediis lanceolatis ceterum similibus; pagina anteriori viridi globulis cretaceis adpersa, posteriori strato denso cretaceo flavidio-albo obducta; rhachi costisque antice leviter canaliculatis pulverulentis, postice convexis nigris; sporangiis majusculis marginibus fuscis, sporis sphæricis nigris; stipite tereti nigerrimo nitido basin versus hic illic squamis membranaceis lanceolatis brunneis instructo.

Rhizoma subterraneum obliquum breve cæspitosum squamis rigidis lanceolatis margine membranaceo lacero adpressis obsitum.

Voxer selskabelig i Kløfter af bratte Kalkklipper over S. Lorenzo i Nærheden af Tehuacan (5400'); samlet i Frugt i December.

Udentvivl en af de smukkeste Arter af Slægten, og let adskillelig fra alle hidtil bekjendte.

Tvivlsom.

***Notochlæna nivea* Desv.** Kze Farrn. p. 43. t. 22. f. 1. *N. incana* Presl Rel. Hænk. 1. p. 19 t. 1. f. 2.

Den eneste Angivelse for denne Bregnes Forekomst i Mexico er den i Reliquæ Hænkeanæ indeholdte: i Mexico uden nærmere Betegnelse, men er som i det Hele Sted-angivelserne i højt Værk meget usikker. Bregnens er udbredt i Syd-America paa Perus og Chiles Cordillerer, paa St. Juan Fernandez, og det er formodentlig et peruanisk Exemplar i Hænkes Samling, som ved Forbytning af Etiquetten, har givet Anledning til dens Opförelse iblandt Mexicos Bregneformer.

Allosorus Bernh.

Der gives neppe nogen Slægt iblandt Bregnernes Familie, der frembyder flere Van-skigheder end denne. For det første er Slægtens Begrænsning hos Forfatterne yderst

vaklende, navnlig er Adskillelsen fra Cheilanthesaabenhbart mere afhængigt af et subjectivt Skjön end af faststaaende Charakterer. Man sammenligne Slægtscharaktererne hos de bedste Forff., og man vil overbevise sig om, at der ikke bliver et eneste sikkert Mærke tilbage, hvortil man kan holde sig; og undersøge vi Rækken af Arter, da ville vi ofte finde os i den største Forlegenhed, hvis vi skulde anføre Grunden for disses Opstilling i den enc eller anden af disse to Slægter. I et specielt Afsnit som nærværende er det ikke Stedet at oplyse dette vidtløftigere. Det være nok her at paapege den systematiske Brøstfældighed, somaabenhbart findes paa dette Sted, og som det maa være Fremtiden forbeholdt at raade Bod paa. End flere Vanskeligheder frembyder Arternes Bestemmelse, idet de allerfleste ere saa mangelfuld beskrevne, at det uden Adgang til Sammenligning af Original-Exemplarer grændser til Umulighed at gjenkjende Arten. De af Kunze, Hooker og nogle ganske faae Andre beskrevne Arter gjøre naturligvis herfra den hæderligste Undtagelse. Man kan ved denne Lejlighed vel opkaste det Spørgsmaal, bør der tages Hensyn til disse slet beskrevne Arter, som snarere hemme end fremme Videnskaben, idet de let foranledige, at virkelig forskjellige Planter forenes paa Grund af Artsbeskrivelsens Ufuldstændighed? Er ikke Beskrivelsen det Vigtigere, det i Videnskaben Blivende, af en langt höiere Betydning end Original-Exemplaret, hvis Bevarelse i den enkelte Sanling er saa mange Eventualiteter underkastet, og fra hvis Afbenyttelse det store Fleertal af Videnskabsmænd er udelukket. Hvis Naturforskerne bleve enige om ikke at tage Hensyn tilaabenhbart slette Artsbeskrivelser, (Overfladiskhedens og Uvidenskabelighedens leterhvervede Adkomstbreve til formentlig Berömmelse) saadanne, hvorefter Ingen med Sikkerhed kan gjenkjende Arten, da vilde Forfængeligheden, denne Hovedkilde til megen slet anvendt Virksomhed i Videnskabens Tjeneste, let opgive sin upaaagtede Færd, idet det vilde blive mere og mere erkjendt, at den eneste virkelige Adkomst til litterær Ære kun vindes ved dygtige, Videnskaben i Sandhed fremmende, Arbeider.

I denne Fremstilling af Mexicos Bregner begrændser jeg Slægterne *Pteris*, *Allosorus* og *Cheilanthes* saaledes:

Pteris: soris marginalibus linearibns continuis, indusio marginali angusto integro.

Allosorus: soris marginalibus submarginalibusve confluentibus, indusio aut obsoleto aut completo angusto continuo ciliato crenulatove.

Cheilanthes: soris marginalibus subrotundis vix confluentibus, indusio ex apicibus laciniarum reflexis orto scarioso interrupto aut continuo laciniato.

1. **Allosorus ciliatus Presl** Rel. Hæk. I. p. 59. Kze fil. Leibd I. c. p. 325. Mart. & Gal. I. c. p. 48 (excl. syn. Link.) *Cheilanthes marginata* HBK. nov. gen. I. p. 18. et I. 669. Link. h. Berol. 2. p. 39. *Cheil. rufescens* Link. h. Berol. 2. p. 39. Ej. fil. spec. h. B. p. 62. *Allosorus chærophylloides* Mart. & Gal. I. c. p. 47. t. 11.

Hører til de mest udbredte Bregner i Mexicos høiere Bjergregioner voxende i Klippekløfter. Jeg fandt den omkring Chiautla (Dep. Puebla) 7000'; paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7—8000'). Schiede fandt den ved Jalapa (4500'), las Trojes, Polverillos ved Mexico. Sendt fra Villalpando (Guanaxuato), og Toluca-Dalen af en ukjendt Samler. Galeotti ved Juquila paa Dep. Oajacas Vestside (5—6500'), Pico de Orizaba 10—12000' (?). Leibold angiver blot rup. reg. temp.

Mine Exemplarer ere ikke over 8 Tommer lange. Den varierer temmelig i Habitus, især ved Fligenes forskjellige Brede. Af de forskjellige Beskrivelser anseer jeg Kunths i HBK. nov. gen. I. p. 18. for den bedste. Link adskiller Ch. rufescens fra Ch. marginata, men Forskjellen synes meget minutiös, og Kunze henregner uden videre Ch. rufescens som Synonym til A. ciliatus Presl. Jeg har ikke taget i Betenkning at henføre All. chærophylloides Mart. & Gal. til denne Art, uaglet det synes betænkeligt, da Forff. formeentlig have kjendt A. ciliatus, der anføres i deres Værk, men fjernes fra A. chærophylloides ved den mellemuskudte A. decompositus. Herved er da følgende at bemærke: den rigtignok meget mangelfulde Beskrivelse af A. chærophylloides indeholder ikke et eneste Udtryk, som ikke passer paa vor Plante. Selv Bemærkningen om Affiniteten til A. crispus Bernh. er træffende, naar der blot tages Hensyn til det Habituelle, og man kun benytter unge Exempl. af A. crispus til Sammenligningen. Afbildningen, som er af Herr Galeotti, giver os en raa Contur, som dog stemmer ganske vel overeens med vor Plante, og fig. a. et lille Stykke af Lövet forstørret, hvilket dog er maadeligt fremstillet, og vidner om Tegnerens Mangel paa Sagkundskab. Der synes saaledes ikke at have været anden Grund for Forff. til Opstillingen af denne Art som ny, end Ubekjendtskab med den Deel af den botaniske Litteratur, i hvilken Oplysning burde söges om det Lands Bregnellora, som de gave sig af med at oplyse.

Jeg er meget tilbøjelig til at troe, at All. hirsutus Presl Rel. Hæk. I. p. 59 t. 10 fig. 1. ligeledes henhører til den nærværende Art. Afbildningen passer meget godt til mindre Exempl., jeg har fra Chiautla. Beskrivelsen er maadelig; Laaddenhen som siges at forekomme paa Lövets Bagside og paa Siderne af Lövstilkene reducerer sig formentlig til det hindeagtige cilierede Indusium, som fortsætter sig ned ad Rhachis.

Hvad derimod Cheil. hirsuta Link. h. Berol. 2. p. 40 og Fil. sp. h. Ber. p. 63 er, hvilken Kunze angiver som mexicansk i Addit. I. c. p. 144, samt hvorledes den skal adskilles fra nærværende Art, formaaer jeg ikke at yttre nogen Mening om. Af det trykte Ord lades man ganske i Stikk'en.

- 2. Allosorus angustifolius Presl.** Cheilanthes angustifolia HBK. nov. gen. 1. p. 21. Syn. 1. p 85. Allos. decompositus Mart. & Gal. l. c. p. 48. t. 10 f. 2.

Findes i Klippeklöfter i Regionen imellem 4—5500 Fod baade paa Mexicos Øst- og Vestside. Jeg fandt den ved Dos puentes imellem Totutla og S. Antonio Huatusco (4000'); Humboldt og Bonpland anføre den fra Jorullo (630 Toisers Höide); Galeotti ved Juquila (4500—5500).

Atter her maa jeg stryge en urigtigen opstillet ny Art. Der kan efter min Mening ikke være Tvivl om, at A. decompositus M. & G. maa henføres til den ældre HBKske Plante. Beskrivelsen er som sædvanlig mangelfuld, men Afbildningen overbeviser om Identiteten. Paa fig. 2a. er Indusiet urigtigen tegnet som helrandet, medens Kunth rigtig beskriver det som karvet.

A. angust var. minor: fronde 4—5 pollicari, lamina 3 poll. long., 1—1½ poll. lata, stipite 1½ poll., pinnis vix pollicaribus lanceolatis obtusis, laciinis ellipticis obtusiusculis, ceterum similij.

an sp. propria?

Denne mindre og bredere Form fandt jeg paa Klipper imellem S. Miguel og La Galera i det vestlige Oajaca, samt omkring Yavesia paa 7—7500'.

- 3. Allosorus microphyllus.** Cheilanthes microphylla Sw. Schlechtl. Linnæa 5. p. 616. Kze. Addit. l. c. p. 143. Ej. fil. Leibd. l. c. p. 339. Cheilanthe pubescens HBK. (Ceste Schldl.) Cheil. micromera Link. h. Ber. 2. p. 36. Ej. spec. fil. p. 64. Mart. & Gal. l. c. p. 76.

Vidt udbredt i den tempererte og kolde Region, voxende i Klippeklöfter. Jeg fandt den paa Østsiden i Dep. Vera Cruz i Potrero de S. Sebastian, ved Huatusco, Chinantla i Dep. Puebla (7000'); i Mexicos Indre ved S. Lorenzo i Nærheden af Tehuacan (5400), paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7—8000'), ved Yavesia, Teotalcingo i Districtet Chinantla, ved Trapiche de la Concepcion (3000'). Schiede fandt den ved Jalapa, hvor tidligere Humboldt og Bonpland havde taget den, og paa Hac. de la Laguna; Galeotti ved Llano verde (6500—7500'), men angiver den urigtigen voxende paa Ege, medens denne Art, saalidet som nogen mig bekjendt Art af Allosorus eller Cheilanthes, er parasitisk. Leibold endelig anfører den fra Mure og Klipper i temp. Region.

Denne Art er i höieste Grad foranderlig, og fremtræder under saa mange Former, at det vilde være let at opstille en hel Række Varieteter eller Arter, eftersom Lövet er dobbeltfinnet, Finnerne hele, ved Grunden ørede, eller halvfinnede, eller tredobbelts-finnde, eller eftersom Finnerne ere mere eller mindre budte. Størrelsen varierer fra 3 til 12 Tommer.

Jeg kan ikke samstemme med Forff. i at ansee denne Form for en Cheilanthes, idet det ikke har været mig muligt at finde nogen Grund for denne Henførelse. Baade efter dens Habitus, Affinitet og Frugtorganernes Beskaffenhed slutter den sig paa det næreste til foregaaende og 4 efterfølgende Arter, og jeg følger derfor en simpel Consequents ved at stille den hos Allosorus.

- 4. *Allosorus cordatus* Presl.** Kze Addit. l. c. p. 137. *Pteris cordata* Cav. HBK.
Syn. 1. p. 82.

Allerede funden i forrige Aarhundrede ved Chalma og Chapultepec i Nærheden af Mexico af Don Luis Née; Humboldt og Bonpland fandt den ved Aguasarcos og Ario (730—990 Toisers Höide); ved Polverillos ved Mexico af Schiede.

- 5. *Allosorus sagittatus* Presl.** Kze Addit. l. c. p. 137. Ej. Farrnk. p. 48. t. 24!
Nees v. E. Linnaea 19 p. 683. *Pteris sagittata* Cav.

Angives først som mexicansk, men uden Localitet af Cavanilles; ligeledes samlet af Karwinski uden Stedangivelse; Schiede sendte den fra Skoven ved las Trojes; C. Ehrenberg fra Kalkbund om de varme Kilder ved el Grande; Mexico Aschenborn. Jeg fandt den ved Chinautla i Dep. Puebla (7000'), og i Klippeklofter i Bjergskovene imellem S. Miguel og la Galera (7—8000') paa Dep. Oajacas vestlige Cordillerer.

- 6. *Allosorus flexuosus*** Kze Addit. l. c. p. 136. Ej. Farrn. p. 46. t. 23. *Pteris flexuosa* Kaulf. Schlechtl. Linnaea 5. p. 614. (excl. Syn.). Nees v. E. Linnaea 19. p. 683.

Fandtes af Schiede ved Jalapa; ved Hac. de S. Cayetano, Cerca del Grande af C. Ehrenberg; Mexico Aschenborn; jeg fandt den paa tørre Kalkklipper over S. Lorenzo ved Tehuacan i Frugt i December; imellem Laguna og Taneite i Dep. Oajaca i August.

Til Kunzes fortrinlige Beskrivelse har jeg ikun det at anmærke, at paa mine Exemplarer er Finnernes Underflade ikke finhaaret, men glat og finpricket.

- 7. *Allosorus formosus* Liebm.** A. pulchellus Mart. & Gal. l. c. p. 47. t. 10. f. 1.
Kze. fil. Leibd. l. c. p. 325.

Da der allerede existerer en All. pulchellus Presl (Cheil. pulchella Bory) maatte det martens-galeottiske Navn forandres. Desuden er Forff. Beskrivelse altfor ufuldstændig, idet Rodstokkens og Stilkens Beklædning, det golde Lövs Forhold slet ikke ere omtalte. Jeg anseer det derfor passende at meddele en ny Beskrivelse af den smukke Bregne.

Frons coriacea 8—12 pollices longa, 3—4 poll. lāta, stipite 1—5 pollicari, ovata supradecomposita, pinnis pinnulisque primariis et secundariis alternis, tertiaris suboppositis petiolatis, petiolis capillaribus brevissimis; *sterilibus* suborbiculatis fertiles magnitudine super-antibus glabris margine parum revolutis; *fertilibus* cordato-ovatis $1\frac{1}{2}$ lineam longis lineam latis basi subinaequalibus, marginibus impressis revolutis, apice obtusis, glabris supra glauco-viridibus pruinosis subtus pallidioribus, costa venisque in substantia coriacea pinnularum immersis imperceptibilibus, sporangiis pluriserialibus fuscis subglobosis continuis margine revoluto tectis; rhachi universali partialibusque flexuosis teretibus glabris nitidis aterrimis fragillimis, stipite curvato tereti basin versus paleaceo, paleis linearibus subulatis undulato-intricatis 3—4 lin. longis castaneis. Rhizoma subterraneum breve crassum squamis castaneis tectum, frondes cæspitosas emittens.

Jeg fandt den paa Toppen af steile Syenitklipper imellem Trapiche de la Concepcion og Tepitongo (5000') i Dep. Oajaca i Juli, voxende i Klippesprækker, især hvor nedsvivende Vand havde afsat nogen Tuf. Linden fandt den ved Ciudad real i Tabasco; Galeotti paa Toppen af la Nopalera S. for Sola (7—8000') i Dep. Oajaca; Leibold og Hege-wisch har sendt den fra Mexico uden nærmere Stedangivelse.

8. Allosorus Karwinskii Kze Addit. l. c. p. 138. Ej. Farrn. p. 7. og 40. t. 4. Hooker in Benth. pl. Hartw. p. 54. Kze fil. Leibd. l. c. p. 325. Mart. & Gal. l. c. p. 47. Nees v. E. Linnæa v. 19 p. 682. Ceratodactylus osmundooides J. Sm. in Hook. gen. fil. v. 4. t. 36.

Først opdaget af Karwinski ved Ixtlan (Sierra de Oajaca); senere funden af Linden i Chiapas ved Amatenango; af Galcotti ved Sola (7500—8000'); af Leibold i den temp. Region; af Hartweg i Baranca del Incarnacion ved Zimapan; Mexico Aschenborn *).

9. Allosorus ternifolia. Pteris ternifolia Cav. prælect. p. 266 n. 657. Hook. & Grev. ic. fil. t. 126. Pteris subverticillata Sw. Allosorus subverticillata Presl.

Denne Bregne var allerede i forrige Aarhundrede sendt af Don Luis Née til Cava-nilles fra Angel i Mexico-Dalen. Siden har den ikke været gjenfunnen i Mexico før jeg fandt den i det vilde næsten utilgjængelige Lavaterrain, som kaldes Malpays de la Hoya, hvor den voxede i Sprækker imellem Lavablokken (7 - 8000') i Juli Maaned.

* I Mariano Lagasca's genera & spec. plant. Matrit. 1816. p. 33 opstilles en Bregne fra Mexico under Navn af Llavea cordifolia, som af Sprengel i Syst. veget. er henført til Slægten Asplenium som A.cordifolium Sprlg. Forgiæves har jeg i de nyere Værker søgt Underretning om denne Bregne; ved at sammenligne Lagascas meget mangelfulde Beskrivelse med alle mig bekjendte Bregneformer, har jeg troet at gjen-kjende Allos. Karwinskii deri.

- 10. *Allosorus rigidus* Kze** Addit. I. c. p. 437. Ej. fil. Leibd. I. c. p. 324. Ej. fil. Poep. I. c. p. 55. *Pteris rigida* Sw. *Pteris cartilaginea* Presl Rel. Hæk. 4. p. 57. t. 9. fig. 3. *Pteris acutangula* Nees ab E. Linnaea v. 19. p. 684.

Tilhører den tempererte Region, voxende i Klippesprækker paa Steder, hvor den jevnlig vædes af nedsivende Vand. Jeg fandt den paa Klippekrænter imellem Trapiche de la Concepcion og Comaltepec (3000') i Juli og August; Leibold angiver den fra Mure i temp. Region; Mexico Aschenborn.

Nees's *Pteris acutangula* kan jeg ingenlunde antage som selvstændig Art. Diagnosen passer i det hele meget godt til *A. rigidus*. Charakteren: stipite acute quadrangulo, hvor-paa Forf. lægger særdeles Vægt i Modsætning til den stipes teres, som findes hos *A. rigidus*, har vist ikke stort at betyde, idet hos yngre Exemplarer ved Tørring en trind Stilk let bliver kantet. Iblandt mine Exemplarer af *A. rigidus* ere nogle, hvorpaa dette er Tilfældet.

- 11. *Allosorus intramarginalis* Presl.** *Pteris intramarginalis* Kaulf. Schlechtl. Linnaea v. 5 p. 613. Kze Analecta p. 27 t. 17. Ej. fil. Leibd. I. c. p. 336. All. inframarginalis (errore typograph.) Link. h. Ber. v. 2. p. 34. Ej. fil. sp. p. 55. Mart. & Gal. (errore negligentia) I. c. p. 53. · *Pteris fallax* Mart. & Gal. I. c. p. 53 t. 14 f. 2!

Overordentlig udbredt i Mexico ligefra den hede Østkyst til 8000 Fods Höide, voxende imellem Klippesprækker eller mellem løse Stene. Jeg fandt den ved Colipa (800') i Marts, Hac. de Jovo (1800—2000') i Mai, Mirador (3000') i Januar, Hac. de Zazuapan, la Hoya (7—8000') i Juli, Chinaulta i Dep. Puebla (7000') i Mai, Teotalcingo i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca (5000') i Juli, Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca (3000') i Juli og August. Dr. Schiede fandt den ved Jalapa; Galeotti ved Talea, Tancete, Llano verde (Dep. Oajaca 5—7000').

At *Pteris fallax* Mart. & Gal. er en i Mexico meget almindelig Form af All. *intramarginalis* har Prof. Kunze allerede gjort opmærksom paa, og ubegribeligt er det, hvorfor Forf. have opstillet denne nye Art, da dog de Charakterer, hvorved de ville godtgjøre Forskjelligheden fra Al. *intramarg.* ikke have mindste Anvendelse ved Artsadskillelsler.

- 12. *Allosorus aurantiacus* Presl (nomen).** *Pteris aurantiaca* Cav. præl. p. 266. n. 659. *Allosorus ochraceus* Hooker in Benth. pl. Hartw. p. 55.

D. Luis Née fandt den allerede i Slutningen af forrige Aarhundrede i Skovvegnen ved Chalma (formodentlig i vestlige Deel af Mexico-Dalen); Hartweg traf den igjen, efter at Planten i saa mange Aar havde staact som en Gaade, paa fugtige skyggefulde Steder ved Morelia i Michoacan.

Det var mig en stor Tilfredstillelse i den Hookerske Beskrivelse at gjenkjende en af Cavanilles Arter, som ingen Bregneforsker i dette Aarhundrede har kjendt, fordi man af Cavanilles Værk havde optaget i de systematiske Værker den paa Latin skrevne korte Diagnose, men overseet den paa spansk skrevne Beskrivelse*).

For at vise at *Pteris aurantiaca* Cav. og *A. ochraceus* Hook. ere identiske, være det mig tilladt at oversatte Cavanilles spanske Beskrivelse paa Latin, afpasset efter Videnskabens nærværende Affattelsesmaade, og man vil da vist indrømme, at Overensstemmelserne ere saa store, at der neppe med Grund kan reises Tivil om Enstyldigheden.

P. aurantiaca Cav. l. c.

Frons vix pedalis bipinnata viridis, antice hirsuta postice aurantiaca pulverulenta, pinnis sessilibus oppositis acutis basi obtusis 6 lineas longis; pinnulis basin versus profunde crenatis, ceteris integris minoribus; sporangiis marginalibus, indusio crenato; stipite atro-sangvineo basin versus squamuoso.

Meget Tivilsomme.

For ikke at have undladt Noget, der kunde siges at bidrage til at fuldstændiggjøre mit Arbeide, maa jeg endnu omtale nogle Planter, som, skjønt allerede beskrevne ved dette Aarhundredes Begyndelse, dog aldrig have været kjendt af Bregneforskerne, og nu vel ikke mere med Sikkerhed ville kunne udfindes. Jeg mener nogle af de under *Pteris* beskrevne Arter, som Cavanilles anfører i sit Værk: Descripcion de las plantas, que D. Antonio José Cavanilles demostró en las lecciones publicas del año 1801. Madrid 1802, og hvoraf Presl har henregnet de flèste til *Allosorus*. I dette Værk findes ganske korte i linnæisk Aand holdte Artsdiagnoser; men derpaa følge temmelig udførlige og for sin Tid meget noiagtige Beskrivelser paa spansk. De ældre Systematikere som Swarts, Widenow Sprengel, o. fl. have af Cavanilles Værk ikkun benyttet de latinske Diagnoser, af hvil Korthed intet Billede af den paagjeldende Plante kan uddrages; Ukyndighed i det spanske Sprog har forhindret dem fra at benytte de udførligere Beskrivelser. For om muligt at give Anledning til at en eller anden Critiker, som har Adgang til et af de større paa mexicanske

*) Las hojas tienen un pie escaso, son dos veces pinadas, verdes y algo vellosas por la parte superior, de un amarillo de naranja fuerte por el envés. Las pinulas estan sentadas y opuestas, son puntiagudas y anchas por la base, de unos seis lineas: las hojuelas de la base estan profundamente festonadas, no asi las restantes, que son siempre mas pequeñas. La fructificacion es marginal, y el tegumento casi festonado, dentro del cual estan las cajitas amarillentas pediceladas con anillo vertical. El peciolo es de un rojo casi negro, y tiene algunas escamas en la base.

Obs. El color que se observa en el envés de las hojas es una especie de polvillo diverso de la semilla. Cavanilles.

Bregner rige Muscer engang skal henvende sin Opmærksomhed paa disse nu snart i et halvt Aarhundrede forglemte Cavanilleske Arter, som have figureret i Systemerne som dunkle Gaader — skal jeg for de som mexicanske angivne Bregnearter uddrage Alt, hvad der kan ansees som oplysende af Cavanilles spanske Beskrivelser, gjengive det paa Latin, afpasset efter vor nærværende videnskabelige Oplæring og Terminologie.

Pteris glauca Cav. l. c. p. 269 n. 668.

frons 6—8 pollicaris, lamina subrotunda 2 poll. longa, 1½ poll. lata, tripinnata, pinnulis linearibus basin versus pinnatifidis, utrinque dilute viridibus; sporangiis rufis marginalibus indusio marginali tectis. Habit. in rupibus madidis pr. Guanaxuato. D. Luis Née.

Presl har ikke kjendt Indholdet af Cavanilles spanske Beskrivelse, da han (Tent. pterid. p. 145) stillede den iblandt de ægte Pteris Arter. Af Beskrivelsen fremgaer, at Bregnene er beslægtet eller vel endog identisk med All. ciliatus Presl; Beskrivelsens faae Data passe ret godt, ikkun Farven er ikke overenstemmende, dog synes det ikke at have videre Betydning, da Cavanilles kalder sin Plante P. glauca, men i Beskrivelsen siger at den paa begge Lövflader er lysgrön (de un verde claro*).

Om Pteris glauca Nees v. E. Linnæa v. 19 p. 685, som er sendt fra Mexico af Aschenborn, hører herhen, er yderst tvivlsomt. Hvis det virkelig skulde være Tilfældet, da er det meget at beklage, at Forf. ikke har givet nærmere Oplysning om en Plante, som Nutidens Botanikere ikke kjende.

Pteris lutea Cav. l. c. p. 267 n. 660. Allosorus luteus Presl.

Frons bipinnata, pinnis alternis ovato-lanceolatis, pinnulis ovato-oblongis obtusis oppositis.

P. aurantiacæ similis, differt: pinnis alternis majoribus apice obtusis, pinnulis subintegris colore paginæ inferioribus luteo. in sylvis pr. Chalma Nov. Hisp. D. Luis Née.

Om denne Form formaaer jeg ingen Mening at yttre.

Pteris sulphurea Cav. l. c. p. 269 n. 667. Allosorus sulphureus Presl.

Rhizoma fibrosum, frondibus cæspitosis, stipite nigricante nitido tenui 4—6 poll. longo, lamina c. 3 poll. longo, parum longior quam lata, ternata, pinnis lateralibus sessilibus inæquilateris bipinnatifidis, terminali petiolata bipinnatifida, lacinias oppositis; pinnis

*^o) Su porte y magnitud es como en la antecedente, (P. sulphurea). La hoja principal presenta una figura casi redonda de dos pulgadas de largo y algo menos de ancho; es tres veces pinada, y sus hojuelas lineares con algunas pinulas en la base. Su color es de un verde claro por ambas superficies. La fructificación es marginal como su tegumento, y no ocupa todo el dorso de la hoja. etc. Cav.

lanceolatis, laciiniis linearibus obtusis, supra viridibus, subtus lepidoto-albosulphureis, soris marginalibus, sporangiis rufis. pr. Zimapan. D. Luis. Née*).

Jeg troer at Enhver, som med Critik vil sammenligne denne Beskrivelse, som er en tillempt Oversættelse af Cavanilles spanske Text, vil let deri gjenkjende Cheilanthes pulveracea Presl, især naar man vil tage Hensyn til den mindre udviklede Form, som man i en vis Henseende vel kunde kalde ternata. Forhaabetlig vil man altsaa herefter ikke mere anføre *P. sulphurea* under *Allosorus*, som en Art, om hvilken Intet kan meddeles, men derimod stille den som Synonym til *Cheilanthes pulveracea* Presl.

Pteris L.

* *Eupteris: venis simplicibus furcatisve liberis.*

- 1. *Pteris cretica* L.** Schk. Crypt. t. 90. Kze fil. Leibd. l. c. p. 335. Ej. Addit. l. c. p. 142. *P. cretica* γ americana J. Agardh. Rec. gen. Pter..p. 9. *Pteris triphylla* Mart. & Gal. l. c. p. 51. t. 14 f. 1! *Pteris serrulata* Mart. & Gal. l. c. p. 51!

Den Art, som meget med Urette er opkaldt efter Øen Creta, uagtet den er udbredt baade i den gamle og nye Verden, findes i Mexico igjennem alle Regioner fra den hedeste østlige Kystregion indtil 8000 Fods Höide. Jeg har samlet den ved Pital, en Indierlandsby ved Rio Nautla, faae Miil fra dens Udlöb; i Klippespalter ved Mirador (3000'); ved Sta Maria Alpatlahua paa den østlige Heldning af Vulkanen Orizaba (7000'); ved Tiuzutlan og paa Klipperne over Chinautla (Dep. Puebla) indtil 8000'. Dr. Schiede fandt den ved las Trojes; C. Ehrenberg paa Hac de Carmen imellem Omitlan og Atotonilco el grande; Galeotti ved Jalapa og Yavesia (7-7800').

Jeg deler fuldkommen Prof. Kunzes Mening om de to ovenstaende iblandt Synonymerne stillede martens-galeottiske Arter. *P. triphylla* Mart. & Gal.^{**}) er den trekoblede mere smalløvede Form, som især fremhersker i de höiere Regioner. *P. serrulata* Mart.

*) Las raíces son como en la antecedente (*P. pedata*) de la cual salen peciolos casi negros, brillantes y delgados de 4 a 6 pulgadas, terminados por una hoja algo mas larga que ancha, y menor que en la antecedente; desde la base se parte en tres; las laterales sentadas, y aumentadas con otra hojuela que cae hacia abajo; la intermedia peciolada: todas son dos veces pinadas y las pinulas opuestas; las primarias casi lanceoladas; las secundarias lineares y obtusas; son verdes por la superficie anterior, y de flor de azufre por el envés. La fructificación es marginal; las cajitas de un rojo oscuro. Cav.

**) Der existerer allerede en Plante af dette Navn, opstillet af J. Agardh tre Aar tidligere end Forff's Arbeide, men som ikke har været kjendt af disse.

& Gal. er ikke den ægte Linneiske Art, som tilhører det østlige Asiens Øer, men den store finnede Form, hvis nederste Finner ere tvedelte, hvis øvre Finner løbe noget ned paa Axen, uden dog at gjøre denne ganske vinget, som paa den ægte *P. serrulata* L. fil.

2. *Pteris nemoralis* Willd. J. Agardh. I. c. p. 25. Kze fil. Leibd. I. c. p. 335.
P. nemoralis major Mart. & Gal. p. 53. P. Plumerii Schlechd. Lin. v. 5. p. 613.

Meget almindelig i den østlige Skovregion fra Havets Niveau til omrent 4000'. Jeg fandt den ved Colipa, Misantha, Pital, Hac. de Jovo, Yecoaatl, Tlapacoyo, Mirador, Jalapa, fra December til Mai i Frugt. Schiede fandt den i hede Skove ved Cuapa (Dep. Vera Cruz); Galeotti ved Zazuapan.

Den varierer sædeles i Størrelse fra $2\frac{1}{2}$ —4 Fod; Finnerne fra 7 T. til 12 T; Fligene fra 4 Linier til 14 Linier.

3. *Pteris Swartziana* J. Agardh. Rec. spec. gen. Pter. p. 34. *Pter. biaurita* Sw. (excl. syn. et loc. nat.) Hook. & Grev. ic. fil. t. 142.

Denne paa Americas Fastland hidtil ei fundne Art traf jeg i Egeskovene ved S. Bartolomé Dep. Vera Cruz (4500') i October Maaned.

4. *Pteris caudata* L. Plum. fil. t. 29. Mart. & Gal. I. c. p. 54 (sub nom. erron. *P. caudatae* Jacq.)

I Mexicos hede og tempererte østlige Region spiller denne Art samme Rolle, som *P. aquilina* hos os. Den voxer selskabeligen i store ofte næsten uigjennemtrængelige Masser paa forladte Sukker-, Bomulds- og Mais-Marker, samt paa Randen af Skove. Den gaaer fra Havets Niveau til 4500'. Jeg fandt den ved Antigua, Colipa, Hac. de Jovo, Jicaltepec, Mirador, Galeotti angiver Mirador, Zazuapan og Jalapa.

P. caudata, kan let forvexles med *P. aquilina*, men er let adskillelig ved de Knuder, som findes paa Bagsiden ved Grunden af Finner og Smaafinner. Hverken Hoved- eller Biaxer ere laadne paa denne.

5. *Pteris aquilina* L. var. *pubescens* Sprlg. *P. lanuginosa* Schlechd. Linnæa 5 p. 614.

Hyppig i Mexicos høiere Bjergregion paa skovbegroede Heldninger; saaledes fandt jeg den ved Chinaula (Dep. Puebla, 7000'); paa Vulkanen Orizaba imellem 7—8000'; ved S. Antonio Huatusco (4500'). Schiede fandt den ved Jalapa.

Hovedaxer og Biaxer, Finnernes Underside ere graalaadne.

6. **Pteris laciniata Willd.** Presl Pteridogr. t. 5. f. 23. Kze Farrn. p. 153. Anm.
Lonchitis hirsuta Sieber fl. martin. n. 372.

Da ingen fuldstændig Beskrivelse findes af denne Bregne, som i Habitus ligner en Lonchitis, men i sine Charakterer er en reen Pteris, meddeles her en saadan. Det maa bemærkes, at denne Art er forbigaet i Agardhs Monographie.

Frons tenera herbacea 4—4½ pedalis lato-lanceolata acuminata bipinnato-pinnatifida, sursum bipinnatifida, apice pinnatifida, pinnis alternis distantibus patulis pedalibus et insuper, sursum decrescentibus lanceolatis acutis, pinnulis subtriplicaribus ½—1 poll. latis alternis sursum suboppositis approximatis elongato-lanceolatis acuminatis acutis apicem versus leviter falcatis, brevissime petiolatis vel plerumque sessilibus basi obliquis, basi superiori excisa inferiori adnata, pinnulis partis superioris pinnarum sessilibus adnatis, basi inferiori decurrentibus rhachinque alatum efficientibus, pinnatifidis, laciniis falcato-ovatis obtusis margine obsolete repandulis sursum sensim confluentibus, sinibus acutis, costa utrinque prominula costulis subexcurrentibus, venis simplicibus furcatis curvatibus ante marginem apice clavato-incrassato desinentibus, colore paginae anterioris obscure viridi, pag. posterioris dilutiore, costa costulis venis utrinque squamulis piliformibus tenuibus hyalinis aut fusco-griseis septatis pubescensibus; soris linearibus margines laterales laciniarum occupantibus, sinum et apicem non attingentibus, sporangiis fuscis, indusio hyalino elongato semi-lunato; stipite rachi universaliter partialibusque antice canaliculatis postice convexis pilosulis, demum glabrescentibus stramineis. Rhizoma subterraneum breve crassum carnosum frondes 3—4 emittens.

Voxer i de dybe skyggefulde fuglige Baranker paa Mexicos Østside paa vulkanske Klipper, som jevnlig overrisles af nedrindende Vand. Den er ifølge sit fine urteagtige Lövs Beskaffenhed meget lyssky, og visner overordenlig hurtigt. Dens Region falder imellem 800 og 3000'. Jeg fandt den meget hyppigt ved Colipa, Hac. de Jovo og i Baranca de Mirador. Den er ikke tidligere samlet i Mexico, idet mindste haves ingen trykte Efterretninger derom. Imidlertid angiver Kunze paa det oven citerede Sted rigtigen Vestindien og Mexico som Artens Födeland, istedetfor det tidligere af Willdenow anførte Ostindien.

* * Lithobrochia: venis anastomosantibus reticulatis.

7. **Pteris pedata L.** Schk. Farrn. t. 100. Cav. præl. p. 268 n. 666.

Denne Art er for et halvt Aarhundrede siden funden af Don Luis Née ved Chalma. Ingen anden Botaniker havde senere truffet den, før jeg gjenfandt den i Klippekløfter imellem Tancete og Cacalotepec i de østlige Dele af Dep. Oajaca (5—6000') i August.

Mine Exemplarer ere af en anseelig Størrelse 7—8 Tommer lange, Pladens Brede er 7 Tommer.

8. Pteris grandifolia L. J. Agardh l. c. p. 7. Plum. fil. t. 105. Schlechd. Lin. 5. p. 613. Kze fil. Leibd. l. c. p. 335. Mart. & Gal. l. c. p. 52.

Denne Art tilhører Mexicos hede Littoral-Region, og stiger efter mine lagttagelser ikke höiere end til 1500 Fod, og forekommer baade paa Mexicos Øst- og Vestside. Jeg fandt den i de hede fugtige Urskove om Pital ved Rio Nautla, Jicaltepec ved Nautla, Papantla, og paa Vestsiden imellem Guatulco og S. Miguel del puerto. Schiede fandt den ved Papantla. Det Leiboldske laconiske: reg temp. er urigtigt, bør hedde reg. calid.

Galcotti anfører Planten fra Chinantla i Oajaca, og ansætter dens Region inøllem 2—3500'. Denne Angivelse er upaalidelig. Jeg har bereist hele Chinantla, og har ikke seet Spor af denne anseelige Bregne. Muligen forekommer den i den hede fugtige skovdækte Slette Ö. for S. Pedro Tepinapa, men i saa Tilfælde befinder man sig i Alvaradoflodens Slette, hvis Höide neppe overskrider 1500'.

Hos Forfatterne findes store Modsigelser angaaende denne Arts Nervation, hvilket er tilstrækkelig udhævet i Agardhs Monographie, men uagtet det oplyses, at den ægte Linneiske Plante besidder sammenløbende Aarer, altsaa har den Charakteer, som er fastsat for Afdelingen Lithobrochia, forbliver Arten dog iblandt Arterne af Epteris. Kunze søger at löse de Twivl, som Prof. Agardh har næret i denne Henseende, samt berigtige Presl's Feittagelser i at anføre den ægte Linneiske *P. grandifolia* i hans Slægt *Pteris* (= *Epteris*), og derimod den peruaanske (*Poecipigiske*) og mexicanske (*Schiedeske*) Form under to forskjellige Benævnelser under Slægten Lithobrochia — ved den Bemærkning, at Aarerne paa Lövets øvre Finner ere enkelte eller ikun sparsomt gaffelfornig delte, medens de paa af andre Finner blive hyppig grenede og net-formige. Men denne Paastand maa jeg aldeles benægte, idet mindste for den mexicanske Forms Vedkommende. Jeg har havt en Mængde Exemplarer til min Disposition, jeg har undersøgt Planten i alle Alderstilstande, og jeg har altid fundet de parallele Aarer sammenløbende, og dannende et smukt Aarenet foran Randen. Der bliver vel saaledes ikun tilbage, at det er Unøiagthed hos Schkuhr som hos Presl, at *P. grandifolia* er bleven beskrevet og afbildet med frie Aarer.

9. Pteris protea Liebm. Pt. aculeata Schlechd. (vix Sw.) Linnaea v. 5. p. 614?

fronde tenuiter coriacea glabra nitida lato-lanceolata acuminata acuta 3 pedali, lamina 2 ped. long., $4\frac{1}{2}$ ped. lata, stipite pedali, bipinnato-pinnatifida, sursum pinnato-pinnatifida, apice pinnatifida, pinnis inferioribus suboppositis $1\frac{1}{2}$ pedalibus, sursum alternis decrescentibus, lato-lanceolatis acuminatis acutis, pinnulis 10—6 poll. longis, 5—4—3 poll. latis lanceolatis acutis petiolatis (petiolis $1-1\frac{1}{2}$ poll. ad 2 lineas longis), basi oblique cuneatis profunde pinnatifidis, lacinii lanceolatis falcatis acuminatis acutis apicem versus serratis, 2—1 poll. longis, 6—4—2 linias latis, sinibus summopere variantibus, modo amplissimis $\frac{1}{2}$ ad pollicem latis biangu-

latis rotundatis, modo angustioribus 2—3 lineas latis oblique rotundatis, modo (in sterilibus) angustissimis vix obtusiusculis, lacinia terminali longissime acuminata lanceolata recta serrulata; costa costulisqne utrinque prominulis antice canaliculatis postice rotundatis, venis basalibus bি- raro triarcuatis, areas transverse elongatas, ceteris areolas hexagonas plus minus regulares formantibus; soris continuis totum sinum lateraque laciniarum apice solo excepto cingentibus, sporangiis cinnamomeis, indusio angusto membranaceo integro; stipite rhachi universali partialibusque stramineis glabris antice canaliculatis striatis, postice convexis. Rhizoma subterraneum breve crassum frondes 4—5 emittens.

Denne Art hører til den Afdeling i Agardhs Recensio, hvortil *P. Kunzeana*, elata og propinquæ henhøre. Skjöndt den har mange Overensstemmelser med disse, har det dog ikke været muligt at føre den til nogen af dem. Fra *P. aculeata* Sw. er den mere forskjellig, navnlig er Lövets Sammensætning anderledes hos denne. I det jeg har en rig Række af Former af denne i Udseende meget foranderlige Art liggende for mig, er det en Bemærkning, jeg finder Anledning til at gjøre, at de for Tiden af Systematikerne antagne Arter af denne Afdeling engang ville reduceres, idet nu flere Arter ere beskrevne efter enkelte Exemplarer, som have frembrudt Forskjelligheder, der ved Sammenligning med et rigere Materiale ville vise sig som individuelle. Men dernæst ere disse store Bregneformer for det meste tilstede i Samlingerne i ufuldkomne Fragmenter, hvorefter Arts-Beskivelser udkastes, der senere ikke kunne finde Anwendung paa fuldstændige Exemplarer, som undersøges i Naturen.

Jeg har ført *P. aculeata* Schlehd. som Synonym til denne Art, og har personlig ingen Tvivl om Rigtigheden deraf, thi *P. protea* er netop meget hyppig i den Region, hvorfra Dr. Schiede havde sendt den som *P. aculeata* bestemte Plante. Da jeg ikke har seet Schiedes Exemplarer, har jeg ved Synonymet tilføjet Spørgsmaalstegnet, men jeg er overbeviist om, at disse hverken ere af en traagtig Plante, eller have en tornet Stilk eller den Lövdeling, som betegner den ægte *P. aculeata* Sw. Ligesaavidet er vor Plante identisk med *P. longibrachiata* J. Ag., hvis Stilk er besat med sorte Torne, til hvilken Art Kunze synes at ville henregne den schiedeske Plante (jfvr. Kze fil. Leibd. I. c. p. 336). *

P. protea er udbredt i den hede østlige Skovregion; jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Pital i Maanederne Marts til Mai. Schiedes Plante er taget ved Cuapan i Decbr., og i Skovene ved Misantla i Februar.

Bregnens foranderlige Udseende beroer især paa Fligenes Brede og Bugternes Vide. Hos golde Löv ere Fligene kortere, bredere, snart budte, snart spidse, mere takkede, meget tætttere, saa at de næsten berøre hverandre; hos fructificerende ere de smallere og længere, Bugten meget bredere.

10. Pteris apicalis Liebm. P. podophylla (non Sw.) Schlechd. Lin. 5. p. 614. P. Orizabæ Mart. & Gal. I. c. p. 53. t. 43! Kze fil. Leibd. I. c. p. 335.

Denne Art hører til de almindeligste i Mexicos østlige tempererte Skovregion imellem 3—4500 Fod. I Egeskove omkring Mirador har jeg samlet den hele Aaret rundt. Leibolds Angivelse: reg. temp. betegner den samme Localitet. Schiede fandt den i Skove ved Jalapa. Naar derimod Galeotti fortæller, at Bregnen findes paa Vulkanen Orizaba i Omegnen af Vaqueria del Jacal paa 9—10500 Fods Höide, at den der hører til de største Sjeldenheder, at den er mærkelig som den höiestgaaende større Bregne, som endelig benævnes efter Vulkanen, da ere disse samtlige Angivelser fuldkommen falske. Da Forff's Beskrivelse er slet til Ukjendelighed vilde jeg ikke kunne gjøre denne Paastand med den Bestemthed, som mine Ord indeholde, hvis jeg ikke ved Afbildungen var bleven aldeles overbeviist om, at her ingen Feittagelse var mulig. Den opnåede Bregne findes aldeles ikke paa Vulkanen Orizaba, kan følgelig ikke opkaldes efter Vulkanen; den er saa langt fra at gaae op til den anseelige Höide af 10500', at den bestemt ikke overskrider Jalapas Höide (4500'), men derimod fremhersker i den Region, hvor Sukker- og Kaffeplantager have deres bedste Flor. Det er beklagligt at Forff. kunne have saa lidet Agtelse for Videnskaben, Sandheden og dem selv, at Tilrettevisninger som denne skulle gjøres Behov.

Da Galeotti ikkun synes at have samlet Brudstykker af Bregnen (efter en Bemærkning af Kunze at dömmte), samt giver en urettig Beskrivelse, da Schiede ogsaa ikkun synes at have sendt Brudstykker, hvorved Schlechtendals Bestemmelse bliver forklarlig, er en ny Beskrivelse nødvendig til Forebyggelse af videre Vildfarelse.

Frons rigida coriacea glabra dilute viridis nitida 3 pedalis lato-lanceolata acuminate acuta ternata, pinnis lateralibus $1\frac{1}{2}$ pedalibus bipartitis pinnato-pinnatifidis, pinna media bipedali elongato-lanceolata pinnato-pinnatifida, rarius et basin versus pinnato-bipinnatifida, pinnulis alternis 6—8 poll. longis pollicem circiter latis sursum decrescentibus elongato-lanceolatis longissime acuminatis acutissimis petiolatis (petiolis deorsum longioribus $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ poll. longis sursum brevioribus), basi oblique cuneatis, profunde pinnatifidis, laciniis $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ poll. longis, 3—4 lin. latis lanceolatis falcatis marginibus parum revolutis acutis apicellatis acute serrulatis, sinibus obtusatis, terminali linear-lanceolata 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longa acuta serrulata; costa antice canaliculata postice convexa parce pilosula, costulis utrinque elevatis, venis basalibus monoarcuatis arcum transverse elongatum costæ parallelum formantibus ceteris anastomosantibus areolas angulatas irregulares formantibus hic illuc liberis ad marginem excurrentibus; soris continuis latera laciniarum occupantibus apicem non attingentibus, sporangiis rufis, indusio scarioso fusco integro; stipite pedali rachi universali partialibusque glaberrimis stramineis antice canaliculatis pluristratiatis, postice convexis. Rhizoma subterraneum breve crassum frondes 3—5 emittens.

Den nærmer sig i Henseende til Lövets Udseende til *P. podophylla* Sw., som dog har en aldeles forskjellig Sammensætning af samme.

11. *Pteris pulchra* Schlechtl. Linnæa v. 5. p. 614.

Denne udmærkede Art opdagedes først af Dr. Schiede i Skovene imellem Colipa og Misantla. Senere gjenfandt jeg den paa de samme Steder, men desforuden ved Sta Maria Tlapacoyo, hvor den endog forekommer i Krattet, som gjerne omgiver Indianerhytterne; ligeledes i abne Skove ved Papantla, og endelig i Floddalen ved S. Pedro Tepinapa District Chinantla Dep. Oajaca Den er saaledes en af de mest characteristiske Bregner i Mexicos østlige tierra caliente og overstiger neppe 1500 Fods Höide. Fra Febr. til Juni træffes den i Frugt. Schlechtendals Beskrivelse er saa fuldstændig, at jeg ikkun har at tilføie, at Rodstokken er lodret, af en Tommes Gjennemsnit, hæver sig 3—4 Tommer over Jorden, og udsender 4—5 store Löv.

Tvivlsomme.

***Pteris æqualis* Presl** Rel. Hæk. 1. p. 54.

Mexico (uden nærmere Stedangivelse) Thad. Henke.

Agardh (Rec. sp. Pter. p. 5.) er tilbøjelig til at ansee denne som en Form af *P. longifolia* L., men Beskrivelsen er for usfuldstændig. Ingen har senere i Mexico fundet nogen Bregne, som kunde henføres hertil. Sandsynligvis er Plantens Födeland urettig angivet.

***Pteris arborescens* Mart. & Gal.** I. c. p. 54.

Chinantla Galeotti.

Det er etter en af disse nye Arter, som man maa ønske Videnskaben befriet for. Forff. sige selv, at de kun have havt usfuldstændige Brudstykker, men dette afholder dem dog ikke fra at bringe disse til Torvs som nye Varer. Jeg har ikke seet Spor af nogen traaglig Pteris hverken i Chinantla eller andensteds i Mexico.

***Vittaria* Sw.**

1. *Vittaria graminifolia* Kaulf. en. p. 192. Kze fil. Leibd. I. c. p. 336. V. *lineata* Sw. Schlechtl. Lin. v. 5 p. 614. Schk. Farrn. t. 101 b. (mediocris!) *Taenitis linearis* (non Sprlg) Mart. & Gal. I. c. p. 44.

Hører til Mexicos meest udbredte Bregner, voxende paa gamle Skovtrærs Stammer fra den hedeste Østkyst indtil over 9000 Fod. Jeg fandt den ved S. Pedro Tepinapa og Teotacingo (begge i Dep. Oajacas District Chinantla), ved Mirador, Huatusco, ved Chinautla

(Dep. Puebla 7000', paa Cerro de Sempoaltepec i Oajaca 9000'. Schiede fandt den ved Jalapa, Hac. de la Laguna og Huitalmalco. Den findes i Frugt hele Aaret igjennem.

Jeg har intet Öieblik været i Tvivl om, at Tænitis linearis Mart. & Gal. maatte henhøre hertil, og ikkun ved en grov Feil er bleven bestemt som skeet, thi Forff. omtale Planten som meget almindelig paa de gamle Ege i de tætte Skove om Jalapa, Mirador og Llano verde, men paa de nævnte Localiteter findes med Bestemthed ingen Tænitis, men derimod netop Vittaria graminifolia.

De hidtil eksisterende Beskrivelser ere mindre tilfredsstillende, jeg finder derfor Anledning til at bemærke følgende: Den krybende Rodstok udsender en Mængde Löv, som danne en tueformig Forening. Lövet er ved Grunden omgivet af tætte taglagte lanceiforme spidse randtakkede klare Skjæl med et smukt brunt Maskenet. Lövets Form er dobbelt: *det frugtbærende* er linieformigt 2—10 T. langt, 1—1½ Linie bredt, i Spidsen lidt budt, af en læderagtig Substant, forsynet med Middelribbe, som fremträder paa Underfladen. Aarerne danne langstrakte Masker parallele med Middelribben. (Presls Angivelse af Nervationen hos Vittaria, Pteridgr. t. 6. f. 18, er uriktig). Sporangier kredsunde blandede med korte leddede kjölleformige Traade. *Golde Löv* meget kortere ½—1—2 T. lange, meget tyndere, spatelformige eller linie-spatelformige; Middelribbe utydelig eller ingen, Aarerne danne elliptiske sjeldnere langstrakt-kantede Masker, som ikke løbe ud til Randen af Lövet.

Mine Exemplarer stemme fuldkommen overens med Original-Exemplarer af *V. lineata* Sw. i Vahls Herbarium.

Lomaria Willd.

1. *Lomaria fragilis* Liebm.:

fronde coriacea fragillima glabra nitida antice glauco-viridi, postice dilute olivacea, *sterili* 18—24 poll. longa, lamina 12—18 poll. long. 2 poll. lata, stipite 6—8 poll. longo, elongato-lanceolata longe acuminata acuta pinnatisecta utrinque sensim attenuata, laciiniis alternis-suboppositis patentibus-divergentibus lanceolatis falcatis acutis basi inferiori dilatatis decurrentibus, margine reflexis repandulis; infimis 2—3 (raro unico) cujusvis lateris lobiformibus transversis rotundatis; terminali 2 poll. longis lanceolata acuminata acuta repanda; costulis antice subinamersis postice prominulis, venis antice obsoletis postice subimpressis furcatis apicem versus simplicibus apice clavato incrassato ante marginem terminantibus; stipite et rhachi glabris antice stramineis canaliculatis marginatis, postice e medio ad basin usque nigris rotundatis; *fertili* sterilibus breviori 6—13 poll. longa pinnata utrinque sensim attenuata, pinnis alternis patentibus linearibus 1—1½ poll. longis rectis subacutis ad basin parum dilatatis

in rhachin marginatum decurrentibus; soris totam paginam aversam obtegentibus, indusii marginalibus tenuibus membranaceis integratis.

Rhizoma subhorizontale repens digitum crassum radiculosum densissime fusco-paleaceum, paleis linearibus semipollicariibus fimbriatis tenuissimis membranaceis intricatis.

Denne smukke Art er temmelig sjeldent i de dybe Baranker paa Östsiden, voxende selskabelig paa gamle Træstammer, og nedhængende fra disse. Jeg fandt den i Bunden af den skovdækte Baranke ved Huitamalco, i Baranken ved Mirador og S. Francisco. Dens Höideregion falder saaledes imellem 1500—2500'. Vor Plante er beslægtet med L. L'Herminieri Bory, men adskilt ved følgende: Lövet meget længere, smallere, smal lancet-formig, oven til jvnt aftagende og endende med en 2 T. lang uindskaaren i Randen rundbugtet Flig, nedentil jvnt aftagende, nederste 2—3 Flige paa hver Side afrundede uden Middelribbe, lobe ned, og tabe sig paa Stilk. Fligene paa vor Plante mere fjernede, hidrørende fra den nedløbende Basadel; endelig ved den tykke horizontale krybende Rodstok.

Synes ogsaa at nærmest sig L. blechnoides Bory (Duperrey Voy. Crypt. p. 273) fra Chile, men som let adskilles ved den neppe tommelange Stilk, der er besat med store lanceiforme Skjel.

Stilkten og Lövaxen paa L. fragilis er saa tør og skjör, at den selv ved den svage Luftström, som af og til trænger sig igennem de dybe Skovklöfter, brækkes i Stykker, hvorför det er sjeldent at træffe ubeskadigede Exemplarer.

2. **Lomaria pectinata Liebm.:**

fronde tenuiter coriacea glabra utrinque concolori pedali, lamina 7—9 poll. longa 2—2½ poll. lata, stipite 5 pollicari, lanceolata acuta, pinnatisecta basin versus pinnata, (lacinii 30—40 cujusque lateris), sursum decrecente, lacinii alternis basin versus plerumque suboppositis, lineari-lanceolatis 1—1¼ poll. longis 2 lineas latis aculis basi superiore dilatatis, margine imprimis e medio ad apicem argute serrulatis, horizontalibus, infunis divaricatis parum brevioribus remotioribusque, costulis venisque furcatis parallelis utrinque prominulis, stipite rhachique antice canaliculatis postice acutis; fertili non reperta.

Voxer paa Egestammer i Skovene paa Cerro de Sempaltepec Dep. Oajaca imellem 8—9000 Fods Höide.

Ikkun en Gang har jeg truffet denne Bregne, destoværre ikke i Frugt, men Lövet er alt for charakteristisk til at man ikke strax deri erkjender en Lomaria, og en hidtil ubeskrevne Art.

3. **Lomaria campylotis Kze** Linnaea v. 17. p. 567. Coll. Galeotti N. 6235 (herb. Deless.) Kze fil. Leibd. I. c. p. 326.

Denne mig ubekjendte Plante er først beskrevet af Prof. Kunze efter frugtbærende Exemplarer fra Caraccas af Linden. Det golde Löv var dengang ei kjendt, det frugtbare

sammenlignedes med L. Spicant. Leibold har bragt den fra Mexicos tempererte Region, og efter disse Exempl. sammenligner Kunze den med Lom. pubescens Kze Farrn. t. 55. f. 3. Han formoder fremdeles, at Blechnum ciliatum hos Mart. & Gal. p. 50, som neppe er den Presiske henhører hertil, og findes da paa Klipper ved Mirador.

4. **Lomaria danæacea** Kze fil. Leibd. l. c. p. 326.

Funden af Leibold ved Bække i den tempererte Region.

Kunze bemærker, idet han beskriver baade den golde og frugtbare Plante, at det er tvivlsomt om den sidste hører til den første, da han kun har set Fragmenter af samme. Dette Punkt seer jeg mig ikke istand til at oplyse, da jeg i Mexico ikke har truffet nogen Plante, hvorpaa Diagnosen kunde finde Anvendelse.

5. **Lomaria ensiformis** Liebm.:

fronde coriacea glabra, *sterili* antice olivaceo-viridescente, postice pallidiori, 3 pedali, stipite 8–10 pollicari, ovato-lanceolata pinnata, pinnis numerosis circ. 26–28 cujusvis lateris, 6–7 poll. longis, 7–8 lin. latis, sursum decrescentibus, alternis, infimis remotioribus sursum magis approximatis, linear-lanceolatis adnatis ensiformibus longe acuminatis acutis, inferioribus supra basin parum contractis, superioribus basi utrinque dilatatis, margine integerrimo cartilagineo incrassato reflexo, sinibus latis obtusis angulatis, venis supra obsoletis immersis, subitus conspicuus obscuris simplicibus furcatis rectis, costa antice canaliculata, postice acuta, rhachi stipiteque antice sulcatis postice convexis glabris; *fertili* 2–3 pedali pinnata, pinnis cujusvis lateris circ. 30 alternis sursum oppositis 5–6 poll. longis, 2 lin. latis, linearibus flexuosis apice recurvatis sessilibus basi parum contractis, margine revolutis, acutis coriaceis crassis, costa antice lata applanata, pagina inf. sporangiis fuscis omnino tecta.

Voxer paa fugtige skyggefulde Steder i stenig Jordbund i Skove ved Teotalcingo, Dep. Oajaca District Chinautla (4–5000').

I Udseende har den meget tilfælles med de to efterfølgende Arter, men adskilles strax ved de helrandede tilvoxne Finner.

5. **Lomaria falciformis** Liebm.:

fronde coriacea supra obscure olivaceo-viridi, subtus pallide olivacea, 2–3 pedali, 7–8 poll. lata, stipite pedali, elongato-lanceolata pinnata, pinnis lanceolatis falcatis 4 poll. longis, 8 lineas latis, alternis sessilibus, infimis brevipetiolatis, basi oblique cuneato-cordatis margine cartilagineo reflexo argute adpreso que mucronato-serratis, apice acuminatis serratis, costa antice canaliculata hic illic squamis linearibus undulatis flaccidis 2–3 lin. longis tenuissime membranaceis adpersa plerumque glabra, postice convexa e basi et supra medium squamis oblique lanceolatis tecta, venis utrinque prominulis furcatis parallelis; stipite et rhachi antice canaliculatis postice convexis squamis floccosis obsitis, basi stipitis squamis magnis 6–7 lin. longis 1–1½ lin. latis falcato-lanceolatis rufis instructa; *fertili* non visa.

Denne anseelige Art tilhører de mexicanske Cordillerers höiere Regioner, og voxer paa fugtig Leergrund. Jeg fandt den ved Bredden af et lille Vandløb ved Chinautla (Dep. Puebla, 7000') sammen med *Pteris aquilina*; senere paa Cerro de Sempoaltepec Dep. Oajaca 9000'.

Den nærmer sig til efterfølgende Art, men adskilles ved siddende Finner, som ere meget kortere, ikke udtrukne i en lang Spids, ved Grunden skjæve kile-hjerteformige, endelig ved de tiltrykte spidse Tænder i Randen.

7. *Lomaria spectabilis* Liebm.: Blechnum (*Lomaria*) sp. an nova? Schlechd. Linnæa 5. p. 613. *Lomaria Schiedeana* Presl. Pteridgr. p. 143. (nomen). *Lom. longifolia* (Schlechtd. qvid?) Mart. & Gal. I. c. p. 49.

Fronde coriacea, *sterili* 3—4 pedali, stipite pedali, ovato-lanceolata pinnata, pennis numerosis 6—7 poll. longis pollicem latis elongato-lanceolatis apicem versus leviter falcato-curvatis longiacuminatis acutis argute serratis, basi oblique ellipticis obtusis, margine cartilagineo reflexo subintegro, petiolatis, petiolis inferioribus longioribus semipollicularibus sursum brevioribus, pennis summis sessilibus, costa antice canaliculata glabra postice convexa squamis deciduis lanceolatis hic illuc adspersa, venis tenuibus parallelis simplicibus furcatis, colore frondis antice olivaceo, postice pallidiori; rhachi canaliculata marginata floccoso-squamosa, stipite stramineo glabro nitido; *fertili* 3 pedali pinnata, pennis 6—7 poll. longis 2—3 lineas latis linearibus flexuosis sessilibus vel supra basin conniventibus et in petiolum minimum attenuatis, acutis coriaceis crassis marginibus incrassatis, pagina anteriori nigricanti, posteriori costa excepta sporangiis rufis obtecta, costa straminea squamis deciduis obsita, indusio marginali tenui membranaceo fragillimo sensim deciduo.

Rhizoma verticale crassum 3—4 poll. elevatum frondes numerosas spiraliter dispositas et infundibulum elegans formantes extus steriles intus fertiles emitens.

I Regionen imellem 3 og 4500 Fod paa Mexicos Østside hører denne Art ingenlunde til Sjeldenhederne. Den voxer i Skovvegne ved Randen af rindende Vand. Jeg fandt den ved Mirador, Totutla, Dos Puentes, S. Antonio Huatusco, fra August til April. Schiede fandt den ved Jalapa; Galeotti ved Totutla. Det synes som om ikun Brudstykker hidtil have været samlede af denne Bregne, og at dette har givet Anledning til den Vaklen hos Forst, og de Feiltagelser, som de ovenciterede Synonymer tyde hen paa. Schiede synes kun at have sendt Brudstykker af det golde Löv, hvorfor Schlechtendal var uvist om han havde med en Blechnum eller *Lomaria* at gjøre. Schlechtendal kunde naturligvis ikke tænke paa at give en Beskrivelse efter sit utilstrækkelige Materiale, men anførte blot en og anden Gisning om Plantens mulige Affinitet. Dette var nok for Presl til at opstille en *Lomaria Schiedeana*, et Navn, som slet ikke støtter sig til nogen Artsbeskrivelse, og altsaa

ingen videnskabelig Begrundelse har. I Martens og Galcottis Memoire anföre disse Herrer en *L. longifolia* Schlechtd., men en saadan existerer aldeles ikke. Hvis dette skal rettes til *L. longifolia* Kaulf., en slyngende Bregne fra Martinique og Puerto rico, eller til *L. longifolia* Kze fil. Poepp., en parasitisk Art fra Cuba, da er Bestemmelsen saa urigtig som mulig, thi vor Plante har Intet at gjøre med disse Arter.

Presl hentør den Gruppe af Lomaria, hvortil denne Art hører, til sit Genus Olfersia af Acrostichaceernes Tribus, men Intet er vissere end at disse Arter ere forsynede med Indusium, og altsaa umuligt kunne være Acrostichaceer.

En Monstrositet af denne Art har jeg et Par Gange bemærket, paa hvilken det golde Löv fructificerer nedenfra opad til, saa at paa alle de nedre Finner de $\frac{2}{3}$ Dele ere indrullede og bedækkede med Kapsler, medens den yderste Trediedel er udbredt som sædvanlig paa golde Löv, alle øvre Finner ere uforandrede uden Antydning til Frugt.

7. Lomaria deflexa Liebm.:

fronde coriacea, *sterili* bipedali et insuper, stipite spithameo, ovato-lanceolata, pinnata, pinnis alternis 4 poll. longis $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ poll. latis numerosis sessilibus elongato-lanceolatis deflexo-falcatis longe acuminatis acutis basi oblique cordatis, margine subreflexis scarioso-crenulatis, costa antice canaliculata glabra, postice convexa squamis lanceolatis adpressis e basi ad medium circiter obsita, venis parallelis simplicibus furcatis ante impressis postice prominulis apice globuloso ante marginem desinentibus, colore pinnarum antice olivaceo, postice pallidiori; stipite rhachique antice canaliculatis, postice convexis, squamis linearibus undulatis deciduis tectis; *fertili* non visa.

I Skove paa steile Bjergsider imellem Totontepc og Trapiche de la Concepcion.

Skjöndt Bregnem hidtil kun er seet gold, er den dog tilstrækkelig charakteristisk til deri baade at erkjende Slægten og den nye Art. I Habitus nærmer den sig til de to foregaende, men adskilles let ved de nedadvendte seglformige Finner, den hindeagtige finkarvede Rand, o. fl.

Blechnum L.

1. Blechnum seabrum Liebm.:

fronde rigida coriacea $2\frac{1}{2}$ —4 poll. longa, 5—8 lin. lata, stipite perbrevi (2—5 lin. longo), elongato-lanceolata, utrinque attenuata, apice acuminata acuta, pinnatisecta, lacinias usque ad rhachin incisis approximatis sursum confluentibus, deorsum parum remotis decrescentibus, infimis auriculæformibus, falcato-lanceolatis $1\frac{1}{2}$ —4 lin. longis, $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ lin. latis, apice obtusis apiculatis, basi utrinque dilatatis, margine scabris revolutis parum repandulis; terminali $\frac{1}{2}$ ad pollicem longa lanceolata acuta margine repanda; costa venisque furcatis ante immersis postice prominulis; soris costæ approximatis rufis, inferiori superiorem superante,

indusiis integerrimis angustis scariosis; rhachii stipiteque utrinque scabris antice canaliculatis, postice convexis, stipite basin versus squamis majusculis lanceolatis undulatis membranaceis dilute rufescentibus obsito. Rhizoma subterraneum breve subobliquum squamosum sursum frondes cæspitosas, deorsum radiculos numerosos longissimos ramosos emitens.

Denne lille Art voxer selskabelig paa Jordvolde af rød jernholdig Leer omkring den afbrændte Kirke i Teotalcingo (Districtet Chinantla, Dep. Oajaca, 4000'), sammen med *Trichomanes rigidum*, *Lycopodium cernuum* o. dl., og fructificerer i Juni.

Den bliver at indordne ved Siden af *B. asplenoides* Sw. Vet. Acad. Hdlr. 1817 p. 72. t. 3 f. 3, hvormed den har den største habituelle Lighed, men hvorfra den adskilles ved et dybere indskaaret Löv, idet Bugterne imellem Fligene naae lige ind til Lövaxen og ere bredere; Fligene ere længere, mere adskilte, mere budte og noget seglformig opadbøede, Randen tilbagebøjet, ru, svag rundbugtet, Aarerne kløvede til Midten; den yderste Flig længere og mere tilspidset; de nederste øreformige Flige færre; Stilkene og Lövaxen paa begge Sider rue.

2. *Blechnum aduncum* Liebm. : *B. (occidentale) confluens*, an var. an spec. Schlechd. Linnæa v. 5. p. 613 n. 779?

fronde cartilagineo-coriacea glaberrima nitida olivacea, *sterili* 15—18 poll. longa, 3 poll. lata, stipite 4—6 pollicari, lanceolata acuminata acuta pinnatisecta basi pinnata utrinque decrescente, pinnis laciiniisque adnatis alternis falcato-lanceolatis acuminatis acutis margine revolutis integris; infimis vix pollicaribus basi inferiori auriculato-incisis, superiori dilatatis; mediis 1½—1¾ poll. longis 5 lineas latis utrinque dilatatis, sinubus acutis angustis curvatis, costulis antice canaliculatis postice elevatis convexis, venis semel-bifurcatis curvatis postice parum prominulis; stipite rhachique antice canaliculatis postice acutangulis; *fertili* sterilibus longiori (16—19 poll. longa, 3—4 poll. lata, stipite 3—5 poll.), pinnatisecta basi pinnata, laciiniis longioribus (2—2½ poll. longis), angustioribus (3 lin. latis), remotioribus basi magis dilatatis, sinubus multo amplioribus obtusissimis, soris rhachis attingentibus costulae utrinque contiguis ante apicem desinentibus, sporangiis castaneis, indusiis membranaceis integris.

Voxer paa lerede Bakker imellem Krat af *Myrica jalapensis*, *Baccharis*, *Cassia* o. a. i Nærheden af S. Antonio Huatusco (4500'), og fructificerer i Februar. Forsaavidt min Formodning, at det Schlechtendalske Synonym hører hertil, er rigtigt, da er Planten desuden funden ved Hacienda de la Laguna af Dr. Schiede.

Det Par Ord, hvormed Herr v. Schlechtendal omtaler Planten gjør det umuligt med Sikkerhed at afgjøre om min Plante og den Schiedeske ere identiske. Phrasen: folio pinnatifido, nec pinnato, pinnis (ɔ: laciiniis) basi semper confluentibus, nec discretis auri-
culatis, passer meget godt paa min *B. aduncum*. Naar Forf. derimod siger: a *B. occiden-*

tali hoc unico charactere diversum, staaer det ikke i Samklang med Formodningen, thi B. aduncum adskilles fra B. occidentale ved mange andre Charakterer end det halvfinnde Löv.

3. Blechnum intermedium Link. h. Berol. 2 p. 75. Ej. Spec. Fil. h. b. p. 77.
Kze Farrn. p. 128. t. 57. f. 2 (optimal)

Voxer i Bunden af skyggefulde Skove, og i Barankernes Dyb i Mexicos tempererte Region paa 3000 Fods Höide omkring Hac. de Mirador, Consoquitla.

Denne Plantes Födeland var hidtil meget tvivlsom. I forskjellige botaniske Haver i Tydskland og England har den været indført siden Aaret 1833. Ved ovenstaaende Localitet har det været mig kjært at afgjøre Spørgsmaalet om Bregnens Hjem.

Prof. Kunzes Beskrivelse er efter Sædvane fortræffelig; mine vildtvoksende Exemplarer afvige i følgende Punkter fra de af Link og Kunze beskrevne Have-Exemplarer:

Spec. culta: pinna terminali obtusiuscula.

— *spontan.*: pinna terminali acutissima.

De af Kunze givne Maal passe ikke ganske paa mine Expl., som ere større: Lövet er saaledes indtil 9 T. langt, Pladen indtil 5 T.; Terminalfinnen 4 T., Stilk 4 T.; Sidefinnerne 1—2 T. lange, to—tre Par findes foruden de afrundede ørede Anhængsler ved Terminalfinnen.

4. Blechnum glandulosum Link. h. Ber. 2 p. 462. Kze Farrn. p. 139. t. 58 f. 2
(optimal) Kze Addit. l. c. p. 140.

Den findes i fugtige skyggefulde Skove imellem 3—4500 Fod paa Cordillerernes Østside; jeg fandt den hyppig i Skove om Mirador; Schiede ved Jalapa.

Anm. Den hos Mart. & Gal. l. c. p. 51. Coll. H. Gal. no. 6302 under Navn af B. gracile omtalte Bregne, som neppe er den øgle Kaulfussiske, hidtil kun kjendt fra Brasilien og Peru, og af Galeotti anføres fra Mirador, voxende paa Klipper i Nærheden af Vanddrag eller i Bunden af Baranker, vil identivl ved Undersøgelse af de galeottiske Exemplarer vise sig enten at være B. glandulosum eller B. intermedium.

5. Blechnum occidentale L. Cav. præl. p. 262. no. 648. Mart. & Gal. l. c. p. 50.
B. caudatum Cav. præl. p. 262. no. 649. Kze fil. Poep. p. 61. Ej. fil. Leibd. l. c. p. 328. Mart. & Gal. l. c. p. 50.

I skyggefulde Skove paa Mexicos Østside fra den hede Kyst indtil 4000 Fods Höide. Jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Hac. de Jovo, Mirador. Galeotti angiver Jalapa, Zacuapan, Villa alta, Rio grande de Lerma ved Guadalaxara, men paastaaer at den findes paa Træer, hvilket jeg paa det bestemteste maa benægte.

Naar man i Mexicos østlige Skovegne har indsamlet Hundreder, og seet Tusinder af

Exemplarer af denne i Habitus meget foranderlige Art, opgiver man let Tanken om Artsforskjelligheden af *B. occidentale* L. og *B. caudatum* Cav. See vi først hen til den spanske Beskrivelse af begge hos Cavanilles, da ere de adskillende Charakterer af ringe Vægt hos Former af saa stor Foranderlighed. De Forfattere som ikke stolede blindt paa Autoriteter, men selv undersøgte de Sager, de omhandlede, haveaabent ikke kunnet blive enige med dem selv, om de her skulde antage to eller en Art. Kunze, hvis Stemme i Spørgsmaal, som angaae Bregner, er af den høieste Betydning, har i dette ikke været paa det rene; i fil. Poep. p. 61 bemærker han, at det maaske vil være rigtigst at ansee *B. occid.* og *B. caudat.* som Former af en Art; i fil. Leibd. p. 338 siger han derimod, at *B. caudatum* Cav. synes at være forskjellig fra *B. occident.*, uden at vi dog lære, hvori de væsentlige Forskjelligheder bestaae, thi de af de ældre Forff. angivne Mærker have ganske vist ingen Betydning.

Tvivlsom.

***Blechnum polypodioides* Raddi.** Kze Addit. I. c. p. 140.

Angives af Kunze som mexicansk samlet af Dr. Schiede uden Angivelse af Voxested. I Kunzes Farrnkräuter p. 430 findes Mexico ikke nævnet iblandt Bregnens Voxesteder, og jeg tvivler meget paa, at den findes der.

Hvad den hos Mart. & Gal. I. c. p. 50. omtalte Blech. *polypodioides* (Coll. H. Gal. no. 6383), som skal voxne paa gamle Ege ved Llano verde (7—7500'), monne være, derom er det mig ikke muligt at vove nogen Gisning; kun det tør jeg sige, at Forff. ikke kunne have bestemt deres Plante rigtigt, saasandt hverken denne eller overhovedet nogen eneste virkelig *Blechnum* i Mexico voxer parasitisk paa Ege eller andre Træstammer. *B. polypodioides* er en Bregne, som voxer i Bundene af fugtige Skove, og ikke paa Træer!

Woodwardia Sw.

1. ***Woodwardia radicans* Sw.** Schlechd. Lin. 5. p. 611. Kze fil. Leibd. I. c. p. 328. Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 685. *W. spinulosa* Mart. & Gal. I. c. p. 64.

Udbredt i Mexicos østlige Cordillereregion imellem 4 og 8000 Fod. Voxer især paa kraftbegroede Leerbakker i Skovene. Jeg fandt den hyppig omkring S. Antonio Huatusco (4500'), og paa Bjergsider ved Chinautla Dep. Puebla (7—8000'). Dr. Schiede fandt den ved Jalapa. Galeottis Angivelse, at den skal voxne paa Vulkanen Orizaba imellem 9 og 12000 Fod kan jeg ingenlunde give Medhold.

Bregnene, som er udbredt over et meget stort Fladerum i Europa, Asien og America, er dog ikke megen Variation underkastet. Ikke destomindre have Martens og Galeotti opstillet den mexicanske Form som ny Art, men den Charakteer, hvorpaa Artsforskjelligheden

skulde beroe, er aldeles betydningslös, og, hvad værre er, i 9 Tilfælde af 10 urigtig. Kunze har allerede tidlige inddraget hin Art.

Efter de Berghes benyttes Planten som Lægeplante af Mexicanerne under Navn af Chascal fino i varme Bade.

Asplenium L.

* Euasplenium: venis simplicibus vel furcatis.

1. ***Asplenium fragile Presl.*** Pteridgr. p. 108. Kze Addit. Lin. v. 13. p. 140. A. stoloniferum Presl. Rel. Hæk. 1. p. 44. t. 6. f. 4.

Den er hidtil kun sendt fra Murene af Hacienda de Regla af C. Ehrenberg.

5. ***Asplenium melanocaulon Willd.*** sp. v. 5 p. 332. Mart. & Gal. l. c. p. 59.

Galeotti anfører den fra Pico de Orizaba (9—11000') voxende paa Trachyklipper, og fra Llano verde i Oajaca (7—8000'). Et enkelt Exemplar fandt jeg i Klippekloster ved Villa alta i Dep. Oajaca. Den undgaaer let Opmærksomheden ved sin Lidenhed.

3. ***Asplenium heterochroum Kze fil.*** Poepp. p. 67. Mart. & Gal. l. c. p. 60.- Col. H. Gal. no. 6444.

Paa Trachyklipper ved Guadalaxara efter Galeotti.

4. ***Asplenium resiliens Kze fil.*** Leibd. l. c. p. 331. A. parvulum Mart. & Gal. l. c. p. 60. t. 15. f. 3. (mediocris).

Galeotti fandt den paa Oajacas østlige porphyritiske og Kalk-Bjerge ved Capulapan og Hacienda del Carmen (6—7000'). Af Leibold anføres den fra Mure i den tempererte Region. Mig ubekjendt.

5. ***Asplenium castaneum Schlechtd.*** Linnaea. v. 5. p. 611. n. 768. Kze fil. Leibd. l. c. p. 332.

Dr. Schiede fandt den i en Hule paa Vulkanen Orizaba; Leibold medbragde nogle ufuldstændige Exemplarer, som angives fra den tempererte Region.

Anm. Disse 5 Arter staae hinanden meget nær, og danne en lille naturlig Gruppe af Slægten, hvortil A. Trichomanes og A. viride henhøre. De ere alle Jordbregner.

6. ***Asplenium monanthemum L.*** Smith ic. ined. t. 73. Schlechtd. adumbr. p. 27.

Ej. Linnaea 5. p. 612. Mart. & Gal. l. c. p. 57. 58. Kze fil. Leibd. l. c. p. 331. Benth. pl. Hartw. p. 54. Cav. prælec. p. 258. n. 637. Nees ab E. Lin. 49. p. 685. En særdeles udbredt Art i Mexico, der findes fra 3000 til over 10,000 Fods Höide;

dog især hyppig i de højere Regioner. Den voxer i Skovene i Klippekløfter. Jeg fandt den ved S. Antonio Huatusco paa Steendiger, i Klippekløfter; ved Chinaulta Dep. Puebla (7°00'), paa Vulkanen Orizaba paa Klipper i Omegnen af Vaqueria del Jacal (10000'). Schiede fandt den i Skove ved Jalapa; Galeotti ligeledes paa Vulk. Orizaba indtil 11500' (Østnok noget for højt angivet), paa Porphyrbjerge i Real del Monte (8—9000'), paa Kalk ved Sola Dep. Oajaca (5—8000'), Puente nacional (1000'), Juquila Dep. Oajaca paa Mexicos Vestside (4500—5500'). Hartweg sendte den fra Real del monte.

Den er meget foranderlig i Størrelse og Udseende. I Regionen imellem 7—8000' synes den at befnde sig bedst, og Lövet opnaer der indtil 15 Tommers Længde og over 1 Tommes Brede. Den mærkværdige Bulbildannelse, som allerede er omtalt af flere Forfattere, bliver især hyppig i høj Region. Disse Bulbiller frembryde baade af Stilkens og af Lövaxen (Rhachis), og derfra udskyder da enten et enkelt eller et helt Knippe af nye Löv. Baade imod sin øvre og nedre Grænde blive Formerne mere sammentrængte, mindre i alle Dele. Sori ere kun hos de mindre Former enkelte, hos de større findes 2—4—6, ja stundom selv stillede i to Rækker.

7. *Asplenium areuatum* Liebm.:

fronde cæspitosa herbacea glaberrima 6—9 poll. longa, 7—9 lineas lata, stipite brevi vix pollicari, lineari-lanceolata apicem versus eleganter arcuata, pinnata, utrinque decrescente, pinnis 4 lineas longis 2 lin. latis sessilibus dense imbricatis horizontalibus vel leviter deflexis alternis subparallelogrammis, basi interiori rectis integris, superiori truncatis rectis apice rotundatis obtusis rotundato-repandulis, margine superiori obsolete repandis, venis conspicuis apice clavatis ante marginem desinentibus, soris margini inferiori approximatis et parallelis 2 imbricatis; stipite rhachique filiformibus elasticis arcuatiss nigrerimis nitidis antice planbatis marginatis, postice convexis.

Rhizoma breve terrestre radiculis plurimis diffusis instructum.

Obs. Pinne facile decidunt, rhachesque denudatae arcuatae restant. Color frondis glauco-viridis, postice parum pallidior.

Voxer paa Klipper i Skove og Baranker omkring Hac. de Mirador og Zazuapan (2500—3000'), og fructificerer i November.

I Udseende nærmer den sig til *A. formosum*, men adskilles let derfra ved en Mængde Charakterer.

8. *Asplenium formosum* Willd. Schlechtd. Lin. 5. p. 612. Mart. & Gal. I. c. p. 59. Kze fil. Leibd. I. c. p. 332.

Hyppig forekommende i den tempererte Region paa Mexicos Østside imellem 2—5000'. Den voxer i Skovene paa tørre Klipper, i Kløfter eller paa tør haard Leerjord i Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

Skovene. Jeg fandt den i Potrero de Consoquilla (2500'), ved Mirador, ved Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca (c. 3000'), Tepitongo Dep. Oajaca (5000'). Schiede fandt den ved Hac. de la Laguna. Galeotti fortæller, at den findes i den umiddelbare Omegn af Vera Cruz fra 500—2000', men heri er der ingen Mening, da Vera Cruz ligger ved Havet i en Sandørk uden nogensomhelst Höide i Nærheden. Landet hæver sig til 2000 Fods Höide først i en Afstand af henimod 20 Leguas Vest for Byen.

Anm: Disse tre Arter danne en naturlig lille Afdeling, charakteristisk ved de horizontale med Randen parallele, og denne tilmærmede Frugthøbe.

9. *Asplenium harpeodes* Kze fil. Leibd. I. c. p. 329. *A. falcatum* (W?) Mart. & Gal. I. c. p. 58*).

Synes at være indskrænket til et lidet Areal i Mexico, idet den hidtil ikkun er funden af Galeotti, Leibold og mig i Omegnen af Mirador, Zazuapan og Totutla (3—4000'). Den voxer paa de skyggefuldeste fugtigste Steder, og udelukkende paa de med nedløbende Rodfibre tæt bedakkede træagtige Stammer af Cyathaea mexicana og Alsophila Schiedeana. Prof. Kunzes Beskrivelse er som sædvanlig saa fortrinlig, at Intet er at tilføie.

10. *Asplenium erectum* Bory. Schlechtd. Adumbr. p. 28 t. 15. Schlechtd. Linnæa v. 5. p. 612. n. 772.

Samlet af Dr. Schiede, men Stedet Jalapa er ikke sikkert.

Om Asp. erectum? Bory. Mart. & Gal. I. c. p. 61, Coll. H. Gal. no. 6271, hvilken Galeotti angiver fra Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7500—8000'), voxende paa Klipper i Skovene, er rigtig bestemt, synes tvivlsomt, især af den Grund, at Forff. fjerne denne Art ved 10 mellemkommende Arter fra *A. inaequilaterale* (Willd.) Mart. & Gal. I. c. p. 57, uagtet denne af Schlechtendal stilles som Synonym til *A. erectum*. Vel henfører Presl *A. inaequilaterale* Willd. som Synonym til *A. resectum* Smith, men denne Art er overordentlig nærlægende til *A. erectum*, saa at man aldeles ikke begriber Opstillingen af Arterne i det martens-galeottiske Værk.

Overhovedet synes der at herske en chaotisk Forvirring i Artsbestemmelserne af den Afdeling af Slægten *Asplenium*, hvortil *A. erectum* henhører. Her trænge vi mere end sædvanligt til J. W. Hooker's eller Kunze's opklarende, ordnende Aand. Jeg frygter navnligen at Forff. have været noget for raske med at henføre flere americanske Former til Arter, som ere blevne beskrevne fra Cap, og er tilbøjelig til at troe, at nøjagtig Undersøgelse vil vise væsentlige Forskjelligheder inellem de africanske og amerikanske Former.

*) Naar Galeotti (I. c.) siger, at Planten iblandt andre træagtige Bregner ogsaa voxer paa *Alsophila pruinata*, da skal jeg her kun bemærke, at *A. pruinata* o: den Art, som hidtil af mexicanske Florister har gaet under dette Navn, aldeles ikke er træagtig, saa at følgelig *A. harpeodes* ikke vel kan voxe parasitisk paa den. Mere om dette paa andet Sted.

11. *Asplenium miradorensis* Liebm.:

fronde cæspitosa herbacea glaberrima late viridi 5—7 poll. longa, pollicem circiter lata, stipite brevi $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ ad pollicem longo, elongato-lanceolata attenuata, utrinque decrescente, pinnata, pinnis densus 25—35 cujusque lateris, 5—6 lineas longis lineam latis, alternis horizontalibus subpetiolatis rhomboideo-ovatis obtusis, basi oblique cuneatis, basi superiori truncatis rectis, basi inferiori rectis integris abscissis, margine superiori et anteriori obtuse crenatis, soris pluribus venis lateralibus impositis biserialibus costæ approximatis ovalibus semilineam longis, indusiis semilunatis; stipite rhachique tenuibus flexuosis teretibus fuscis sursum viridibus marginatis, margine herbaceo decurrente viridi.

Rhizoma breve terrestre nudum radiculis longissimis intricatis rufo-villosis instructum.

Den findes paa tørre Klipper eller ved Foden af Ege paaaabne Steder i Skove omkring Mirador.

Habituel Lighed har denne Art med *A. erectum*, men adskilles ved følgende: Finnerne skjæv-sirkantet-aegformige uden Øre ved øvre Grund, ret afskaarne ved Finernes nedre Side, afrundet karvede; Frugthobene smaae.

A. resectum Smith adskilles ved lancetformige tilspidsede dobbelt-saagtakkede Finner.

12. *Asplenium abscissum* Willd. Kze Addit. I. c. p. 141. Mart. & Gal. I. c. p. 59.

Sendt af Dr. Schiede fra Mexico uden Angivelse af Voxested. Dersom den af Martens og Galeotti anførte Plante er rigtigt bestemt (Jyfr. Coll. H. Gal. no. 6588), da findes den paa Bredden af Skovbække ved Totutla (4—4500').

13. *Asplenium lugubre* Liebm.:

fronde herbacea glabra antice atrovirente postice pallidiori glauco-viridi, 9—12 poll. longa, 3 poll. lata, stipite 4—6 pollicari, lanceolata, apice attenuata, pinnata, pinnis alternis horizontalibus patulis 16—22 cujusque lateris brevipetiolatis trapezio-lanceolatis, subfalcatis obtusis 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longis, 4—5 lineas latis, basi oblique cuneatis, superiori truncatis, inferiori resectis, margine parum incrassatis revolutis, superiori et anteriori irregulariter obtuso-serratis, serraturis emarginatis, pinnis sursum decrescentibus sessilibus, denum confluentibus; soris pluribus biserialibus costæ prominulæ approximatis; stipite rhachique castaneis nitidis glabris sursum leviter flexuosis, antice canaliculatis postice convexis.

Rhizoma horizontale carnosum nudum radiculos validos numerosos intricatos fusco-vilosos emittens.

Diftert ab *A. exciso*, cui proxima: rhizomate repente nudo, rhachi pinnarum non marginata, serraturis irregularibus emarginatis.

Voxer paa overskyllede Klipper i og ved Aalöb i Baranker ved Mirador, hvor Frugtexemplarer samledes i Januar.

Jeg anseer det for meget sandsynligt, at nogle af de under foregaaende Nummer henførte Former i Virkeligheden henhøre under denne Art.

14. *Asplenium semicordatum Raddi* nov. gen. & spec. fil. Bras. p. 36. t. 52 f.

1. Kze Addit. I. c. p. 141. *A. discolor* (an Kze?) Mart. & Gal. I. c. p. 56.

En i Mexicos hede og tempererte østlige Region temmelig udbredt Art. Den voxer i Skovgne og dybe skyggefulde Baranker paa Klippegrund eller imellem Stene ved rindende Vand, hvorfra den jevnlig overskylles. Jeg fandt den omkring Mirador, i Baranker ved Huitamalco, ved en Skovbak paa Hac. de Jovo, ved S. Pedro Tepinapa i Oajaca. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco, Galeotti ved Zazuapan.

Den varierer i Størrelse fra 4—9 Tommer; Finnere ere snart tilspidsede, snart budte.

I Martens og Galeottis Memoire p. 59 (Coll. H. Gal. no 6340) finde vi opstillet en *A. semicordatum* Raddi, adskilt ved 7 mellemkommende Arter fra *A. discolor*. Men *A. semicordatum* Raddi og *discolor* Kze ere saa' nærstaaende, at Presl endog henfører den sidste som Synonym til den første. Ubegribeligt bliver derfor hin Opstillingsmaade hos Martens og Galeotti, med mindre Forff. have bestemt *A. semicordatum* urigtigt, hvilket bliver sandsynligt ved at lægge Mærke til det af dem angivne Stedforhold. De sige nemlig, at *A. semicordatum* voxer paa gamle Ege ved Llano verde i Oajaca (7—7500'), en Angivelse, hvis Usandsynlighed er iøjnefaldende. Det er saaledes klart nok, at en Feil her er tilstede, men da Galeottiske Exemplarer ikke foreligge, kan jeg ikke opklare Sagen videre.

15. *Asplenium riparium Liebm.*: *A. repandum* (vix Kze.) Mart. & Gal. I. c. p. 56?

fronde herbacea atroviridi, postice pallidiori glauco-viridi, 1—1½ pedali, 4—7 poll. lata, stipite 4—6 pollicari, lanceolata pinnata, pinnis alternis 8—13 cujusque lateris patulis brevipetiolatis dimidiato-hastato-lanceolatis subfalcatis longe acuminatis acutis, 2½—4 poll. longis, 6—8 lin. latis, basi oblique cuneatis integris, superiori truncatis obtuse-auriculatis, (auricula variabili majori minori plus minus obtusa, integra aut denticulata), inferiori recisa, margine superiori et anteriori irregulariter obtuso-serratis, interdum obsolete repandulis; pinnis utrinque decrescentibus, infimis remotioribus obtusis, terminali irregulariter hastata auriculis basilaribus plus minus productis; costa venisque repetite furcatis curvatis marginem attингentibus vix prominulis atris, soris pluribus biserialibus costas approximatis 3—5 linea longis; stipite rhachique glabris sursum parum flexuosis antice obsolete canaliculatis, postice compressiusculis.

Rhizoma terrestre horizontale carnosum breve nudum radiculos intricatos emittens.

Diffr. ab. A. repandulo Kze: forma longitudineque pinnarum, incisuris marginis, loco natali, cet.

Den voxer paa oversvømmede Klipper i Bækkeløb i Skovegne og Baranker i den østlige Region imellem 2—3000'. Jeg fandt den i Baranca de S. Francisco og andre Kløfter i Nærheden af Mirador, samt paa Hac. de Jovo. Galeotti angiver sin A. repandum fra lignende Localiteter ved Zazuapan.

Jeg anseer det for utvivlsomt, at den Poeppigske Plante, som voxer paa Træer i Bjergskove om Pampayaco i Peru, er specifisk forskjellig fra denne Vandbregne, hvortil den efter Beskrivelsen synes at nærme sig noget, men dog frembyder ikke faae Uoverensstemmelser. Skjöndt jeg ingen Tivil har om, at A. repandum Mart. & Gal. er identisk med min Art, hvilket jeg fornemmelig slutter efter Forff's Localangivelse har jeg, saalænge jeg ikke har seet Exempl., tilføjet et Spørgsmaalstegn.

A. riparium hører til de meget foranderlige Arter i Henseende til Lövets Længde, Finnernes Antal, Retning, som snart er næsten horizontal, snart mere opret, disses Længde, Brede, meer eller mindre seglformige Böining; snart ere de udtrukne i en lang Spids, snart ere de meget kortere og budte; Randens Indskjæring, hvilken næsten kan forsvinde; især er den øreformige Udvidning ved Finnernes øvre Grund meget foranderlig; snart mangler den aldeles, snart er den meget stærkt udviklet, snart bred stumpetandet, snart næsten spids helrandet o. s. fr. Hvis der ikke existerede en Asp. polymorphum, da burde denne Art kaldes saaledes.

16. *Asplenium birenatum* Liebm.:

fronde subcoriacea glabra glauco-viridi, subtus pallidiori, 15 poll. longa, 6 poll. lata, stipite 4—5 pollicari, lanceolata pinnata, pinnis remotis 12—15 cujusque lateris, sursum sensim decrescentibus alternis horizontalibus petiolatis (petiolis bilinearibus compressis), 3 poll. longis, 6—8 lin. latis, oblique lanceolatis longe acuminate acutis, basi superiori cordato-auriculatis, auricula rotundata vel angulato-rotundata crenata, inferiori deorsum truncatis integris, margine utrinque inciso-bi-rarius tri-crenatis, crenaturis obtusis; costa antice prominula, postice immersa, venis utrinque immersis sub angulo acutoexeuntibus bifurcatis, soris costæ approximatis 3 lineas longis; stipite rhachique glabris fuscis antice canaliculatis, postice acutangulis.

Voxer i skyggefulde Skove i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca, og henhører saaledes til den varm-tempererte Region imellem 2—3000' paa Cordillerernes østlige Heldning.

Fra den foregaaende Art, hvormed den stemmer overens i Størrelse, adskilles den let ved Finnernes Grund, som ere ovenstil hjerteformige, nedentil skjævt afskaarne, samt ved Randens dobbelte Karvning. Større Lighed har den med A. semicordatum, men adskilles

ved Lövets Störrelse, Finnernes mere end dobbelte Længde', lang udtrukne Spids, og den dobbelte Karyning af Randen.

- 17. *Asplenium dimidiatum* Sw.** A. zamiæfolium (non Willd.) Kze Farrnk. p. 103. t. 48. Presl. Rel. Hæk. I. p. 43.

Angives af Presl som samlet i Mexico af Th. Hænke, men uden at Voxested nævnes. Ingen anden Botaniker har fundet den senere i Mexico.

- 18. *Asplenium polymorphum* Mart. & Gal.** I. c. p. 56. t. 15. f. 2. Kze fil. Leibd. I. c. p. 330.

Voxer i Skovegne i den østlige tempererte Region imellem 2—4000 Fod, især paa Klipper ved rindende Vand; saaledes ved Mirador, Zazuapan, Totutla og Hac. de Jovo.

Til de af Kunze givne critiske Bemærkninger har jeg blot den at tilføie, at paa samtlige mine Exemplarer er Lövstilken glat, og ikke saaledes som det hedder hos Martens og Galeotti haaret og skjællet.

- 19. *Asplenium Serra Langds. & Fisch.*** Ic. fil. p. 16 t. 19. Kze fil. Poepp. p. 53 et var. remotum Kze I. c. Hook. in Bent. pl. Hartw. p. 97. Mart. & Gal. I. c. p. 55. Kze fil. Leibd. I. c. p. 328.

En i Mexico sparsom forekommende Art, der især findes i den østlige tempererte Skovregion imellem 3—4000'. Jeg fandt den i Baranker ved Mirador paa Træstammer; Galeotti ved Totutla paa Klipper; Leibold i den tempererte Region; Hartweg paa Bjergene las Nubes.

20. *Asplenium insigne* Liebm.:

fronde coriacea 3 pedali, 10 circiter pollices lata, stipite pedali et insuper, lanceolata pin-nata, pinnis remotis 20—25 cujusque lateris alternis patulis petiolatis, (petiolis 2—3 lin. longis fusco-squamulosis), 6 pollices longis, 6—8 lin. latis, sursum decrescentibus, elongato-lanceolatis longissime acuminalis acutis sigmaideo-falcatis, basi obliquis utrinque acute-cuneatis, margine incrassato parum revoluto utrinque acute et irregulariter serratis, apicem versus profundus duplicato-serratis, summo apice remotissime serratis, pinna terminali lanceolata incisa grosse serrata, pagina anteriori obscure viridi, posteriori pallidiori; costa venisque utrinque prominulis, postice hic illuc sparse squamulosis, venis sub angulo acuto exentibus bifurcatis; soris costæ immediate approximatis linearibus, indusiis elongato-semi-lunatis integris membranaceis castaneis; stipite rhachique paleaceis fuscis deorsum glabris antice canaliculatis, postice convexis.

Denne Mexicos anseeligste Art voxer i Bjergskove imellem Tonaguia og Roayaga i

Dep. Oajaca paa henimod 5000 Fods Höide i en leret fugtig Jordbund, ligeledes i Skoven imellem Totontepcc og Trapiche de la Concepcion (5—6000') og baerer Frugt fra Juni til September.

Af alle hidtil bekjendte Arter er der ingen, som denne staer nærmere end A. Fenlaysonianum Wallich, men adskilles fra samme ved følgende Mærker: Finnerne ere længere, noget S-formig-seglformige, grovere og mere uregelmæssig takkede, i øvre Deel af Finnerne dobbelt-grovtagkede, Frugthobene fjernere, og meget kortere (A. Finlaysoniana har Sori af over en Tommes Længde, Stilk, Lövaxe og Finernes Stilk skjællet.

21. *Asplenium pumilum* Sw. Plum. fil. t. 66. A. Schlechtd. Lin. 5. p. 612. Kze fil. Leibd. l. c. p. 328. A. anthriscifolium Jacq. Coll. 2. t. 2 f. 4. A. minimum Mart. & Gal. l. c. p. 55. t. 15. f. 1. (planta junior!)

Voxer i skyggefulde Skove, paa Steengjærder paa Mexicos Östside imellem 800—4500'. Jeg fandt den ved Colipa, Hac. de Jovo og Mirador. Schiede ved Jalapa, Galeotti ved Zucapan og i Chinantla.

Uden en meget speciel Kundskab til Mexicos Bregneflora, uden at kjende den utrolige Overfladiskhed, hvorved Martens og Galeotti have sammenskrevet deres Memoire sur les Fougères, vilde det have været umuligt i den af dem beskrevne og afbildede A. minimum at gjenkjende A. pumilum Sw. Saaledes forholder det sig imidlertid. Den som ny beskrevne Art er ikke andet end meget unge fructificerende Exemplarer af den gamle swartziske Plante, saaledes som man idelig finder dem sammen med store veludviklede Exemplarer. Min Samling indeholder nogle, som svare paa det nøjagtigste til Galeottis Afbildning, og som ere tagne unmiddelbart sammen med 8—10 Tommer lange Exemplarer.

Det er meget almindeligt at finde unge Bregnner fructificere, og disse have sædvanlig en meget afvigende Form fra den normale vel udviklede Form, men der hører ikke noget meget naturkyndigt Blik til at erkjende Forholdet, især naar man befinder sig paa Stedet, hvor man let kan komme under Veir med Sammenhængen. Det er markeligt at Memoirens Forff. ikke have havt mindste Tanké om A. pumilum, som de slet ikke optage i deres Værk, men sammenligne deres Plante med A. trilobum og trapezoides, hvormed den Intet har at gjøre.

23. *Asplenium monodon* Liebm.:

fronde cæspitosa coriacea lète-virente 10—15 poll. longa, 2 poll. lata, stipite 4—6 pollicari, elongato-lanceolata pinnata sursum sensim attenuata demum confluente acuminata acuta, pinnis oppositis suboppositis rarius alternis 23—28 cujusque lateris subhorizontalibus, pollicem circiter longis, 3 lineas latis (auricula excepta) sessilibus elongato-lanceolatis acutiusculis obtusisive, basi utrinque cuneatis integris, superiori auriculatis, auricula rotun-

data serrulata, margine utrinque serrulatis, costa venisque furcatis parum prominentibus, costa postice ad basin fusco-squamulosa, soris biserialibus numerosis costae approximatis elongatis $1\frac{1}{2}$ linea longis, auriculae 1—2; pinnis superioribus adnatis basi inferiori parum decurrentibus, auricula evanescente, apice obtusis; stipite rhachique fibrilloso-squamulosis demum glabrescentibus fuscis sursum virentibus compressis, deorsum teretibus, antice obsolete canaliculatis.

Rhizoma breve squamis lanceolatis fuscis imbricatis tectum, radiculos numerosos patulos ramosos fusco-villosos emittens.

Den voxer i Baranken paa Hacienda de Jovo ved Arroyo de Isapa paa Stammerne af Cyathea og Alsophila, hvilke den tildels beklæder, og findes i Frugt i Mai.

Af de hidtil beskrevne Arter finder jeg ingen, som passer paa denne, uagtet Bregnene uden Tvivl har en større Udbredning. I det mindste ligger i Schumachers Herbarium et Exemplar af denne Art med Paaskrift A. Serra Schum. fra Puerto rico. Ved at sammenligne Sloane's hist. Jam. 1. t. 38 f. 2., der almindelig citeres til A. auritum, er jeg bleven overbevist om, at denne Afbildung passer ret godt til A. monodon, der adskiller sig fra de foreliggende Beskrivelser af A. auritum, ved Finnernes fintakkede Rand, Middelribbens, Axens og Stilkens affaldende Skjæl, Lövaxens Mangel paa hindeagtig nedløbende Vinge. o. fl. Arten er foranderlig med Hensyn til Finnernes Form, som snart er tilspidset, snart bujt. Den øreformige Udvæxt ved Finnernes øvre Grund er meer eller mindre fremtrædende, stundom næsten forsvindende eller ganske borte; Randens Indskjæring er sædvanlig fintakket, bliver dog undertiden lidt grovere takket.

23. Asplenium auritum Sw. Schk. Farrn. t. 130. b. Schlechtd. Lin. 5. p. 612.
Mart. & Gal. l. c. p. 58. Kze fil. Leibd. l. c. p. 332.

Dr. Schiede fandt den i Skove ved Jalapa; Galeotti paa Træstammer ved Jalapa og Zacuapan; Leibold anfører den fra den tempererte Regions Skove. Jeg har ikke truffet denne Art i Mexico.

Prof. Kunze omtaler en dobbelt-halvfinnet Form, som grændser saa nær til A. mexicanum Mart. & Gal., at de eneste Adskillelsestegn af A. auritum var. bipinnatifidum fra A. mexicanum skulle være den noget tykkere Lövaxe og Finnernes noget spidsere Tænder. Jeg tilstaaer, at disse Oplysninger ikke have tilfredsstillet mig, og jeg inmødeser med Længsel Prof. Kunzes lovede udförligere Fremstilling af A. auritum Sw. og dens mange Former. At den noget større eller mindre Spidshed af Indskjæringer i Finnerne ved en meget foranderlig Art ikke kan gjelde som specifisk Charakteer, ligesaa lidet som Lövaxens ubetydelig større Tykkelse, forekommer mig indlysende. Enten maa vel altsaa A. mexicanum Mart. & Gal. inddrages under A. auritum, eller ogsaa bliver A. auritum var. bipinnatifidum Kze at adskille fra Hovedarten, og forene med A. mexicanum.

24. Asplenium mexicanum Mart. & Gal. l. c. p. 62. t. 15. f. 4. (mediocris!) Kze fil. Leibd. l. c. p. 332.

Først funden af Galeotti ved Jalapa, Mirador og Zazuapan, dels paa Klipper dels paa Ege- og Liquidambar-Stammer; dens Region ansættes imidlertid af ham alt for indskrænket til mellem 3 og 4500. Jeg har fundet den fra 800 Fods Höide paa Østkysten indtil 4500'; meget hyppig i Skovene om Colipa, Misantla, Baranca de Huitamalco, Mirador og Huatusco.

25. Asplenium pyramidatum Liebm.:

fronde coriacea glabra læte-viridi, 8—12 pollices longa, 2—2½ poll. lata, stipite 3—4 pollicari, lanceolata, longe attenuata, pinnata-pinnatisecta, pinnis alternis suboppositive elongato-lanceolatis attenuatis 1½—1 poll. longis, 4—5 lineas latis, patulis pinnatisectis sursum pinnatifidis apice confluentibus, lacinias 3 lin. longis, 1½—1 lin. latis, ovato-spathulatis obtusis alternis remotiusculis serrulatis basi decurrentibus; costa compressa alata, soris 4—5—10 cujusque laciniae; rhachi viridi antice canaliculata marginata, postice sursum compressa; stipite fusco antice canaliculato marginato, postice convexo.

Rhizoma breve squamis ovato-lanceolatis membranaceis fuscis tectum, radiculos longos fusco-villosos emitens.

Voxer paa Træstammer imellem Tanetze og Cacalotepec i Dep. Oajaca imellem 5—6000 Fods Höide i August.

Ved Lövets hederagtige Beskaffenhed, Finnernes noget fjernstaaende budte og spathiforme Flige, disses vingede Axe og Lövets randede Axe adskilles den let fra den foregaaende Art.

26. Asplenium coriifolium Liebm.:

fronde coriacea cæspitosa glabra læte-virente 10—14 poll. longa, 2 poll. lata, stipite 4—6 pollicari, elongato-lanceolata attenuata acuta, deorsum tripinnata, tunc bipinnata, demum pinnato-pinnatifida, pinnis petiolatis alternis patulis lanceolatis 2 poll. longis ½ poll. latis sursum decrescentibus, pinnis secundariis alternis, pionulis petiolatis ovato-cuneatis apice inciso-serratis, serraturis modo acutis modo obtusiusculis, pinnulis sursum integerrimis; stipite rhachique, costis costulisque glabris antice canaliculatis marginatis, postice convexis; soris elongatis magnis confluentibus castaneis. Rhizoma breve obliquum squamis membranaceis fuscis ovatis imbricatis tectum, radiculos numerosos longos rufo-villosos emitens.

Voxer i Sprækker af golde Klippevægge imellem Tepitongo og Totontepec i Dep. Oajaca i en Höide af henimod 5000 Fod, og fructificerer rigelig i Juni.

Den adskilles lettelig fra de to foregaaende ved sin hyppigere Deling, og ved Smaafinnernes Smalhed og Indskjæring.

27. Asplenium achilleæfolium. Cænopteris achilleæfolia Mart. & Gal. l. c. p. 63. t. 16!

Denne Art tilhører den østlige tempererte Region imellem 2500—5000 Fod, men

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

synes at have en meget indskrænket Forekomst i Mexico. Især hyppig er den i de over 1000 Fod dybe Baranker omkring Mirador og Zazuapan, hvor den voxer paa fugtige Fjeldsider, i Klippesprækker paa overskyggede Steder. Her fandtes den af Galeotti og mig. Urigtigt er det, naar Galeotti angiver den som Epiphyt paa Egene ved Zazuapan; den voxer kun paa Klipper. Jeg har ligeledes fundet den i Skovene imellem Chuapan og Teotalingo i Dep. Oajaca (c. 5000').

Forff. have ret tydeligt beskrevet og afbildet Arten. Følgende kan tilføies for at fuldstændiggjøre Beskrivelsen: Frons 1—1½ pedalis; stipes 6—7 pollicaris; pinnae 4 poll. longæ pollicem latæ. Frons lanceolata pinnato-pinnatisecto-pinnatifida, pinnis alternis suboppositis lanceolatis acuminatis brevipediolatis (petiolis abatis) infimis horizontalibus, superioribus arcuatis subdecurrentibus, pinnatisecto-pinnatifidis, laciniis oblongis, basi cuneatis utrinque decurrentibus, sursum confluentibus, lacinulis falcato-lanceolatis acutis. Stipite, rhachi, petiolis postice fibrilloso-squamulosis demum glabrescentibus. Stipite rhachique antice canaliculatis postice convexis.

Anm. Slægten *Cænopteris* beroer paa aldeles uholdbare Charakterer, og lader sig ikke skille fra *Asplenium*.

28. *Asplenium lacerum* Schlechd. Lin. 5. p. 612.

Denne mig ubekjendte Art er hidtil ikkun samlet af Dr. Schiede i skyggefulde Skove ved Jalapa.

29. *Asplenium furcatum* L. Schlechtd. l. c. p. 612. Bent. pl. Hartw. p. 55. Mart. & Gal. l. c. p. 62. Kze fil. Leibd. l. c. p. 333. A. præmorsum Nees ab E. Linnæa v. 19 p. 685?

Meget udbredt i Mexiço baade paa den østlige Heldning af Cordillererne og i det Indre. Regionen for dens Udbredning gaaer fra 3000 til over 7000'. Jeg fandt den ved Mirador parasitisk paa Ege, ved Sta Maria Alpatlahua i Klippekloster (7—7500'), ved Yavlesia (Dep. Oajaca 7000') i Kløfter. Schiede fandt den paa Træstammer ved Jalapa; Galeotti ved Jalapa og Monte Pacho paa Ege og Liquidambar; Hartweg ved Regla.

Det kan vist ikke være synderligt tvivlsomt, at Asp. præmorsum, som (l. c.) anføres af Nees som samlet i Mexico af Aschenborn (Stedet er ikke angivet), hører til A. furcatum L., og ikke er den ægte swartziske Plante.

30. *Asplenium cicutarium* Sw. Schlechd. l. c. p. 612. Mart. & Gal. l. c. p. 63. Kze fil. Leibd. l. c. p. 333.

Udbredt paa Mexicos Østside i den hede og tempererte Region fra 500 til 3000', voxende i tørre Lövskove og i Barankernes Kløfter. Jeg fandt den ved Cabrestros i Dep. Vera Cruz ikke langt fra Nautla Floden; i Skove omkring Papantla og Mirador. Schiede

fandt den ved Papantla; Galeotti ved Mirador. Naar baade Leibold og Galeotti erklære Planten for sjeldent i Mexico, da gjelder dette kun i Regionen henimod 3000', hvorfra de allene synes at kjende den, hvorimod den hører til de meget almindelige Former i de hede Kystskove.

31. *Asplenium rhizophyllum* Kze. fil. Poepp. l. c. p. 71. *Cænopteris rhizophylla* Smith. ic. ined. t. 50. *Darea* W. Hook. & Grev. ic. fil. t. 193.

Voxer paa skyggefulde Steder ved Lobani i Districtet Chinantla Dep. Oajaca i den varm-tempererte Region.

Formodenlig hører den hos Martens og Galeotti anførte *Cænopteris myriophylla* l. c. p. 63. (Coll. H Gal. no. 6250.) herhen, og findes da i Llano verde og Carizal Dep. Oajaca (7000—75000') efter Galeotti.

32. *Asplenium amabile* Liebm.:

fronde herbacea glabra late-virente bipedali et insuper, stipite 4—5 pollicari, parte superiore rhacheos denudatae deflexa radicante c. pedali, lanceolata tripinnata, pinnis primariis 4 poll. longis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ poll. latis lanceolatis subsessilibus, infimis divaricatis oppositis, mediis horizontalibus, superioribus decrecentibus patulis; pinnis secundariis alternis patulis, subsimilibus 4—5 lineas longis 2 lin. latis brevipetiolatis, pinnulis brevipetiolatis, infimis obovato-cuneatis apice tri-bi-dentatis, dentibus acutis, ceteris cuneato-falcatis integrermis acutis; soris cujusque pinnulae solitariis; rhachibus partialibus compressis subulatis viridibus, universali castanea nitida antice canaliculata marginata, postice convexa, apice radicante radiculis numerosis longissimis instructa.

Differt ab *A. flabellulato* Kze fil. Poepp. p. 71: fronde tripinnata, pinnularum forma; ab *A. rhachirizo* Raddi: pinnis tripinnatis horizontalibus divaricatisve, pinnularum forma; ab *A. myriophyllum* Presl: pinnulus infimus obovato-cuneatis 3—2 dentatis, ceteris cuneato-falcatis acutis.

Denne særdeles sirlige Bregne fandt jeg paa Mexicos vestlige Cordillerer i Dep. Oajacas District Pochutla imellem La Galera og Byen Pochutla paa henimod 1000 Fods Höide i 14 Leguas Afstand fra Sydhavet. Den voxer paa fugtig Kalkgrund overskygget af tætte Bambuser, lave Vistepalmer (*Trithinax*), Scitamineer o. dl.

Tvivlsomme Arter.

***Asplenium laserpitiifolium* Lam.** Presl Rel. Hænk. 1. p. 48.

Anføres som samlet af Hænke i Mexico, men dette er vist ureigtigt, da Planten hører hjemme paa Manilla og Ny-England, og formodenlig ved Forveyxling af Etiquetten er blevet antaget for mexicansk.

Asplenium nanum (Willd.?) Mart. & Gal. l. c. p. 59.

Klipper ved Puente nacional, Galeotti.

Hvad dette skal være, kan jeg naturligvis ikke have nogen sikker Mening om. A. nanum Willd. er udeladt af Presl i hans Pteridographi; Willdenow citerer Plum. fil. t. 66. B., en Afbildning som er saa slet, at det ikke er muligt at gjøre sig nogen Forestilling om Planten derefter. Martens og Galeotti erklære deres Plante nærstaaende til A. pulchellum Raddi, men derefter synes det klart, at Forff. maa have havt en Plante for sig, som ikke har svaret til den Willdenowske Beskrivelse af A. nanum. Hvis jeg tor vove en Gisning, da er Forff's saakaldte A. nanum == min A. miradorense, forsaavidt Noget lader sig udlede af det Par Ord, der meddeles om Planten.

Asplenium rhizophorum? (L.) Mart. & Gal. l. c. p. 60.

Klipper ved Yavesia, Galeotti. Enhver Oplysning om denne Plante skulde jeg ansee for meget ønskelig.

* * Hemidictyum: venis reticulatis anastomosantibus.

33. Asplenium marginatum L. Plum. fil. t. 106. Hemidicyum margin. Presl. Pterigr. t. 3 f. 24.

Denne fra Mexico hidtil ikke bekjendte Art voxer i de varm-tempererte Skove af Myrter, Terebinthaceer, Laurineer imellem Jocotepec og S. Pedro Tepinapa i Chinantla (Dep. Oajaca 3—3500').

Mine Exemplarer stemme fuldkommen med vestindiske Exemplarer.

Diplazium Sw.**1. Diplazium plantagineum Sw.** Syn. p. 91. t. 2. f. 4. Schk. Crypt. t. 85. D. acuminatum Raddi fil. Bras. t. 57. f. 2!

Denne i Mexico ei tidligere fundne Art, voxer i de skyggefulde Skove i den østlige varm-tempererte Region imellem 2—3000 Fod. Fugtig muldblandet Leer er dens rette Jordbund. Jeg fandt den i stor Mængde paa Hac. de Mirador paa Skraaninger ved Skovbække; ligeledes paa Hac. de Jovo ved Arroyo de Isapa.

Den mexicanske Form er aldeles overeenstemmede med den brasilianske, som Raddi beskrev som ny Art, A. acuminatum; men da Arten i det hele taget er foranderlig kan den udtrukne Spidse af Lövet ligesaalidet betegne en egen Art, som Randens rundbugtede eller skarptandede Beskaffenhed.

2. Diplazium ternatum Liebm.:

fronde coriacea glabra*ternata 5—10 poll. longa, $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ poll. lata, stipite 2—7 pollicari,

pinna media lateralibus longiore 3—5 poll. longa, 1— $\frac{1}{3}$ poll. lata elliptica utrinque attenuata apice longe acuminata petiolata, petiole 4—6 lin. longo, margine imprimis apicem versus remote et grosse dentata; pinnis lateralibus oppositis inaequalibus, 1—4 poll. longis, $\frac{2}{3}$ — $\frac{1}{3}$ poll. latis, falcato-ellipticis brevipetiolatis acuminatis grosse dentatis; pagina anteriori obscure-viridi, posteriori glauco-viridi; costa media antice canaliculata, postice convexa, venis utrinque prominulis nigris plures furcatis, hic illuc in areolam ellipticam anastomosantibus; soris 3—4 lineas longis simplicibus vel bilateralibus, indusis integris membranaceis fuscis; stipite antice et lateribus sulcato, postice convexo. Rhizoma subterraneum obliquum breve pennam anserinam crassum radiculis simplicibus validis intricatis et fragmentis stipitum emortuorum tectum.

Voxer i skyggetulde Bjergskove paa Leer imellem Tonaguia og Roayaga Dep. Oajaca District Villa alta i en Høide af 4—5000'; bærer Frugt i August.

Af alle hidtil bekjendte Arter vidste jeg ingen, hvormed D. ternatum kunde sammenlignes eller forvexles. Den varierer især med Hensyn til de to Sidefinner, og Randens Jndskjæring, idet denne snart er enkelt, snart dobbelt tandet.

3. **Diplazium? falcatum Liebm.:**

fronde coriacea glabra supra olivaceo-viridi nitida, subtus glauco-viridi opaca subpedali 3½ poll. lata, stipite 4—5 pollicari, lanceata longeacuminata, deorsum pinnato-pinnatifida, sursum pinnatifida, pinnarum paribus 3 suboppositis subhorizontalibus sessilibus adnatis falcato-lanceolatis acuminatis 1½—2 poll. longis, 8 lineas latis, pinnatifidis, laciniis lato-lanceolatis truncato-falcatis acutatis margine parum revoluta repandulis vel denticulatis, apice confluentibus falcato-crenatis; parte superiore frondis pinnatifida, laciniis falcato-lanceolatis alternis 1½ poll. longis, 6—7 lin. latis, adpresso crenatis, sinibus acutis; costa utrinque prominula straminea, venis flavidis pinnatis; stipite rhachique tetragonis sulcatis, hic illuc squama membranacea lanceolata decidua instructis.

Voxer paa Leevoldse omkring den afbrændte Kirke i Chinantek-Landsbyen Teotal-ingo i Dep. Oajaca (4000').

Mine Exemplarer ere destoværre ikke frugtbærende, hvorfor Slægten kan synes noget tvivlsom, skjönt Lövets hele Habitus, og Nervationen tyder paa en Diplazium.

4. **Diplazium striatum Presl.** Kze fil. Leibd l. c. p. 334. Asplenium striatum L. Willd. sp. v. 5. p. 338. Plum. t. 19. Diplaz. acuminatum (Lodd.?) Mart. & Gal. l. c. p. 51 (sec. Kunze.)

Efter Kunze er et Par Exemplarer af denne Art samlet af Leibold i Mexicos østlige tempererte Region. Galeotti fandt den i fuglige Skove ved Jalapa og Mirador (3—4000').

Prof. Kunze har paa det angivne Sted oplyst, hvorledes det forholder sig med den

saakaldte *D. acuminatum* Loddig, hos Martens og Galeotti, idet en saadan Art nemlig slet ikke findes indført i Videnskaben ved en Beskrivelse, saa at Forfl. formodentlig blot have havt et eller andet fælsk bestemt Have-Exemplar for sig, da de henførte deres mexicanske Plante til samme, uden at undersøge om denne Benævnelse havde nogen Betydning, uden at vide, at der allerede i Videnskaben existerede to Arter af dette Navn, nemlig *D. acuminatum* Raddi = *D. plantagineum* Sw., og *D. acuminatum* Presl (*Asplenium acuminatum* Wallich.)

5. *Diplazium crenulatum* Liebm.:

fronde herbacea 2½—3 pedali et insuper, pedem lata, stipite pedali et insuper, lanceolata acuminata, pinnato-pinnatifida, apicem versus pinnatifida, pinnis alternis patulis petiolatis (petiolis 6—2 lineas longis), 6—7 poll. longis, 1½—2 poll. latis, sursum decrescentibus, lanceolatis acuminatis pinnatifidis, laciiniis alternis lanceolatis subfalcatis ¾—½ poll. longis, 4 lin. latis, obtusis marginibus lateralibus subrevolutis obsolete crenulatis, apice inaequaliter crenulata, sinibus angustis acutis; costa antice prominula canaliculata, postice appланата, utrinque rufo-lepidota, costulis utrinque prominulis antice canaliculatis, postice pilosulis, venis simplicibus bifurcisve incurvis; lamina laciniarum antice obscure viridi glabra, postice pallidiori pilis minutissimis scabriuscula; soris linearibus rectis 2 lin. longis plerumque unilateralibus infimis bilateralibus; stipite rhachique subquadrangulis antice canaliculatis, lateribus appланatis, dorso convexiusculis, rufo-lepidotis.

Rhizoma crassum carnosum verticale squamis brunneis tectum.

Hører til Mexicos sirligste Bregneformer, som forekommer hist og her i de hede og tempererte østlige Skove fra 800—3000'. Jeg fandt den imellem Colipa og Misantla, paa Hacienda de Jovo i Baranken ved Arroyo de Isapa, i Skove og Baranker omkring Mirador.

Arten staarer nærmest til *D. striatum*, men adskilles derfra ved den finhaarige Underside af Lövet, ved Stilkens, Axens, Middelribbens brune haarsfine Skjælbeklædning, medens *D. striatum* er fuldkommen glat. Forresten turde det vel være muligt, at den som *D. striatum* opførte mexicanske Bregne i Virkeligheden henføres til denne Art.

6. *Diplazium lonchophyllum* Kze. Addit. l. c. p. 141. Kze fil. Leibd. l. c. p. 333.

Asplenium denticulosum Desv.? Mart. & Gal. l. c. p. 61? (sec. Kze).

Schiede fandt den i Skove ved Jalapa; Galeotti i fugtige Skove omkring Mirador.

Tivilsomt er det, om Galeottis Plante virkelig hører til *D. lonchophyllum*, eller om den ikke snarere hører til den efterfølgende Art, hvilket sidste den angivne Localitet lader mig formode. Prof. Kunze gjør meget rigtig opmærksom paa det mislige i at henvøre mange af Desvaux's Arter til visse for Tiden kjendte Former, da denne Forfl's Diagnoser i Almindelighed ere saa korte og ufuldstændgende, at flere Tydninger kunne synes

lige berettigede. Naar imidlertid Asplen. denticulosum Desv. henføres af Kunze til D. lonchophyllum, troer jeg ikke at dette er rigtigt, især da Kunze udtrykkelig bemærker, at Udtrykkene i den Desvaux'ske Diagnose: pinnæ 4—6 pollicares, laciniae dentato-serratae, stipes glaber, slet ikke passe paa D. lonchophyllum. Disse Udtryk passer derimod ganske vel til min efterfølgende Art.

7. *Diplazium inaequilaterum* Liebm.: *Asplenium denticulosum* Desv. Berl. Mag. V. (1811.) p. 323.

Frondæ cæspitosa subcoriacea glabra antice obscure viridi, postice pallidiori, 2—2½ ped. longa, 12—10 poll. lata, stipite subpedali, lanceolata, pinnato-pinnatifida, sursum simplici confluente, pinnis alternis, infimis divaricatis, insequentibus subhorizontalibus, sursum patulis, petiolatis (petiolo 2—3 lin. longo), superioribus sessilibus, elongato-lanceolatis inaequilateris, latere superiore inferius superante, longe acuminatis acutis, 6—7 poll. longis, 4—4½ poll. latis, basi oblique cuneatis, pinnatifidis (pinnis infimis basi superiori pinnula brevipediolata oblique ovata obtusa serrulata instructis); laciiniis falcato-lanceolatis obtusiusculis interdum acutiusculis, ½ poll. longis, 3 lin. latis, margine parum reflexo repandis vel plus minus serrulatis; pinnis superioribus sessilibus adnatis basi inferiori parum decurrentibus antice crenato-serrulatis, summis confluentibus; costa costulisque flexuosis antice leviter canaliculatis postice convexis, venis simplicibus furcatisve, soris curvatiss 2—3 lin. longis infimis bilateralibus, ceteris unilateralibus, indusiis membranaceis flaccidis integerrimis; stipite rhachique stramineis antice canaliculatis, postice convexis, stipite basin versus squamis lanceolatis castaneis enerviis adperso.

Rhizoma obliquum breve subterraneum squamosum radiculos intricatos villosos ramosos nigrantes emittens.

Voxer i fugtige skyggefulde Skove i den østlige Skovregion imellem 2—3000 Fod. Jeg fandt den i stor Mængde i Baranken paa Hacienda de Jovo, og i Skove omkring Sta Maria Tlapacoyo, ligesom senere i Skove og Baranker omkring Mirador.

Den er uden tvivl nær beslægtet med D. lonchophyllum Kze, som kun er mig bekjendt af Beskrivelsen, men den afviger derfra i følgende Punkter, som forekomme mig tilstrækkelige til at bevise Arts-Forskjelligheden:

D. lonchophyllum: *rhizoma horizontale*; *stipite* squamis ovatis nervosis magnis obsito; *pinnis* maximis 4 poll. longis, 7—8 lin. latis, subsessilibus; *laciiniis* oblongis acutiusculis margine serratis, infima superiori elongata; *venis* simplicibus.

D. inaequilaterum: *rhizoma obliquum* vel subverticale; *stipites* squamis lanceolatis acutis ener- viis obsito; *pinnis* 6—7 poll. longis, 4—4½ poll. latis, petiolatis; *laciiniis* lanceolatis obtusiusculis repandis apicem versus' serrulatis, infima superiori petiolulata ovata obtuse vel elongato-ovata; *venis* furcatis simplicibusve.

8. *Diplazium Franconis Liebm.*:*

fronde subcoriacæa glabra antice atrovirente, postice glauco-viridi, bipedali, 10–12 poll. lata, stipite 10–12 pollicari, lato-lanceolata acuminata bipinnato-pinnatifida, sursum pinnato-pinnatifida, apice confluente; pinnis alternis patulis 6–7 poll. longis, 2 poll. latis, petiolatis lanceolatis longe acuminatis acutis; pinnulis alternis patulis $1\frac{1}{2}$ poll. longis, 4 lin. latis, inæquilateris lanceolatis subfalcatis, infimis petiolatis, basi oblique cuncatis, sursum sessilibus basi inferiori decurrentibus, insequentibus adnatis apicem versus sensim confluentibus, apice plus minus acutatis, pinnatifidis, sursum solummodo duplicato-crenatis, laciniis falcato-lanceolatis obtusis vel truncato-obtusis serratis, lacinia infima lateris superioris reliquas superante, sinibus acutis ad medium pinnulam vix incisis; costa rhachique partiali marginatis, rhachi universalis stipiteque antice canaliculatis, postice convexis, venis pinnatis, venulis simplicibus furcatis; soris curvatis densis infimis bilateribus, ceteris unilateralibus; stipite basin versus squamis fuscis lanceolatis membranaceis sparsis tecto. Rhizoma subteraneum breve subverticale cæpositum.

Findes i fugtige skyggefulde Bjergskove paa sandig leerblandet Jordbund imellem Tonaguia og Roayaga (District Villa alta, Dep. Oajaca) i omrent 4–5000 Fods Höide.

Ved sit dobbeltfinnet-halvfinnede Löv, længere og bredere Finner odl. adskilles den let fra de to foregaaende.

9. *Diplazium amplum Liebm.:*

fronde coriacea nitida glabra, 3–4 pedali, stipite 12–16 pollicari, lato-lanceolata, bipinnato-pinnatifida, pinnis remotis alternis patulis leviter falcatis, petiolatis lanceolatis pedalibus et insuper, 3 poll. latis, sursum decrescentibus, pinnulis alternis brevipetiolatis sursum sessilibus demum confluentibus, divergentibus lanceolatis breviacuminatis 2 poll. longis, 8 lin. latis, basi obtusissime cuneatis vel utrinque recte-truncatis pinnatifidis, laciniis lato-lanceolatis truncato-falcatis acutiusculis vel obtusiusculis, margine parum revolutis, obsolete repandis; sinibus acutis ad medium pinnulae incisis; costa antice canaliculatis, postice convexis, venis pinnatis antice immersis postice prominulis, venulis simplicibus furcatisve; soris 1– $1\frac{1}{2}$ lin.longis

* Planten er benævnt efter min Ven, Don Francisco Franco, for Tiden Prefect i Districtet Villa alta, under mit Ophold i Mexico Ejer af Trapiche de la Concepcion, en Sukkerplantage med tilhørende Brændevis-Bränderi i Nærheden af Comaltepec, i hvis Huus den Reisende i flere Maaneder fandt det gjesteværligste Ophold. De betydelige Samlinger, det lykkedes mig at tilveiebringe ikke blot fra den umiddelbare Omegn af Trapiche de la Concepcion, men ligedeles fra fjernere liggende Egne, skyldes ikke mindre Don Francisco's kyndige Raad og forskjelligartede Undersøttelse, end hans imødekommede Gjestefrihed. Det er kun Naturforskere, som have færdes i meget fjerne og lidet besøgte Verdensdele, som forstaaer at vurdere Betydningen af den Slags Tjenester, som gjøre det muligt at tilveiebringe et betydeligt Materiale for Videnskaben, hvilket ellers ikke vilde have været at opnaae.

fuscis, indusiis tenuibus membranaceis involutis fuscis; stipite rhachique universalis partialiter busque stramineis antice canaliculatis puberulis, postice convexis glabris.

Rhizoma subterraneum breve carnosum radiculis validis instructum.

Voxer paa Leerbakker i den fugtige skyggefulde Skov ved Aguas santas i Nærheden af Mirador, og samledes i Januar.

Den nærmeststaaende Art synes *D. umbrosum* Willd. at være, hvilken dog adskiller sig i mange Henseender.

Tvivlsom.

Diplazium villosum Presl *Asplenium? villosum* Presl Rel. Hæk. 1. p. 46.
Angives som samlet i Mexico, men uden nærmere Stedangivelse, af Th. Hænke.

Cheilanthes Sw.

1. **Cheilanthes pulveracea Presl** Rel. Hæk. 1. p. 64. (excl. syn). Kze fil. Leibd. l. c. p. 338 (excl. syn. *C. candidae* Mart. & Gal.). *Allosorus pulveraceus* Presl Pteridogr. p. 153.

Voxer i Klippesprækker i den tempererte og kolde Region fra 3000 til 7—8000'; den er i Tiltagende i Höiden. Först fandtes den i Mexico af Hænke, men Stedet angives ikke; af Leibold nævnes den fra den tempererte Regions Mure og Klipper; jeg fandt den imellem Tonaguia og Roayaga (District Villa alta, Dep. Oajaca) fra 5—6000' Höide; ligeledes i Omegnen af Chinautla i Dep. Puebla 7—8000'.

Anm. Kunzes Bemærkninger Linnæa v. 18 p. 338 blive at sammenholde med mine Bemærkninger til Notochlæna pulveracea p. 215.

2. **Cheilanthes squamosa Gill.** Hook. & Grev. ic. fil. t. 151.

var.? brachypus Kze fil. Leibd. l. c. p. 310.

Angives som samlet al Leibold i Mexicos tropiske Region paa Bjerger; mig ubekjendt.

3. **Cheilanthes canescens Kze** Addit. l. c. p. 143. Kze. Farrnkr. p. 71 t. 35. (Optimal).

Funden af Dr. Schiede ved Polverillos i Nærheden af Mexico; af C. Ehrenberg ved S. Pedro y Pablo.

4. **Cheilanthes speciosissima A. Br.** mss. Kze Addit. l. c. p. 145. Kze Anal. pteridogr. p. 35. t. 23! (Optimal). Hook. in Benth. pl. Hartw. p. 54.

Denne udmærkede Bregne tilhører de höie Cordillere-Regioner, hvor den voxer paa Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

Barankernes bratte Vægge eller i Klippesprækker. Jeg fandt den paa Vulkanen Orizaba i Baranker omkring Vaqueria del Jacal paa 10,000'. Karwinski sendte den først fra Mexico, men uden Angivelse af Voxested. Hartweg fandt den ved Rancho del Guajolote ved Real del monte.

var. elata: fronde $2\frac{1}{2}$ pedali, 7 poll. lata, pinnis $3\frac{1}{2}$ poll. longis, pollicem latis.

Denne større Form fandt jeg paa Cerro de Sempoaltepec paa 9000 Fods Höide i Skoven.

Hovedarten, saaledes som jeg i Mængde har fundet den paa Orizaba, er ikkun lidet over en Fod lang, 5 T. bred, Finnerne 2 T. lange, $\frac{1}{2}$ T. brede. Varieteten adskiller sig, foruden ved Størrelsen, desuden ved Mangelen af de store Skjæl paa Stilkens og Lövaxens Bagside, men har kun smalle krusede 4—5 Linier lange Skjæl; Finnerne ere horizontale, oventil endog oprette, medens de paa Hovedarten ere seglformig tilbageböiede. Alle övrige Charakterer stemme fuldkommen overens, saa der ingen Grund er til at adskille den som egen Art.

5. *Cheilanthes glandulifera* Liebm.:

fronde coriaccea olivacea pilis brevibus septatis glanduliferis undique obsita, pedali, 2 poll. lata, stipite 8—9 pollicari, ovato-triangulari, basi tripinnata, sursum bipinnata, pinnato-pinnatifida, apice confluente; pinnis primariis infimis suboppositis, ceteris alternis, $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longis petiolatis lanceolatis patulis; pinnis secundariis alternis patulis lanceolatis, 6—4 lin. longis, obtusis, basi pinnatis apice versus pinnatifidis demum confluentibus; pinnulus subsessilibus obovatis convexis repandis margine revolutis; laciiniis semiobovatis obtusis; costa obsoleta, venis antice impressis furcatis; indusiis spurii ex margine reflexo membranaceo demum lacero ortis; stipite tereti pennam passerinam crasso amarantino nitido, villo cano glandulifero obsito, basi squamis rigidis castaneis subulatis instructo; rhachi universali partialibusque teretibus antice canaliculatis marginibus membranaceis involutis.

Voxer i Steendiger og Klippesprækker imellem Talea og Hacienda de Sta Gertrudes i Dep. Oajaca (4—5000'), samlet i August.

Den hører til Afdelingen B i Presl's Tent. Pteridogr.: fronde ovato-triangulari, og staaer saaledes nærmest sammen med Ch. tenuis Presl og Ch. Kaulfussii Kze (Ch. viscosa Link.). Med denne sidste synes den at have meest Overenstemmelse, saavært man kan skjönne efter den altfor korte Beskrivelse i Link. fil. h. Ber. p. 66, eller Link. hort. Ber. 2. p. 43, dog adskilles den ved følgende:

Ch. Kaulfussii har pinnulae glabriuscule, stipes et rhachis badia.

Ch. glandulifera har pinnulae utrinque pilosulæ, stipes et rhachis amarantina.

Link angiver Dimensionerne for Ch. Kaulf: stipes 12", lamina 5', pinnæ primariæ 2", p. secundariæ 4", p. tertiarie 3—4".

Ch. glandulifera: stipes 8—9", lamina 3", pin. prim. $1\frac{1}{2}$ —2", p. secund. 4—6", p. tertiar. $1 - 1\frac{1}{2}$ ".

- 6. Cheilanthes scariosa Kaulf.** en. p. 216. Kze fil. Poepp. l. c. p. 85. Kze Addit. l. c. p. 144. Presl. Rel. Hæk. I. p. 65. Mart. & Gal. l. c. p. 74. Aerost. Willd. Bemerk. üb. selt. Farrnkr. (in Act. acad. Erford.) t. 3. f. 4.

Sendt fra Mexico uden Angivelse af Stedet af Karwinski; Galeotti anfører den fra Vulkanen Orizaba, hvor den voxer i Trachyklippernes Sprækker ved Cueva de Temascal paa 11—12000 Fods Höide.

- 7. Cheilanthes lentigera Sw.** Presl. Rel. Hæk. I. p. 65. Kze Addit. l. c. p. 79. Mart. & Gal. l. c. p. 79. Kze fil. Leibd. l. c. p. 342. Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 684. Pteris lentigera Cav. præl. p. 268 no. 664. Cheil. minor Mart. & Gal. l. c. p. 75. t. 21. f. 1. Cheil. lanuginosa Mart. & Gal. l. c. p. 75. t. 20. f. 2.

En i Mexico særdeles udbredt Art især i de höiere Cordillere-Regioner; den voxer selskabelig i Klippesprækker. Luis Née fandt den først ved Ixmiquilpan; Hække ved Mexico; Schiede i Malpays de la Hoya; Galeotti paa Gneis og chrystallinsk Kalk i Misteca alta ved Peñoles 6500—8000'; ligeledes i Baranca de Rio grande de Lerma (4000'), og paa Klipper ved Capulalpan (Dep. Oajaca, 6500—7500'); ved Moran og Real del monte (7800—8500'); Leibold anfører: regio suptropica for denne Art, men dette er enaabnen Urigtighed. Selv fandt jeg den fra 5000 indtil 10,000', tiltagende i Hyppighed og Störrelse med Höiden: ved Hacienda de Sta Anna i Dep. Oajaca (5—6000'); ved Chinautla Dep. Puebla 7—8000'; paa Pico de Orizaba i Barankerne omkring Vaqueria del Jacal, 10,000'. Aschenborn sendte den fra Chapultepec ved Mexico. Den er meget foranderlig i Störrelse, Sammensætning (snart dobbelt- snart tredobbeltsfinnet), Finnernes Störrelse, Form (kreds-runde, kileformige, helrandede, rundbugtede, flade, lindseformige o. dl.), Haarighed og m.

Denne Foranderlighed har foranlediget et Par Arters Opstilling, som efter min Mening ere aldeles ubegrundede. Saaledes Cheil. minor Mart. & Gal., en meget almindelig mindre Form, saaledes som den fremtræder paa meget tørre Klipper, og i Artens lavere Region, men for hvilken Forff. ikke have angivet en eneste Charakteer af Betydning. Ligesaas lidet kan Cheil. lanuginosa Mart. & Gal. adskilles som Art, thi om Lövet er dobbelt eller tredobbeltsfinnet gjør her Intet til Sagen, ligesaas lidet som den større eller ringere Haarighed. Kunze bemærker rigtignok, at A. lanuginosa Mart. & Gal. er en udmarket ham bekjendt Art, men da han ligesaas lidt som Forff. angiver Nogetsomhelst af Vigtighed, hvorved den skal adskille sig fra Ch. lentigera, kan jeg ikke tage Hensyn til denne Paastand.

8. Cheilanthes paleacea Mart. & Gal. l. c. p. 76. t. 21. f. 2.

En characteristisk Bregneform for de tørre Bjergregioner i Mexicos Indre, udbredt fra 5000 til 11000 Fod, og voxende i Klippekløfter. Galeotti anfører den ikun fra

Basaltklipper paa Cuesta blanca ved Mextitan, imellem Mexico og Tampico. Jeg fandt den paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7—7800'), paa Cumbre de Ixtepec (Sierra de Oajaca) paa 10,000—11,000 Fods Höide, endelig ved Hacienda de Sta Ana (5—6000').

Dette er en høist udmærket Art, hvilken imidlertid af Forff. som sædvanlig er aldeles utilstrækkeligen beskreven. En udførlig Beskrivelse følger derfor her:

Frons coriacea 6—9 poll. longa, $1\frac{1}{2}$ poll. lata, stipite 3—5 pollicari, lanceolata, tripinnata, pinnis primariis alternis patulis lanceolatis pollicem longis, 4—6 lin. latis, pinnis secundariis alternis divergentibus vel divaricatis 3 lin. longis, 2 lin. latis, tertiaris ternatis vel pinnatis, pinnulis minutissimis suborbicularibus sessilibus lentiformibus supra dilute viridibus pilis longis crispatis detergibiliibus obsitis; rhachibus partialibus postice squamis majusculis imbricatis lanceolatis acutis centro fuscis membranaceis dilute rufescens marigne crispatis tectis; stipite rhachique universali teretibus flexuosis adpresso cano-squamosis, squamis subulatis. Rhizoma subterraneum cæspitosum bulbiforme squamis castaneis rigidis imbricatis subulatis obsitum, radiculos numerosos longos ramosos nigricantes emittens.

Planta valde hygroscopica circinato-convoluta.

Tvivlsomme.

Cheilanthes tenuis Presl. Rel. Hænk. 1. p. 65.

Mexico (uden Stedangivelse).

Cheilanthes tomentosa Link. h. Ber. 2. p. 42. Kze Addit. I. c. p. 144.

Af Link anføres vel Mexico som Fædreland, men det synes kun at være efter Gisning. Ingen af de Botanikere, som have bereist Mexico, har fundet denne Art der.

Cheilanthes (Otonoloma) hirsuta Link. h. Ber. 2. p. 40. Kze Addit. I. c. p. 144.

Efter den berliner bot. Gartner Ottos Angivelse skal Mexico være Artens Fædreland, men det eraabentbart kun Formodning. I Links fil. h. Ber. p. 63 anføres heller ikke Planten længer som mexicansk, men Födelandet staaer som ukjendt.

Cheilanthes Kaulfussii Kze Addit. I. c. p. 145. Ch. viscosa Kaulf. Link. h. Ber. 2. p. 43. Link. fil. h. Ber. p. 66.

Med denne forholder det sig, som med foregaaende, at det kun er efter Formodning, at den angives som mexicansk.

Link nævner fremdeles i Hort. Ber. 2 p. 37. Cheilanthes tenuifolia Sw. som mexicansk, men dette rettes som urigtig i fil. h. Ber. p. 64.

Hypolepis Bernh.

1. Hypolepis mexicana Liebm.:

fronde coriacea olivacea ampla, $3\frac{1}{2}$ —4 pedes alta, $1\frac{1}{2}$ ped. lata, stipite subpedali, lato-

ovala, tripinnato-pinnatifida, sursum bipinnato-pinnatifida, pinnato-pinnatifida, demum confluente; pinnis primariis pedalibus et insuper, 5—6 poll. latis, sursum decrementibus, alternis patulis distantibus petiolatis lanceolatis; pinnis secundariis alternis patulis lanceolatis acuminatis brevipetiolatis, 2—3 poll. longis, 8—12 lin. latis; pinnis tertiaris (pinnulis) sessilibus alternis 8—4 lin. longis, 3—2 lin. latis, elongato-ovatis, obtusis, pinnatifidis; laciiniis semiovalis rotundatis, 4—6 cujusque lateris, margine revolutis obtuse-crenatis, sinubus acutis ad $\frac{3}{4}$ partes pinnulae incisis; costis antice leviter canaliculatis, postice prominulis convexis hic illic squamulis piliformibus notatis, venis pinnatis, venulis simplicibus furcatisve; soris convexis cinnamomeis in inferiore latere sinuum, 8—6—4 cujusque pinnulae, indusiis spuriis marginariis semilunatis scariosis; rhachi universali partialibusque, stipite stramineis, antice canaliculatis, sulco squamulis piliformibus fuscis obsito, postice convexis nitidis glabris.

Rhizoma subterraneum obliquum squamosum, frondes 5—6 emittens.

Denne anseelige Bregne, ny Art af en Slægt, som hidtil ikke var bekjendt Nord for Panamá, voxer paa kratbegroede Bjergheldninger imellem Sølvværket Hacienda de Sta Gertrudes ved Talea og Mina de Dolores (Dep. Oajaca, 4—5000'); rigelig fructificerende i August. Den spiller omrent samme Rolle som *Pteris aquilina* paa vore Hedebakker.

Af Slægten *Hypolepis* Bernh. er hidtil kun et indskrænket Antal Arter bekjendte, og navnlig ere meget faa fundne i America. Desto glædeligere var det mig i ovenbeskrevne Art at kunne tilføre Videnskaben en Forøgelse af en ny Art fra 16° N. B., paa hvilken den bernhardiske Slægtscharakter finder fuldstændig Anvendelse. Jeg maa kun i Anledning af nærværende Art gjentage en Bemærkning, som Kunze har gjort ved andre Arter, at Frugthobene staae paa den uforandrede Substant af Lövels Lapper, og ikke, saaledes som baade Bernhardi og Presl ville, paa Bagsiden af det falske Slør.

Dicksonia L'Herit.

1. ***Dicksonia cicutaria* Sw.** Sloane Jam. 4. t. 57. f. 1. 2. Hook. sp. fil. 4. p. 76.

Denne Art findes paa Mexicos østlige Side imellem 2—4000' i fugtige skygefulde Skove og Baranker. Jeg fandt den paa Hacienda de Jovo i den store Klippekloft ved Arroyo de Isapa; ligeledes i en Kloft ved Mirador. Efter Hooker er den funden af Linden ved Jalapa.

2. ***Dicksonia dissecta* Sw.** Schk.: Crypt. t. 130. b. Mart. & Gal. I. c. p. 77. Kze fil. Leibd. I. c. p. 342. Hook. sp. fil. 4. p. 77.

Jeg fandt denne Art paa Bjergsider af Cerro de S. Felipe ved Oajaca imellem

6—7000 Fods Höide, voxende ved snaa Vandløb imellem Krat. Galeotti anfører den fra Klipper ved Zazuapan (2500—3000'), og fra Rio Antigua.

- 3. *Dicksonia distenta* Kze.** Addit. l. c. p. 145. Ej. Anal. pteridogr. p. 39. Hooker sp. fil. 4. p. 78.

Schiede samlede den først i Skove ved Jalapa; senere fandt jeg den, men sparsom i tætte Skove ved Mirador.

Mine Exemplarer stemme i det Hele godt med Kunzes Beskrivelse, kun finder jeg den Afvigelse, at imedens Kunze siger om sin Plante: fronde utrinque ad venas hirtula, har min Plante ikkun Undersiden af Lövet stiinhaaret langs Nerverne. Den er meget kjendelig ved sine store brede Frugthøbe.

- 4. *Dicksonia rubiginosa* Kaulf.** enum. p. 226. Kze fil. Leibd. l. c. p. 342. Link fil. h. Berl. p. 40. Hook. sp. fil. 4. p. 79. t. 27 A.

I den østlige tempererte Regions Skovene er denne Art ikke sjeldent. Jeg fandt den i Barankerne omkring Mirador paa skovdækte fugtige Klippevægge; efter Hooker er den samlet af Linden i Dep. Vera Cruz og Chiapas.

5. *Dicksonia umbrosa* Liebm.:

fronde lato-lanceolata 3 pedali, bipinnato-pinnatisecta, pinnis primariis alternis patulis lanceolatis, pinnis secundariis 2 poll. longis 5—6 lineas latis brevipetiolatis (petiolis vix linearibus), lanceolatis acuminatis acutissimis divergentibus pinnatisectis, lacinii alternis 3 lin. longis $1\frac{1}{2}$ lin. latis elongato-ovatis obtusis basi inferiori decurrentibus, pinnatifido-lacinulatis, lacinulatis 3—4 cujusque lateris, falcato-lanceolatis acutis obsolete denticulatis, sinibus minutis sorophoris, soris minutissimis; venis furcatis, utraque pagina imprimis ad venas rufo-pilosula, colore antice atrovirente postice glauco-viridi; stipite rhachi universalis partialibusque stramineis, antice canaliculatis postice convexis, utrinque rufo-hispidis.

Voxer i tætte Urskove imellem Colipa og Misantla, hvor frugtbærende Exemplarer samledes i Marts, og hører saaledes til den østlige tropiske Kystflora.

Af Mexicos ovennævnte Arter nærmer den sig mest til *D. rubiginosa*, hvorfra den adskilles ved sin mindre Sammensætningsgrad, længere og tilspidsede Smaafinner o. fl. a. Den synes at staae *D. punctiloba* Hook. nærmere, i det mindste efter Beskrivelsen i Spec. fil. p. 79.

Tvivlsom.

Dicksonia multifida Sw. Presl. Rel. Hæk. 1. p. 68.

Mexico (uden Stedangivelse).

Jeg kan ikke tvivle om at det er en af de i Rel. Hæk. saa hyppige Urigtigheder i Angivelsen af Planternes Fædreland, som har bragt en østasiatisk Plante til at figurere som mexicansk.

Dicksonia adiantoides H.B.K. nov. gen. 1. p. 24. Presl Rel. Hæk. 1. p. 67.

Anføres fra Mexico, men vistnok urigtigen. Hooker har heller ikke i Spec. fil. p. 75 taget Hensyn til Presl's Angivelse.

Davallia Sw.

1. **Davallia Schlechtendalii** Presl. Tent. Pterid. p. 129. Hooker sp. fil. 1 p. 189. t. 54. C. D. divaricata Schlechtl. Linnæa 5. p. 617. Mart. & Gal. I. c. p. 77.

Denne ved sine gjentagne overordentlig regelmæssige linieformige Bifurcationer saa høist charakteristiske Bregne er meget udbredt i Mexicos tempererte Skovregion imellem 4—6000 Fod. Den voxer paa Leerjord paaaabne Steder i Skovene imellem Krat af Ericaceer, Weinmannier o. dl. Jeg fandt den imellem Huitamalco og Tiuzulan (5—1000) i Dep. Vera Cruz; ved Teotalingo i Chinantla, i Bjergskoven imellem Totontepec og Trapiche de la Concepcion ved Comaltepec, og ved Zuchila i Dep. Oajaca. Galeotti angiver den fra nogle flere Localiteter i den samme Region i det østlige Oajaca, saaledes ved Roayaga, Talea, Tanetze, Lalana.

Denne Bregnes Stængel er meget tynd, bugtet og noget nedliggende, men ikke slyngende, saaledes som Hooker synes at mene.

Adiantum L.

* fronde pinnata.

1. **Adiantum macrophyllum** Sw. Hook. & Grev. ic. fil. t. 132. Schlechtd. Linnæa 5. p. 615. Mart. & Gal. I. c. p. 68. Kze fil. Leibd. I. c. p. 337.

Voxer i Mexicos østlige varm-tempererte Region imellem 2—4000' i fugtige Skove og skyggefulde Klöfter paa Klipper. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco; Galeotti i Skove og Baranker ved Zazuapan; jeg traf den i den samme Region i Baranca de Sta Maria Tlatelá.

2. **Adiantum obliquum** Willd. sp. 5. p. 429. Hook. & Grev. ic. fil. t. 190.

Da mine Exemplarer ikkun i Størrelse afviger fra Beskrivelsen i Hooker & Grev. Icones, men forresten stemmer vel overeens med Artscharakteren, har jeg ikke taget i

Betænkning at henføre min Plante til den willdenowske Art. Til større Sikkerhed vil jeg give en nöiagtig Beskrivelse af min Plante.

Frons pinnata 4—6 pollices longa, 2 poll. lata, stipite 1—2 pollicari, lanceolata, pinnis 7—9 alternis brevipetiolatis sursum sessilibus patulis 1—1½ poll. longis 5—6 lin. latis, ovato-lanceolatis obliquis acutis, basi superiori rotundatis, inferiori truncatis, margine frondis sterilis densissime denticulatis, pagina anteriori nitidis, posteriori glaucis, utrinque soro-phoris, soris linearibus discretis, venis e basi flabellatim expansis repetite dichotomis; pinna terminali oblique rhomboidalii, basi cuneata, apice acuta; stipite rhachique obsolete tetragonis ebeneis nitidis rufo-squamulosis.

Ikkun engang har jeg fundet denne Art i de varm-tempererte Skove imellem Lobani og Petlapa (Distr. Chinantla Dep. Oajaca, 2—3000') paa Klipper.

* * fronde pinnato-digitata.

- 3. *Adiantum radiatum* L.** Plum. fil. t. 100. Schlechd. Lin. 5. p. 615. Mart. & Gal. I. c. p. 69. Kze fil. Leibd. I. c. p. 337.

Udbredt fra den østlige Kystregion indtil 4500 Fods Höide, voxende paa skyggefylde Steder i Skove. Schiede fandt den ved Hacienda de la Laguna; Galeotti ved Jalapa og Mirador; jeg ved Mirador og Ranchoen Cabrestros ved Rio Nautla (Dep. Vera Cruz).

* * * fronde bipinnata.

- 4. *Adiantum villosum* L.** Schk. Crypt. t. 120. Mart. & Gal. I. c. p. 69. Kze fil. Leibd. I. c. p. 337.

Forekommer hist og her sparsomt i den østlige varm-tempererte Region imellem 2—3000 Fod i Skovvegne paa Klipper. Galeotti angiver den fra Klipper ved Mirador, hvor jeg under et længere Ophold ikke har seet Spor af den; muligen er det snarere i en af Barankerne omkring den nærliggende Hacienda Zazuapan, at den er blevnen funden, og maaskee er det samme stedsfra at de Leiboldeske Exemplarer hidrøre. Jeg fandt den i Skove omkring Jocotepec i Districtet Chinantla, Dep. Oajaca.

- 5. *Adiantum tetraphyllum* Willd.** Schlechtd. Lin. 5. p. 615. A. prionophyllum HBK. Mart. & Gal. I. c. p. 69.

Tilhører den østlige tempererte Skovregion imellem 3—4500'. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco; Galeotti ved Mirador.

- 6. *Adiantum fructuosum* Kze.** fil. Poepp. I. c. p. 81. Ej. Farrnkr. p. 28. t. 15. Mart. & Gal. I. c. p. 81.

Meget almindelig i den østlige tempererte Region imellem 3—4500' i fugtige

skyggefulde Skove og Baranker. Jeg fandt den ved Mirador, Totutla, Dos puentes, S. Antonio Huatusco, samt ved Lobani i Chinantla.

Muligen er den under foregaaende Art anførte Localitet Mirador i Virkeligheden at henføre til denne Art. En ægte *A. tetraphyllum* W. har jeg ikke truffet i Mexico; bekjendt er det, hvor stor For vexling der har hersket imellem *A. tetraphyllum* W. og *A. fructuosum* Kze, hvorpaa Kunze anfører Exemplarer i Farrnkräuter p. 28.

7. *Adiantum pulverulentum* L. Schk. Crypt. t. 119.

Denne hidtil ikkun fra de större Antiller kjendte Bregne fandt jeg i den subtropiske Region ved S. Pedro Tepinapa (Distr. Chinantla, Dep. Oajaca) i fugtige skyggefulde Skove.

* * * * fronde supradecomposita.

8. *Adiantum Capillus Veneris* L. Schlechtd. Lin. 5. p. 615. *A. affine* Willd. Mart. & Gal. l. c. p. 70. *A. trapeziforme* Schk. Crypt. t. 121.

Særdeles udbredt i den tropiske og subtropiske østlige Skovregion indtil 3000', voxende i Klippeklofter. Schiede fandt den ved Jalapa og paa Hac. de la Laguna. Galeotti ved Zazuapan og Guadalaxara; jeg samlede den ved Colipa, Misantla, Hac. de Sta Barbara, Jicaltepec, Pital, Mirador, i alle Aarets Tider.

I Henseende til Lövets Störrelse og Finnernes Form er den yderst foranderlig. Mærkligt synes det, at den vidtudbrede Bregne, som er saa hyppig i det sydlige Europa, og selv forekommer i Baiern, Schweits og England, og der godt taaler lavere Temperaturer, i Mexico ikkun findes i de varmeste Strög, ikke overskrider 3000 Fod, det vil sige, ikke taaler en lavere Middeltemperatur end 16—17° C. Alligevel er der ingen Anledning til at antage Artsforskellighed imellem den tropisk-mexicanske og den europæiske Form.

9. *Adiantum trapeziforme* L. Schlechtd. Lin. 5. p. 615. Mart. & Gal. l. c. p. 70. Kze fil. Leibd. l. c. p. 337. *A. rhomboideum* Schk. Crypt. t. 122.

Voxer paa skyggefulde Steder i Skove og Klofter i Mexicos tropiske og subtropiske østlige Region fra 0—4000'. Schiede fandt den ved Hac. de la Laguna; Galeotti i Baranca de S. Martin ved Zazuapan; jeg ved Laguna verde, imellem Isleta og Maloapam, i Potrero de Consoquita, omkring Mirador.

Ogsaa denne Art er meget foranderlig i Störrelse, Form og Lövets Consistents. Mine Exemplarer fra Maloapam ere 2½ Fod lange.

10. *Adiantum amabile* Liebm.:

fronde tenerrima pallide-viridi, flabellatim expansa, pyramidali 1½—2 pedes longa, 1½ ped.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

lata, stipite 7—9 pollicari, quadruplicato-pinnata; *pinnis primariis* patentissimis leviter flexuosis alternis remotis lato-lanceolatis; *secundariis* alternis lanceolatis; *tertiariis* elongatis; *pinnulis* brevipetiolatis (petiolis capillaribus nigris) obovato-cuneatis obliquis $3\frac{1}{2}$ —4 lineas longis, 3 lin. latis, apice irregulariter subtrilobis integrisve rotundatis, lobis denticulatis; venis tenuibus flabellatum bis-ter-dichotomis; sinibus sorophoris, indusiis rotundato-reniformibus badiis; stipite ad basin pennam corvinam crasso, squamis adpressis lanceolatis obsito, tereti, ebeneo nitido; rhachi universali partialibusque flexuosis ebeneis nitidis teretibus. Rhizoma horizontale squamis minutis nigris rigidis adpressis obtectum, radiculos longissimos rufo-villosos emittens.

Dette er udentvivl en af de skjønneste Arter af denne skjønne Slægt. Jeg opdagede den i Bjergskoven imellem Tonaguia og Roayaga (District Villa alta, Dep. Oajaca, imellem 4—5000 Fods Höide, voxende paa sandblandet Leer imellem Begonier og lave Chamædoreer.

Af de beskrevne Arter staer den nærmest til *A. cuneatum* Langsd. & Fisch., men afviger ved sin Størrelse, Deling, Finnernes Form, o. dl., som ovenstaaende Beskrivelse noksom udviser.

11. *Adiantum cuneatum* Langsd. & Fisch. ic. fil. p. 23. t. 26. Hook. & Grev. ic. fil. t. 30. Schlechtd. Lin. 5. p. 615. Mart. & Gal. I. c. p. 70.

Denne Art er i Mexico indskrænket til de höiere koldere Fjeldregioner imellem 7—10500 Fod, voxende i Klippekloster. Schiede fandt den ved St. Andres ved den vestlige Fod af Vulkanen Orizaba; Galeotti traf den omkring Vaqueria del Jacal paa Vulkanen imellem 9—10500', og paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca; jeg fandt den ved Vaqueria del Jacal, og ved Tiuztlan og Chinautla (Dep. Puebla 7—8000') voxende i Steengjærder og paa Klipper.

I Presl's Tent. pteridogr. p. 156 opstilles den af Schlechtendal som *A. cuneatum* bestemte schiedeske Plante som egen Art under Navn af *A. mexicanum*; saavidt mig bekjendt er denne Adskillelse ikke bleven nærmere begrundet.

12. *Adiantum andicola* Liebm.:

fronde coriacea supra viridi nitida subtus glauca opaca, flabellata expansa, pedali, 7 pollices lata, stipite 6—7 pollicari, quintuplicato-pinnata, partitionibus omnibus alternis lanceolatis, pinnulis lato-flabellato-cuneatis, 3 lin. longis 3—4 lin. latis, apice 2—3 lobis, lobis rotundatis emarginatis, soris ad apicem lobarum rotundato-reniformibus, indusiis cartilagineis obscure-olivaceis striatis margine integro incrassato subrevoluto; stipite rhachi universali partialibusque ebeneis nitidis teretibus flexuosis.

Det eneste Sted, jeg har fundet denne Art, er paa Cerro de Sempaltepec (Dep. Oajaca) i Bjergskove paa 9000 Fods Höide, voxende i Klippekløfter.

Den nærmer sig meget til *A. cuneatum*, men er efter min Mening derfra forskjellig ved Lövets femdobbelt Sammensætning, ved de mere sammentrængte Grene, ved Finnernes mere læderagtige Substans, fornemmelig ved de større bruskagtige stribede Indusier med heel og fortykket Rand, medens Indusierne hos *A. cuneatum* ere tyndere i Randen hindagtig udvidede lidt tilbagebøede og rundbugtede.

- 13. *Adiantum tenerum* Sw.** Dict. scienc. nat. Acot. t. 85. Schlechtd. Lin. 5. p. 615.
Mart. & Gal. l. c. p. 71. Kze fil. Leibd. l. c. p. 338. *A. pellucens* Mart. & Gal.
l. c. p. 72. t. 19!

En meget udbredt Art i Mexico igjenem alle Regioner lige fra den hede Østkyst indtil over 8000', voxende i Skove, Baranker, paa fugtige skyggefulde Steder. Schiede fandt den ved Papantla og Jalapa; Galeotti ved Puente nacional, Tanetze, Talea; jeg i Kystslove ved Colipa og Misantla, ved Mirador, Trapiche de la Concepcion (Dep. Oajaca), ved Chinautla og Tizutlan (Dep. Puebla).

Jeg deler ganske Kunzes Mening, at *A. pellucens* Mart. & Gal. uden Grund er adskilt fra *A. tenerum*. Den flygtige Beskrivelse indeholder ikke en eneste Charakter, som har nogen Vægt ved saa foranderlige Former, som Arterne af denne Slægt ere.

- 14. *Adiantum chilense* Kaulf. α *glabrum* Klotsch.** Lin. 18. p. 556. Hook. & Grev. ic. fil. t. 173. *A. lobatum* Presl. Rel. Hæk. 1. p. 62.
Mexico, Hænke, Aschenborn.

β *pilosulum* Liebm.: pinnis utrinque pilosulis, rhachibus tertiaris et secundariis rufo-pilosis, stipite rhachique universali glabris.

Den haarede Form af denne Art samlede jeg i de hede Skove omkring Papantla i Kalkklippernes Sprækker.

A. chilense Kaulf. β *hirsutum* Kze. fil. Poepp. p. 83. *A. glanduliferum* Kze. Link. fil. h. Berol. p. 72 atviger ikkun fra min Plante deri, at Finnerne ere laadne paa Undersiden, og har den bruskagtige Rand kjerlet, medens min Plante har begge Sider af Finnerne fluhaarede, og ingen bruskagtig kjerlet Rand.

- 15. *Adiantum concinnum* Humb. Bonpl. & Kth. nov. gen. & sp. 1 p. 17. Kze Addit. l. c. p. 142. Mart. & Gal. l. c. p. 73. Kze fil. Leibd. l. c. p. 338. Presl. Rel. Hæk. 1 p. 64. Nees ab E. Linnæa 19. p. 684.**

I den tropiske og subtropiske Region er denne Art særdeles hyppig imellem 0—

3000'. Jeg fandt den ved Colipa, Mirador, Trapiche de la Concepcion paa fuglige Klipper, i Skove, Baranker, eller ved Vandløb. Galeotti anfører den fra Real del monte paa 8000', men denne Angivelse forekommer mig lidet sandsynlig. Schiede og Aschenborn sendte den fra Mexico uden Stedbetegnelse.

Tvivlsomme Arter.

Adiantum excisum (Kze fil. Poep. l. c. p. 82. Anal. Pteridogr. p. 33 t. 21.?) Mart. & Gal. l. c. p. 71. Coll. H. Gall. no. 6360.

Anføres af Galeotti som voxende paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7—8500'), sammen med A. cuneatum. Den kunzeske Plante er beskrevne fra Chile efter poeppigske Exemplarer, og den er ikke funden af nogen Anden i Mexico. Muligen er det en Form af A. cuneatum som forstaaes under den martens-galeottiske Benævnelse.

Adiantum fragile Sw. var. pubescens Mart. & Gal. l. c. p. 72. Coll. H. Gal. no. 6445.

Efter Galeotti paa Klipper ved Rio grande de Lerma ikke langt fra Guadalaxara (2500—3500'). Mig ubekjendt. Hører muligen til A. chilense Kaulf. var. pilosulum.

Adiantum lunulatum Burm. Hook. & Grev. ic. fil. t. 104. Presl Rel. Hæk. 1 p. 62. A. lunatum Cav. præl. no. 676 p. 273. A. arcuatum Willd.

Efter Cavanilles Angivelse er den samlet af D. Luis Neé ved Acapulco. I Rel. Hæk. findes som Stedangivelse Mexico, uden nærmere Betegnelse.

Tager man Hensyn til A. lunulatum er en i det sydøstlige Asien almindelig udbredt Bregneform, at Néé paa sin Expedition besøgte baade Mexico, og umiddelbart derpaa de asiatiske Øer, at Hænke ligeledes besøgte samme Steder, og endelig, at en For vexling af Etiquetter ved Samlinger fra en stor Expedition saa let kan forekomme, hvorved Forvirring i Stedangivelserne opstaaer, især naar Bearbejdelsen af Samlingerne ikke besørges af selve Samleren, saa forekommer det mig let forklaart, hvorledes en Feiltagelse i Etiquetten kan kave givet Anledning til denne Arts Indførelse i den mexicanske Flora, hvorfra den formodentlig vil blive at stryge. Ingen af de nyere Naturforskere, som have bereist Mexicos Vestkyst har fundet den der.

Adiantum amplum Presl Rel. Hæk. 1 p. 63. Nees ab E. Linnaea 19. p. 684. Mexico. Hænke. Culantrigo de Berghes.

Beslaegtet med A. Capillus. Mig ubekjendt.

Adiantum incisum Presl Rel. Hæk. 1. p. 61. t. 10. f. 3.

Mexico. Mig ubekjendt.

Adiantum lucidum Sw. Presl Rel. Hæk. 1. p. 60.

Mexico. Vistnok urigtig Fædreland.

Adiantum monotis Nees ab E. Linnæa 19. p. 684.

Mexico. Aschenborn.

Jeg tvivler om at denne Art med Rette er adskilt fra *A. villosum*, der er visse Forandringer underkastet i Finnernes Form.

Lindsæa Dryand.

1. ***Lindsæa stricta* Dry.** Presl Rel. Hæk. 1. p. 59. Schk. Farrn. t. 114. Hook. sp. fil. p. 216.

Anføres fra Mexico af Presl uden Stedsnavn. Ingen af de nyere Samlere havde hjemsendt den. Jeg fandt faa Exemplarer paa Klipper imellem Comaltepec og Trapiche de la Concepcion (Dep. Oajaca, 2500'), frugtbærende i August.

2. ***Lindsæa imbricata* Liebm.:**

fronde bipinnata 12—15 poll. longa, stipite 6 pollicari, pinnis 10 patulis, infimis duabus oppositis, ceteris alternis, elongato-lanceolatis attenuatis excurrentibus, pinnulis sessilibus subimbricatis membranaceis viridi-flavescens patulis, 4 lineas altis, 8—9 lin. latis, dimidiato-ovatis, basi cuneatis, margine superiori integris convexiusculis, apice rotundato-obtusissimis, inferiori rectis vel parum arcuatis, basi posteriori truncatis; soris continuis intramarginalibus; costa marginali, venis ex angulo basilari flabellatum radiantibus dichotomis ante marginem desinenteribus; pinnulis superioribus triangularibus, infimis flabellatis apice rotundatis; stipite rhachibusque quadrangulis antice profunde canaliculatis, postice convexis, glabris stramineis nitidis.

Jeg fandt denne Art i Bjergskove ved S. Pedro Tepinapa imellem 1500—2000', voxende paa fugtige skyggefulde Steder.

Den er nærmest beslægtet med *L. trapeziformis* Salisb., men denne afviger derfra ved færre (8), mere fjerntstaaende, mindre tilspidsede, ikke udlöbende Finner, Småfinnerne fjernere, de øvre ikke triangulære, den øverste meget større.

Nephrolepis Schott.

1. ***Nephrolepis acuta* Presl** (nomen) *Aspidium acutum* Schk. Crypt. p. 32. t. 31 (pars media frondis). Sw. Syn. fil. p. 46. Willd. enum. v. 5. p. 221.

Den hele Kundskab om denne Bregne synes at grunde sig paa Schkuhrs Afbildning efter et Fragment i Breyen's Herbarium. Uagtet nu denne Figur giver en ganske god Fremstilling af et lille Parti af det midterste Löv, faaer man dog ingen Forestilling om den hele Bregne deraf, idet baade den nedre frugtløse Deel, og den øvre stærkt frugtbærende Deel afvige betydelig fra den fremstillede midterste. Da alle Beskrivelser (Swartz's, Willdenows, Sprengels) ere udkastede efter den schkuhrske Tegning, er Planten følgelig

endnu meget usfuldkomment kjendt. Dertil kommer, at Nervationen ikke er nöiaglig anlagt paa Tegningen, og at Sori ere aldeles urigligen tegnede paa Midten af en Aare, imedens de ere befestede paa de punktformige Ender af Aarerne. Af disse Grunde har jeg anseet det for rigtigt at meddele en ny Beskrivelse.

Frons coriacea erecta laxa tripedalis pinnata, pinnis alternis sessilibus articulatis deorsum remotiusculis sterilibus, sursum magis approximatis decrescentibus angustioribus fertilibus; pinnis sterilibus c. 4 poll. longis 9—11 lineas latis elongato-lanceolatis obtusiusculis subrectis, leviter undulatis aut parce deflexo-falcatis, margine crenulatis, basi utrinque oblique truncatis, hic illic ad basin superiorem rotundato-auriculatis; costa utrinque prominula straminea subtus sparse rufo-squamulosa, venis bifurcatis ante marginem puncto albido desinentibus; fertilibus 3—4 poll. longis semipollis latis linearis-lanceolatis acuminatis acutis, basi utrinque rotundato-auriculatis, margine birenatis, crenis majoribus rotundatis minoribus interjectis; soris intramarginalibus apice punctiformi venarum insidentibus; indusiis suborbiculatis umbonatis integerrimis; stipite rhachique fuscis rufo-villosis, deorsum demum glabrescentibus nitidis, antice canaliculatis, postice convexis.

Jeg fandt denne critiske Plante i tætte Urskove ved S. Pedro Tepinapa i Districtet Chinantla, Dep. Oajaca.

Saaledes er det da vist at denne Art tilhører America, og ikke, saaledes som af Swartz o. a. formodedes, Ostindien. I Sprengels Syst. v. 4 p. 99 anføres Guadeloupe som dens Födeland, hvor den samledes af Bertero, men jeg veed ikke, om det virkelig er den ovenbeskrevne Plante. Presl synes ikke ganske at have været paa det rene med denne Art, eftersom han først (Tent. Pteridogr. p. 79 opfører den som en *Nephrolepis*, med Synonym *A. acutum* Schk., og derpaa p. 83 som *Polystichum acutum* med Syn. *A. acutum* Sw., uagtet Swartz's og Schkuhrs Plante er et og det samme.

2. *Nephrolepis neglecta* Kze Addit l. c. p. 149. Asp. exaltatum Schk. Crypt. t. 32. b.

Voxer paa fugtige skyggefulde Steder i den østlige subtropiske og varm-tempererte Region. Schiede fandt den paa Hac. de la Laguna ved Cueva grande; jeg paa Hac. de Jovo ved Tlapacoyo i Baranken ved Arroyo de Isapa.

3. *Nephrolepis occidentalis* Kze fil. Leibd. l. c. p. 343. Asp. tuberosum Mart. & Gal. l. c. p. 65?

Jeg fandt denne Art paa fugtige græsrige Bjergsider imellem Chuapam og Teotalingo (Østlige Oajaca) omrent paa 4000' Höide. Den voxede sammen med *Woodisia mollis* Hook. Exemplarer samlede af Leibold vare betegnede: ad arborum truncos emortuos reg. temp., hvilken Angivelse neppe er rigtig. Hvis *A. tuberosum* Mart. & Gal. hører hertil, er den af Galeotti funden i Chinantla (2500—4000') under Forhold, som ligne de af mig angivne.

Til Kunzes Beskrivelse har jeg at tilføje, at Lövet vel sædvanlig ikke opnaer en Fods Længde, men stundom bliver over to Fod langt. Ved Grunden af de tilleddede Finner findes et lille Knippe rustgule Haar.

Usikkre.

Nephrolepis acuminata Presl Tent. Pteridogr. p. 79. *Nephrodium acuminatum* Presl Rel. Hæk. 1. p. 31. Aspid. acum. Willd.

Mexico, uden nærmere Betegnelse.

Nephrolepis hirsutulum Presl. *Nephrod. hirsut.* Presl. Rel. Hæk. 1. p. 32. Aspid. hirsut. Sw.

Mexico, uden nærmere Betegnelse.

Nephrolepis exaltata Schott. *Nephrod. exalt.* Brown. Presl Rel. Hæk. 1. p. 33. Aspid. exalt. Sw.

Mexico, uden nærmere Betegnelse.

Disse tre Arter, som nævnes i Rel. Hænkeanæ som mexicanske, anføres for Fuldstændigheds Skyld her, uagtet jeg antager, at deres Stedsangivelse i ovennævnte Værk er urigtig.

Lastrea Presl.

1. **Lastrea patens Presl.** Aspid. patens Sw. Schlechtd. Lin. 5. p. 610. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 344. Schk. Crypt. t. 34. Sloan. hist. jam. 1. t. 52. f. 1.

Voxer paa fugtige skyggefulde Steder i den østlige hede og varm-tempererte Region. Schiede fandt den ved Breden af Smaafloder ved Misanila, i skyggefulde Skove paa Cuesta grande de Chiconquiaco. Jeg fandt den i Skove om Jicaltepec ved Rio Nautha, ved Hac. de Mirador, og ved S. Pedro Tepinapa i Chinantla.

2. **Lastrea macroura Presl.** Aspid. macrourum Kaulf. enum. p. 239. Kze fil. Leibd. l. c. p. 344.

Hører til den samme Region, og findes under samme Forhold som foregaende. Jeg fandt den omkring Colipa, Sta Maria Tlapacoyo og Mirador.

3. **Lastrea parallelogramma.** Aspid. (Nephrod.) parallelogram. Kze Addit. l. c. p. 146. Aspid. crinitum Mart. & Gal. l. c. p. 66. t. 17 f. 2 (mala).

Denne smukke og anseelige Bregne er characteristisk for Mexicos höiere Cordillere-Regioner imellem 6—10000', voxende imellem Klippeblokke. Af Hegewisch og Karwinski var den først sendt fra Mexico, men uden Stedangivelse. Galeotti anfører sin Plante fra Llano verde i Oajaca (6—7500'). Jeg fandt den omkring Chinaula (Dep. Puebla) paa

7—8000'; i Malpays de la Hoya (7—8000'); paa Pico de Orizaba omkring Vaqueria del Jacal (10,000').

4. *Lastrea leptorhachis.* Aspid. (Nephrod.) leptorhachis Kze. fil. Leibd. I. c. p. 346.

Dette er en meget udbredt Art i Mexico fra 2500—7000'. Den voxer i Baranker, i Skove, imellem Stene; jeg fandt den ved Zazuapan, Aguas santas ved Mirador, Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca og ved Chinaulta i Dep. Puebla.

5. *Lastrea mexicana Presl.* Tent. Pteridogr. p. 76. Nephrodium mex. Presl Rel. Haenk. 1. p. 38. Aspid. mex. Kze Addit. I. c. p. 147.

Udbredt over et stort Areal i Mexico. C. Ehrenberg sendte den fra Omegnen af Mexico, og fra Atotonilco el grande; jeg fandt den paa Klippesider, som overrisles af neddrivende Vand, imellem Comaltepec og Trapiche de la Concepcion i Oajaca (2500—3000'), ligeledes imellem Talea og Hac. de Sta Gertrudes (3—4000').

Under Forudsætning, at den af Kunze (I. 1.) noigagtig beskrevne Plante, hvormed min fuldkommen stemmer overens, virkelig er den samme som den af Presl i Rel. Haenk. flygtigt og utilstrækkelig beskrevne, da er dette en Art af den Kunzeke Slægt Hypodematum (cfr. Kunze Analecta Pteridogr. p. 45. og Farnkræuter p. 141). Jeg finder bestandig det lille stilkformig fremtrædende Receptaculum, hvortil Sporangierne ere befæstede; det oppustede læderagtige nyreformige vedblivende ved Grunden tilvoxne Indusium, hvilke netop afgive de vigtigste Charakterer for Slægten; jeg har endelig sammenlignet min Plante med Hypodematum onustum Kze (Aspidium eriocarpum Wallich), hvoraf Original-Exemplarer ligge i Hornemanns Herbarium, og hvormed vor Plante virkelig har megen Lighed — men jeg finder ikke tilstrækkelig Grund til at sondre Hypodematum fra Lastrea. Hvis man antager Slægten Hypodematum, da blive ikke faa Arter af Lastrea at overføre til samme; saaledes begge efterfølgende Arter.

Anm. Aspid. Athyrioides Mart. & Gal. I. c. p. 67. t. 18. antager Kunze (fil. Leibd. I. c. p. 345) som identisk med *L. mexicana*, men jeg maa tilstaae, at jeg ikke kan indse, hvorpaa dette Antagende støtter sig. Vel er baade Afbildning og Beskrivelse som sædvanligt i hvert værk slet til Ukjendelighed, imidlertid forekommer dog Afvigelsen for stor.

6. *Lastrea paupertina Asp.* (Nephrodium) paupertinum Kunze fil. Leibd. I. c. p. 345. Dr. Schiede fandt den ved Temascaltepec. Mig ubekjendt.

7. *Lastrea indecora Liebm.*:

fronde subcoriacea glabra elongato-lanceolata acuminata utrinque decrescente, 7—10 pollices longa, 2½—3 poll. lata, bipinnato-pinnatifida, apice simpliciori, pinnis'patulis deorsum sub-

oppositis sursum alternis lanceolatis acuminatis brevipetiolatis $1\frac{1}{2}$ —2 poll. longis, $\frac{1}{2}$ —1 poll. latis; pinnulis subsessilibus inaequali-oblongis, 4—7 lin. longis, 2—3 lin. latis, pinnatifidis obtusis, basi inferiori decurrentibus, laciiniis brevibus falcato-lanceolatis obtusis, infimis argute paucicrenatis; soris seriatis (6—10 in quavis pinnula), singulis ad basin laciinae costae approximatis, indusiis reniformibus subcoriaceis flavescentibus glabrescentibus sub lente minutissime glandulosis; rhachi universali sursum partialibusque marginatis, stipite rhachibusque antice canaliculatis, postice obsolete angulatis, rhachibus partialibus postice scabridis.

Diftert a *L. mexicana*: fronde subcoriacea glabra multo minori, pinnis magis approximatis, lanceolatis, pinnulis oblongis, laciiniis argute-crenatis nec mucronato-serratis, indusiis minoribus minus gibbosus subglabrescentibus, rhachibus partialibus postice scabridis; a *L. paupertina* differt: fronde multo minori, pinnis pluribus alternis approximatis lanceolatis, pinnulis basi non auriculatis, laciiniis magis approximatis margine argute crenatis, indusiis pallide flavidis minutissime glandulosis.

Den voxer imellem Klipper i de tørre Mineraldistricter omkring Sölvværket Yavesia (7—7500') i Dep. Oajaca.

Da det er en særdeles vanskelig Afdeling, hvortil denne Art hører, saa at Beskrivelserne af de kjendte Arter neppe ere udførlige nok, for med Sikkerhed at afgjøre, om den foreliggende Plante derfra er forskjellig eller ei, er det først efter megen Bétaenkning at jeg har beqvemmet mig til at opstille den som ny Art. Mine Grunde herfor ere angivne i ovenstaaende Differentialcharakterer.

8. **Lastrea equestris.** Aspid. (Nephrodium) equestre Kze fil. Leibd. I. c. p. 347.

Denne anseelige og sirlige Art angives af Kunze fra den tempererte Region uden særlig Opgivelse af Voxested. Den er forbleven ubekjendt for mig.

9. **Lastrea ciliata Liebm :**

fronde herbacea læte-viridi concolori, 2— $2\frac{1}{2}$ pedali lato-lanceolata tripinnato-pinnatifida, sursum minus composita, *pinnis primariis* suboppositis patentissimis lanceolatis acuminatis acutis petiolatis remotiusculis, infimis basin versus bipinnato-pinnatifidis sursum pinnato-pinnatifidis, apicem versus confluentibus; *secundariis* alternis elongatis acuminatis 2— $2\frac{1}{2}$ poll. longis, pollicem latis divergentibus; *tertiariis* adnatis falcato-ovalis acutiusculis basi decurrentibus, pinnatifidis, laciiniis ad medianum incisis falcato-lanceolatis acutis margine parum reflexis obsolete repandulis ciliatis, venis simplicibus furcatisve utrinque conspicuis, soris dorso medio venarum insertis cinnamomeis, indusiis tenuiter membranaceis orbicularibus basi cordatis; costa utrinque prominula pilosa, rhachibus tertiaris alatis utrinque pilosulis, postice squamulosis, secundariis et universali antice canaliculatis, lateribus planis, postice convexis pilosulis squamis fuscis lanceolatis acutis adpressis adpersis.

Voxer i Skove og Krat omkring S. Antonio Hualusco (4500'), hvor den fandtes i Frugt i Januar og Februar.

Den hører til Afdelingen Thelypteris i Presls Tent. Pteridogr., men har ikke nogen mig bekjendt Form, hvortil den umiddelbart slutter sig, eller hvormed den kan forvexles.

Tivilsomme.

Lastrea (Aspidium Serra Willd.) Mart. & Gal. l. c. p. 65.

Anføres af Galeotti fra Puente nacional (800—1000').

Mon ikke L. patens, som ikke findes optagen i Forff's Memoire, skjuler sig under denne Benævnelse?

Lastrea subincisa Presl. Polypodium subincisum W. Mart. & Gal. l. c. p. 43.

Anføres af Galeotti fra Klipper ved Zazuapan, men denne Angivelse trænger til Bekræftelse.

Lastrea (Aspidium abruptum Kze) Mart. & Gal. l. c. p. 65.

Efter Galeotti paa Bredden af Bakke ved Hacienda de la Compañia i Nærheden af Ejutla i det sydøstlige Oajaca (4500—5000').

Da Kunze beskriver sin Plante fra tørre Skove om Pampayaco i Peru, forekommer det af Galeotti angivne Stedforhold mig saa afgivende, at jeg ikke tør tilbageholde min Tivil om Bestemmelsens Rigtighed.

Lastrea semicordata Presl Tent. Pteridogr. p. 77. Nephrodium semicordatum. Presl Rel. Hank. I. p. 32. Aspid. semicord. Sw.

Mexico, uden nærmere Betegnelse. Vistnok yderst usikker.

Lastrea (Aspidium athyrioides) Mart. & Gal. l. c. p. 67. t. 18. (mala).

I Ege- og Fyrreskove i Real del monte (8—8500'), Galeotti.

Det er vanskligt at gjøre sig nogen Forestilling om denne Plante, som Forff selv sammenligne paa den ene Side med Asplenium Michauxii Sprl. og Asplen. filix mas Bernh., begge Arter af Slægten Athyrium, og paa den anden Side med Aspid. mexicanum Presl, med hvilken sidste de sige at den er mest beslægtet. Kunze antager den endog for identisk med denne sidste. Men hverken Beskrivelse eller Afbildning passer paa den udforligere Beskrivelse af A. mexicanum, som Kunze har givet i Addit l. c. p. 147. Afbildningen er som sædvanlig aldeles forfeilet.

Lastrea? Tectaria cinnamomea Cav. præl. no 622. p. 253. Aspid. cinnam. Sw. syn. fil. p. 55. Willd. Syst. v. 5. p. 570.

Ved Chalma i Ny-Spanien af D. Luis Née efter Cavanilles.

Denne af Ingen gjenkjendte Art forekommer mig efter den spanske Beskrivelse at

maatte have megen Overensstemmelse med L. leptorachis, ja muligen er den identisk med samme; men Beskrivelsens Korthed tillader ikke at komme paa det Rene om dette.

Lastrea Schiedeana Presl Tent. Pter. p. 76. (nomen) Aspid. Schlechtd. Lin. 5. p. 611. Ubeskreven.

Nephrodium Schott. Presl.

1. **Nephrodium molle Schott.** Aspid. molle Sw. Kze Addit. I. c. p. 146. Schk. Crypt. t. 34. b. Jacq. ic. rar. t. 640.

Schiede sendte den først fra Mexico uden Stedangivelse; Karwinski senere fra Tejomulco i Oajaca; jeg fandt den i fugtige skyggefulde Skove omkring Colipa.

2. **Nephrodium paludosum Liebm.**:

fronde coriacea olivacea 3 pedali, stipite $1\frac{1}{2}$ pedali et insuper, elongato-lanceolata pinnato-pinnatifida, pinnis infimis suboppositis distantibus, sursum alternis magis approximatis, patulis, linearie-lanceolatis, 4—3 poll. longis, $\frac{1}{2}$ poll. latis, brevi-acuminatis acutis, brevipetiolatis, sursum sessilibus, laciiniis ad medium pinnam incisis, divergentibus, lato lanceolatis falcatis, 2 lin. longis latisque, marginibus revolutis integris, apice obtusiusculis, sinus acutis; pagina antica glabra, postica griseo-puberula; costa antice canaliculata, postice acuta, costulis (laciinarum) utrinque prominulis; venis simplicibus excurrentibus, infima superiori in angulum acutum cum infima inferiori proxima anastomosante, vena ex angulo superiori in sinum laciinarum excurrente; soris medio dorso venarum insertis globosis; indusis reniformibus villosis; rhachi apicem versus puberula ceterum glabra nitida straminea una cum stipite antice canaliculatis postice angulatis acutis, stipite deorsum nigrescente.

Rhizoma subterraneum breve frondes plures cæspitosas emittens.

Denne hidtil ubeskrevne Art voxer i stor Mængde i Moser lidet V. for S. Antonio Huatusco imellem de smaa Grus- og Slam-Vulkaner, som benævnes los Hornillos. Den findes der i Selskab med Osmunda cinnamomea og spectabilis, og indsamledes i Februar godt fructificerende.

Polystichum Schott. Presl.

1. **Polystichum ordinatum Kze** fil. Leibd. I. c. p. 347. Aspid. aculeatum Sw? Schlechtd. Lin. 5. p. 611. Mart. & Gal. I. c. p. 67.

Hører til den tempererte Regions charakteristiske Bregner imellem 4500—8000'. Den voxer paa Leerbakker imellem Krat selskabeligen i store Masser. Jeg fandt den meget almindelig paa de saakaldte Hornillos, lidet V. for S. Antonio Huatusco; ved S. Jago Amatlan imellem Totontepec og Trap. de la Concepcion i Dep. Oajaca, og imellem Yalalag

og Yagochi (7—8000'), i samme Dep. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco. Galeotti anfører vel Aspid. aculeatum, som aabenbart er den nærværende Art, fra Klipper om Zacuapan (2500—3000') men jeg er vis paa at dette er urigtigt, og at Galeottis Plante hidrører fra Huatusco.

Den golde Plante har et meget bredere Løv end den frugtbærende. Den ved Amatlan i Oajaca samlede Form udmærker sig fra den ved Huatusco voxende ved sin smukke blaagronne Farve, som ikke forandres ved Tørring, medens den huatuscanske bliver oliven-brun. Skjællene paa Stipes og Rhachis varer paa hin större og bredere, men disse Charakterer forekom mig ikke tilstrækkelige til at begrunde nogen Artsforskjel.

2. *Polystichum vestitum* Presl. Aspid. vestitum Sw. Kze. Addit. l. c. p. 148.

Sendt af Karwinski fra S. Pedro Nolasco i Oajaca. Jeg fandt den imellem Lavablokke i Malpays de la Hoya (7500—8000).

3. *Polystichum melanostictum* Presl. Aspid. melanostictum Kze Addit. l. c. p.

148. Kze fil. Leibd. l. c. p. 348. Mart. & Gal. l. c. p. 68.

Hører til de almindeligste og mest udbredte Arter i Mexicos tropiske og varmt tempererte østlige Region imellem 0—4000'. Den voxer i fugtige Skove, Baranker. Jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Mirador og Jocotepec i Oajaca; Schiede sendte den fra Cuesta grande de Chiconquiaco.

4. *Polystichum lætum* Presl. Aspid. lætum Sw. Vet. Act. 1817 p. 63. t. 4. f. 3.

Kze Addit. l. c. p. 149.

Schiede fandt den paa Cuesta grande de Jalacingo.

Tvivlsom.

***Polystichum cystopteroides* Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 685.**

Mexico, Aschenborn.

Mig ubekjendt. Beskrivelsen er altfor kort. Efter Forf. skal den ligne *P. coriaceum* Presl, men være mindre, og ensfarvet grön paa begge Sider.

***Phanerophlebia* Presl.**

1. *Phanerophlebia nobilis* Presl. Aspid. nobile Schlechtd. Lin. 5. p. 610. Kze

Farrn. p. 455. t. 67. (optimal!) Ej. Addit. l. c. p. 146. Ej. fil. Leibd. l. c. p. 344. Aspid. pumilum Mart. & Gal. l. c. p. 64 t. 17 f. 1.

Denne høist udmærkede Bregne er meget almindelig i den subtropiske og varmt tempererte østlige Region, voxende i lyse Skove paa Klipper imellem Mos, i Baranker

o. dl. I de indre Dele af Mexico forekommer den ogsaa paa gunstige Localiteter. Jeg fandt den ved Hac. de Mirador, Potrero de Consoquilla, Zazuapan (2500—3000); ved Huatusco (4500), og ved Teotalcingo i Oajaca (4—5000'). C. Ehrenberg fandt den ved Hac. del Carmen imellem Omitlan og Atotonilco el grande. Galeotti i Llano verde, og det saakaldte Carizal (6500—7500').

Jeg anseer det for udenfor al Tivil, at Aspid. pumilum Mart. & Gal. henhører hertil, og ikke er andet end et ungt Exemplar. Det er mig forresten ufatteligt, hvorledes A. nobile, som ikke er omtalt i Mem. s. l. Foug., har kunnet undgaae Hr. Galeotti under et Aars Ophold paa Mirador, da den der hører til de almindelige Bregner.

Aspidium Schott.

Sagenia Presl. — Bathmum Presl.

1. ***Aspidium (Bathmium) trifoliatum* Sw.** Schk. Crypt. t. 28 et. 28. b. Schlechtd. Lin. 5. p. 610. Kze. fil. Leibd. l. c. p. 344. Aspid. heracleifolium Mart. & Gal. l. c. p. 65. Polypodium cordifolium Mart. & Gal. l. c. p. 31 t. 4. f. 2!

Meget udbredt i Mexicos østlige tropiske, subtropiske og varm-tempererte Region fra 0—4500'. Den voxer i Skove og Baranker paa fugtige skyggefulde Steder. Jeg fandt den ved Antigua, Colipa, Misantla, Jicaltepec, Mirador, Matlaluca og Teotalcingo (Oajaca). Schiede sendte den fra Cuesta grande de Chiconquiaco; Galeotti fandt den ved Puente nacional, Zazuapan, i Baranca de S. Francisco.

Den hører til de meget foranderlige Arter i Form og Størrelse, men desuagtet lettest igjenkjendelige. Den bærer Frugt i alle Udviklingsstadier fra 2—3 Tommers Størrelse til over to Fods. En saadan lille udelt frugtbærende Form med hjerteformigt Löv er Polypodium cordifolium Mart. & Gal. — et næsten exempelløst Beviis paa Forff's Overfladiskhed. Gjentagne Gange har jeg ved Teotalcingo og Mirador fundet denne lille Form, især ved Indgangen til smaa Klipperhuler. Ikun ved stor Flygtighed har Forff. kunnet oversee de kredsrunde Indusier; men blot ved noget Studium af Bregnernes Nervation maatte de vide, at ingen Polypodium har en saadan Nervation, som den af dem beskrevne Plante.

2. ***Aspidium (Bathmium) macrophyllum* Sw.** syn. fil. p. 43. & 239. Plum. fil. t. 145.

Denne ikke tidligere i Mexico fundne Bregne voxer i Mængde i Districtet Chinantla (Dep. Oajaca) i hede fugtige Skove. Jeg fandt den ved S. Pedro Tepinapa, Lobani og Petlapa.

Naar denne anseelige Bregne voxer i meget skyggefulde fugtige Skove, seer man ofte de gamle Exemplarer aldeles bedække med unge parasitisk fremvoxende Exemplarer, som udvikle sig paa Finnernes Middelaxe og ved Grunden af Finnerne paa Hovedstilklen.

Planten faaer derved et forunderligt fremmed Udseende. Det er mig ikke bekjendt, at den Slags Parasitismus har været iagttaget før hos Bregner.

3. *Aspidium (Sagenia) latifolium Presl.* Rel. Hænk. 1. p. 30.

Denne sjeldne Bregne, som kun er lidet kjendt, og som er beskreven af Presl efter Exemplarer i Hænkes Samlinger fra Mexico uden Angivelse af Localiteten, er temmelig udbredt i den østlige Del af Dep. Oajacas subtropiske Region, voxende paa fugtige Klippevægge imellem Krat. Jeg fandt den saaledes imellem Comaltepec og Trapiche de la Concepcion, ved Jocotepec og Petlapa i Chinantla.

Cystopteris Bernh.

1. *Cystopteris fragilis Bernh.* Aspid. fragile Sw. Schlechtd. Lin. 5. p. 611. Mart. & Gal. l. c. p. 67.

Schiede fandt den i skyggefulde Skove ved Jalapa; Galeotti paa Vulkanen Orizaba ved Cueva de Temascal paa 11—12500'.

2. *Cystopteris fumarioides Kze* fil. Poepp. l. c. p. 97. Kze fil. Leibd. l. c. p. 348. Aspid. fragile var. fumarioides Mart. & Gal. l. c. p. 67. *Athyrium fumarioides* Presl Rel. Hænk. 1. p. 39. t. 6. f. 2.

Angives af Galeotti fra samme Localitet som foregaaende; efter Kunze er den fundet af Leibold i den tempererte Region paa skyggefulde Steder, hvilket jeg dog betivler. Jeg fandt den kun i de höiere Cordillererregioner imellem Klipper, paa Steengjærder; saaledes ved Chinautla (7—7500') i Dep. Puebla, og paa Pico de Orizaba i 10,000 Fods Höide.

Athyrium Presl.

1. *Athyrium angustum Presl.* Aspid. angustum Willd. *Asplenium Michauxii* Sprlg. Mart. & Gal. l. c. p. 62. Coll. H. Galeotti no. 6269 & 6366.

Anføres at Galeotti som voxende i Fyrre- og Egeskove ved Bakke paa Vulkanen Orizaba paa 9500—11000', og ligeledes af samme fra Skove ved Sola i Oajaca (6500—8000').

2. *Athyrium arcuatum Liebm.:*

fronde subcoriacea atrovirente glabra bipedali, stipite semipedali, lanceolata, bipinnato-pinnatifida, pinnis alternis adscendentio-patulis 7—9 poll. longis 2—2½ poll. latis elongato-

lanceolatis acuminatis, pinnulis divergentibus sessilibus alternis, 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longis 4 lin. latis, elongato-lanceolatis, basi lato-cuneatis, apice obtusiusculis, profunde pinnatifidis, lacinias subfalcato-ovalis argute crenatis, sinibus latiusculis, costis antice canaliculatis postice prominulis, venis pinnatis; soris lunatis, costae approximatis; rhachi universali flexuosa antice canaliculata postice convexa, partialibus arcuato-ascendentibus marginatis hic illuc squamulosis.

Denne Art, som har en flygtig Lighed med *A. filix foemina*, hvorfra den dog adskiller sig ved mange Charakterer, fandt jeg i Baranker ved Chinautla i Dep. Puebla (7000') imellem Krat af *Philadelphus*, *Rhamnus* og *Laurineer*.

Cibotium Haulf.

- 1. *Cibotium Schiedei* Schlechtd.** Lin. 5. p. 616. Presl Tent. Pter. t. 11. f. 9.
Mart. & Gal. I. c. p. 80. Hook. sp. fil. 1. p. 84. t. 30 A.

Denne prægtige Bregne opdagedes af Schiede paa Hacienda de la Laguna, og blev siden funden af Galeotti ved Jalapa. Jeg fandt den meget hyppig i Dybet af de vanskelig tilgjængelige Baranker omkring Mirador, saaledes i Baranca de Consoquitla og S. Francisco paaaabne Klipper. Den er saaledes udbredt i den subtropiske og varm-tempererte østlige Region imellem 2—4000'.

Naar Galeotti angiver dens Stamme til 10—15 Fod, en Angivelse som Hooker har optaget efter Galeotti, da er dette valdeles falsk, thi Bregnens er slet ikke traagtig, end mindre af en saa betydelig Størrelse. Middelstokken bliver i det höiested af 4—6 Tommers Længde, er saftig, omsider læderagtig, og derfra opstige 5—6 Löv af 4—6 Fods Længde.

2. *Cibotium horridum* Liebm.:

fronde subcoriacea antice obscure viridi, postice glauca, lato-lanceolata, 3 ped. longa, 1— $1\frac{1}{2}$ ped. lata, stipite pedali, bipinnato-pinnatifida, pinnis alternis remotis patulis pedalibus, 3—4 poll. latis, lanceolatis, pinnulis alternis approximatis divergentibus sessilibus basi inferiori adnatis 2— $2\frac{1}{2}$ poll. longis 4—5 lin. latis elongato-lanceolatis longe acuminatis acutis, profunde pinnatifidis, lacinias falcato-lanceolatis obtusiusculis integerrimis margine revolutis, sursum decrementibus demum confluentibus, sinibus obtusiusculis, costa pinnulae postice setoso-squamosa, costulisque laciniarum utrinque prominulis atropurpureis, venis furcatis; stipite rhachi universali partialibusque flavidis antice canaliculatis postice convexis undique squamis rigidis adnatis patentissimis subulatis 2—3 lin. longis flavidis densissime obsitis.

Rhizoma breve 3—4 pollicare succulentum squamosum.

Af Slægten *Cibotium* ere hidtil ikkun 6 Arter beskrevne, og det er saaledes interessant at kunne føie en ny Art til det indskrænkede Antal. Mærkeligt er det ogsaa, at Mexico er det eneste americanske Voxested for Arter af denne Slægt, idet de andre hidtil beskrevne Arter henhøre til Ostindiens, de sydost-asiatiske Öers og Sydhavsoernes Florer.

Den nærværende nye, og fra de bekjendte Arter lettelig ved sin stive næsten blödpiggede Skjælbedækning adskillelige Art findes udbredt i de østlige Dele af Dep. Oajacas varm-tempererte Region. Jeg fandt den imellem Chuapam og Teotalcingo (4—5000') og imellem Trapiche de la Concepcion og Totontepec (3—5000') voxende i Bjergskove imellem Ericaceer.

Woodsia R. Br.

- 1. Woodsia mollis J. Sm.** Hook. sp. fil. 1. p. 60. *Woodsia mexicana* Br. in Wallich Pl. Asiat. rar. p. 42. *Physematum molle* Kze Anal. Pterid. p. 41. t. 27 (Optima). Ej. Addit. l. c. p. 145.

Hører til den tempererte Region i Mexico og voxer paa fugtige Bjergsider i Klippesprækker.

Jeg fandt den ved Tepitongo i Dep. Oajacas østlige Dele paa henimod 6000'. Schiede sendte den uden Stedangivelse fra Mexico.

- 2. Woodsia fragilis Liebm.** (Subgenus *Perrinia* Hook.):

fronde herbacea utrinque sed imprimis subitus squamuoso-puberulis, elongato-lanceolata, utrinque decrescente 6—10 poll. longa, 1½—2 poll. lata, stipite 1—3 pollicari, pinnato-pinnatifida, pinnis alternis vel suboppositis divergenti-patulisi, ¾—1 poll. longis, 3 lin. latis, ovato-lanceolatis sessilibus basi lato-cuneatis, apice obtusis, pinnatifidis, lacinis ovatis rotundatis repandis, sursum decrescentibus demum confluentibus, sinibus acutis; venis simplicibus vel furcatis antice impressis nigris apice clavato incrassatis; soris seriatis 4—6—8 in quavis lacinia; indusii tenuibus membranaceis fragilibus; stipite rhachique stramineis tenuibus fragilibus pubescensibus basin versus squamis lanceolatis rufis obsitis. Rhizoma subterraneum breve frondes cæspitosas emittens.

Voxer paa skyggefulde Bjergvægge paa sandig Grund imellem Begonier og Selagineller paa 7500' i Nærheden af Sta Maria Alpatlahua paa Siden af Vulkanen Orizaba.

Ved sit skjøre, tidlig i flere uregelmæssige Lapper kløvede Indusium, som udbreder sig som en Rosette omkring Frugtpletten strax gjenkjendt som henhørende til den hookerske Underslægt *Perrinia*. Fra de to Arter, *W. obtusa* Hook. og *incisa* Gill. er denne Art meget

forskjellig. Större Lighed har den i Charaktererne med *W. guatemalensis* Hook. sp. fil. p. 60 t. 21 A, men foruden Indusiets Beskaffenhed adskilles den let ved sit dunet-skjællede betydelig mindre Löv, ved kortere, mindre dybt indskærne Finner o. fl.

Cyatheaceæ.

Trichosorus Liebm.

Polypodium Auct. vet. *Alsophila* Auct. rec.

Sporangia in receptaculo punctiformi impresso ex angulo furcationis venarum orto, sessilia, soros minutos ad basin superiore laciniarum pinnularum singulos formantia cum pilis articulatis interjectis mixta, pilisque costæ adpressis subvelata. Indusium nullum.

Filices amplæ rhizomate perbrevi aut caudice erecto arborescente, frondibus tri-pinnato-pinnatifidis coriacis: — Genus americanum.

Typus for denne Slægt er *Alsophila pruinata* Kaulf., hvilken jeg anseer for en Collectiv-Art, indbefattende et endnu ubestemt Antal Arter. Slægten adskilles fra *Alsophila* ved sit lille punktformige i Lövets Substsants indsænkede Receptaculum (*Alsophila* har et hemisphærisk ophöjet Receptaculm); de siddende Kapsler ere omgivne af rustrøde leddede Haar, og næsten skjulte af de tiltrykte Haar, som bedække Smaafinnernes Middelaare; stive læderagtige blaagrönne underneden hvidlige Löv, hvortil Intet tilsvarende findes hos *Alsophila*. Det er en Gjentagelse af *Polypodium* iblandt Cyatheaceernes Orden.

Af de tidligere Forff. synes allene J. W. Hooker at have erkjendt det mislige i Foreningen af *Als. pruinata* Kaulf. med *Alsophila* Slægten. Hans Ord i Spec. fil. p. 48 ere følgende: In habit and appearance this (*Alsophila pruinata* Kaulf.) is extremely distinct from any other *Alsophila*, and the receptacles are very slightly elevated; so that it must be considered but a doubtful species of the genus.

Der kan ingen Tvil være om, at under Benævnelsen *Alsophila pruinata* flere forskjellige Arter ere indbefattede; thi naar vi sammenligne Beskrivelserne af de hertil henregnede Synonymer, finde vi saa betydelige Forskjelligheder i Angivelserne over Plantens Habitus, at man maa undre sig over, at der intet Hensyn er blevne tagen dertil, men træagtige og urteagtige Planter forenede som Synonymer til en Art. Kunze allene bemærker (Botanische Zeitung 1844 p. 330, og Filic. Leibold. Linnaea v. 18. p. 350) at sandsynligvis flere endnu ikke adskilte Arter her ere forenede.

Det er ikke min Hensigt her at give en Monographie over Slægten, og jeg mangler ogsaa Midler til at oplyse den hele under *Als. pruin.* indbefattede Synonymie. Kun vil jeg meddele et Par Citater af Forff., for at vise, at forskjellige Arter virkelig maa være sammenslagne.

Polypodium cincereum Cav. præl. no 610. p. 248 fra S. Carlos Chiloë har en træagtig Stamme af 5 Fods Höide, 1 Tommes Diameter, hvoraf Opdageren D. Luis Né skar Stokke. Lövet er over 3 Fod langt*).

Alsophila pruinata Kaulf. Hook. sp. fil. p. 48 fra Juan Fernandez har efter Douglas en Stamme af 3—6—8 Fods Höide, hvilken han sammenligner med et lille Granträ.

Swartz Fl. ind. occid. 3. p. 1682 beskriver *Polyp. pruinatum* fra Jamaica som træagtig.

Kunze erklærer (Fil. Poepp. l. c. p. 99 og Fil. Leibd. l. c. p. 350) efter Poeppig og Bayrich, at den i Chile og Brasilien forekommende *Alsophila pruinata* ikke er træagtig.

De forskjellige Former, som jeg har fundet i Mexico mangle ganske træagtig Stamme; Galeottis Angivelse af en 30—35 Fod høi Stamme er falsk. Overseer man nu end ogsaa den sidste Angivelse, som er et sørørligt Exempel paa den hos naturhistoriske Samlere stundom forekommende store Unøigighed, saa ere dog alle de andre saa modstridende, at Enhver vist vil erkjende, at flere forskjellige Arter her ere forenede. For Tiden er det umuligt at afgjøre, hvormange Arter der i de forskjellige Landes Florér ere indbefattede under det ene Navn.

Hvad nu de fra Mexico hidtil omtalte Former angaae, da er den af Dr. Schiede^r fra S. Andres ved den vestlige Fod af Vulkanen Orizaba sendte Plante sandsynligviis henhørende til min *Trich. densus*, efter Localitetens Höide at dömmme. Om Galeottis *Alsophila pruinata* er min *Trich. glaucescens*, er meget tvivlsomt, isæd da den siges at være tagen ved Monte Pacho i Nærheden af Jalapa og ved Totulla, hvor jeg ikke har bemærket *T. glaucescens*. Hr. Galeotti siger om sin Plante saa mange grove Urigtheder, at det er umuligt at sige flere i saa faa Ord: Cette magnifique Fougère arborescente, dont le stipe s'élève à 30 et 35 pieds de hauteur, est fort commune dans la région tempérée.... Elle croit au bord des ruisseaux, dans les endroits les plus sombres de la forêt; il n'y a pas de palmier qui puisse être comparé à cette Fougère, tant elle est remarquable par l'élégance de ses belles frondes, d'un blanc bleuâtre à la face inférieure et d'un beau vert à la face supérieure. Le stipe de cette espèce est épineux, ainsi que le commencement du rhachis des frondes. Det er urigtigt, at Bregnen er træagtig, end sige at den har en Stamme af 30—35 Fods Höide; ligeledes at den voxer i Skovenes dybeste Skygge, den voxer tvertimod paa solaabne Klipper imellem lavt Krat paa Randen af Baranker eller paa disses Vægge; der er ikke den fjerneste Anledning til at anstille Sammenligning imellem denne Bregnes Løv og Palmernes. Det er aldeles falsk at Stipes og Begyndelsen af Rhachis er tornet. Det eneste rigtige i det hele Stykke er Bemærkningen

(*) Esta especie llega á formar un tronco de cinco pies de altura con una pulgada de diámetro, de cuya extremidad nacen las hojas, que tienen mas de tres pies de largo Esta hermosa especie se eria en la isla de San Carlos de Chiloë, donde la encontró D. Luis Né, el qual hizo varios bastones de los troncos que cortó. Cav. Decrip. d. l. pl. Madrid. 1802. p. 248.

om Lövets Farve. Ubegribeligt vilde nu dette være, hvis man ikke kunde ahne følgende Sammenhæng. Hr. Martens har bestemt Galeottis mexicanske Bregner, og Galcotti har dertil nedskrevet sine aphoristiske og geographiske Bemærkninger. Nu er det med denne Alsophila pruinata gaaet saa ulykkeligt, at han har troet at kjende Bregnene, men har taget feil, og derpaa meddelt Bemærkninger, som i Virkeligheden (med Undtagelse af den ene Sætning om Lövets Farve) passer til Alsophila Schiedeana Presl, men knyttede til A. pruinata. Jeg skulde ikke have omtalt dette saa vidtløftigen, hvis det ikke var bleven nødvendigt, idet dygtige Forskere som Hooker og Kunze ere blevne forlede til at fæste Lid til de galeottiske Angivelser, hvorfed Videnskaben bliver forvandsket.

Endelig henhører den af Kunze i Fil. Leibd. l. c. p. 350 omtalte Form til min Trich. glaucescens fra Mexicos østlige Region. Hr. Leibold har meddelt den Urigthed, at Lövet skulde blive 12 Fod langt, medens 6 Fod er det höieste det opnaaer, hvilket jeg med fuldkommen Sikkerhed formaaer at paastaae efter de talrige Exemplarer jeg paa forskellige Steder i Mexico har havt Leilighed til at iagttagte.

1. **Trichosorus glaucescens Liebm.:**

fronde ampla coriacea supra glauco-viridi glabra nitida, subtus glauco-pruinosa ad costam venisque adipesse rufo-villosa, lato-ovata acuminata 4—6 pedali, tripinnato-pinnatisida; pinnis *primariis* patulis alternis remotis petiolatis $1\frac{1}{2}$ —2 pedalibus 8 poll. latis sursum decrescentibus lanceolatis acuminatis; pinnis *secundariis* alternis approximatis subsessilibus 4—6 poll. longis, pollicem latis lanceolatis acutis leviter deflexis; pinnulis alternis sessilibus basi inferiori adnatis, sursum confluentibus, elongato-lanceolatis profunde pinnatifidis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ poll. longis, 2—4 lin. latis; laciniis 5—7 cujusque lateris, falcato-lanceolatis obtusiusculis margine repando subrevolutis, 2— $1\frac{1}{2}$ lin. longis, lineam latis; costa pinnulae, costulis laciniarum, rhachi pinnae secundariae antice elevatis glabris, postice applanatis parum elevatis rufo-villosis, venis subimmersis furcatis subtus adipesse rufo-villosis; soris singulis ad basin superiorem laciniarum; stipite pedali, rhachi universali partialibusque statu juvenili rufo-villosis demum glabris nitidis stramineis subteretibus antice canaliculatis. Rhizoma breve 3—4 poll. supra terram elevatum herbaceo-coriaceum teres squamosum, frondes 4—6 emittens.

Denne Bregne tilhører de østlige Cordillerers tempererte Region imellem 4—5000'; den voxer paa aabne græs- og kratdækte Bjergsider, paa Randen af Baranker og paa disse Vægge. Jeg fandt den ved Talea, Hac. de Sta Gertrudes; imellem Trapiche de la Concepcion og Totontepec, alle Localiteter i Dep. Oajacas østlige Del.

Trichosorus glaucescens var. major: pinnis ultra bipedalibus, pinnis secundariis 6—7 poll. longis 1— $1\frac{1}{2}$ poll. latis, omnibus petiolatis (petiolo semipolicari), longe acuminatis, flexuosis, pinnulis longioribus, pollicem et insuper longis, 3 lin. latis, infimis petiolatis; ceteris sessilibus, laciniis 9—12 cujusque lateris 2 lin. longis, lineam latis minus repandis; soris majoribus.

En baade i det Hele og i alle Enkeltheder större frodigere Form, som voxer ved S. Jago Amatlan Dep. Oajacá (henimod 6000') paa aabne Bjergsider.

2. **Trichosorus densus Liebm.:**

fronde 4—5 pedali coriacea supra flaviciente (alutacea), subtus plumbeo-cinereo rufo-villosa, lato-lanceolata tripinnato-pinnatifida, pinnis *primariis* alternis remotis patulis 20—24 poll. longis, 6—8 poll. latis sursum decrescentibus elongato-lanceolatis acuminatis petiolatis; pinnis *secundariis* alternis approximatis elongato-lanceolatis 4—5 poll. longis, pollicem latis petiolatis, deorsum divergentibus flexuosis vel decurvatis, sursum adscendentibus rectis vel incurvatis; pinnulis valde approximatis alternis $\frac{2}{3}$ poll. longis, 3 lin. latis sessilibus patulis, basi inferiori adnatis recurrentibus, sursum confluentibus, elongato-lanceolatis apice obtusiusculis, profunde pinnatifidis, laciiniis falcato-lanceolatis 2 lin. longis lineam latis obtusis, margine falcato-crenatis revolutis, 8—9 cujusque lateris; costa pinnulae costulisque laciinarum supra elevatis glabris, subtus dense rufo-villosis, rhachi pinnæ secundariæ supra elevata scabrida, marginibus alatis, subtus planiuscula rufo-villosa, rhachi universali pinna-rumque primariarum stramineis postice nitidis glabris convexis, antice canaliculatis rufo-villosis. Rhizoma sicut antecedentia.

Den findes paa lerede aabne græsbegroede Skrænter ved Smaabække imellem buskagtige Baccharis, Prunus laurifolia, Quercus etc. i Nærheden af Indierlandsbyen Chinautla i Dep. Puebla paa 7500'.

Fra den foregaaende Art adskiller denne sig ved sit oven til gullig læderfarvede, nedentil blygraa Löv, mere sammentrangte Finner og Smaafinner, disse sidste noget kortere, mere budte, Fligene flere paa hver Side, i Randen tydelig rundkarvede; de secundære Fimmers Lövaxe vinget. Forresten ere Arterne af denne Slægt vanskelige at adskille med Ord, med mindre man giver meget detaillerede Beskrivelser; i Naturen ere de derimod meget lette at adskille.

3. **Trichosorus frigidus Liebm.:**

fronde coriacea antice flavescente (alutacea), postice cæsio-pruinata, 4 pedali, lato-lanceolata acuminata, tripinnato-pinnatifida; pinnis *primariis* alternis remotis patulis 12—15 poll. longis, 4—6 poll. latis, sursum decrescentibus, lanceolatis, petiolatis; pinnis *secundariis* approximatis alternis vel suboppositis 3—4 poll. longis, pollicem circiter latis, petiolatis, sursum decrescentibus sessilibus, lanceolatis acuminatis acutis deflexis; pinnulis densissime approximatis suboppositis alternisve divergentibus, infimis petiolulatis ceterum sessilibus basi inferiori adnatis recurrentibus, lineari-lanceolatis semipollicem longis, 1½ lin. latis, pinnatifidis, laciiniis 9—10 cujusque lateris falcato-ovatis obtusis margine integris parum revolutis semi-lineam longis latisque; venis subtus conspicuis villo rufo adpresso notatis; soris minutis; costa

pinnulæ costulisque laciniarum antice elevatis glabris, postice rufo-villosis; rhachi pinnæ secundariæ antice elevata scabrida, postice compressa subcanaliculata rufo-villosa (villo linearis ciliato); rhachi universalis primariisque, stipite, rhizoma sicut specierum præcedentium.

Voxer paaaabne Steder i Bjergskove paa Cerro de Sempoaltepec (Dep. Oajaca) i en Höide af imellem 9—10,000 Fod.

Fra foregaaende Art adskiller den sig, idet den i alle Dele er mindre, og mere sammentrængt; Lövets Underflade er mere hvidgraa, Smaafinnerne skjöndt kortere og smallere have flere Flige; disse ere kortere mere afrundede og fuldkommen helrandede; Nerverne ere paa Undersiden synlige med blotte Öine formedelst de tiltrykte rustfarvede Haar; de secundære Finners Lövaxe er paa Undersiden fladtrykt i Midten udhulet, belagt med randharede linieformige tiltrykte Skjæl; Frugtpletterne ere mindre end hos nogen af de foregaaende Arter.

Alsophila R. Br.

1. **Alsophila Schiedeana Presl** Tent Pter. p. 62. Kze Addit. l. c. Hook sp. fil. 1. p. 48. Kze in Bot. Zeit. 1844 p. 342. Polypodium Schlechtd. Lin. 5. p. 609. no. 757.

Denne prægtige træagtige Bregne, hvis Stamme opnaaer 20—25 Fods Höide og 5 Tommers Diameter, er meget udbredt i den subtropiske og varmi-tempererte Region paa Mexicos Østside fra 1500—4500'. Dr. Schiede fandt den først imellem Huitamalco og Cuapam (Dep. Vera Cruz, 2000') Jeg fandt den paa Hac. de Jovo, ved Sta Maria Tlapacoyo, i Baranker ved Mecapalco, Huitamalco; meget almindelig omkring Mirador, Zacuapan, Aguas santas, Dos puentes, S. Antonio Huatusco, ligeledes i Dep. Oajacas østlige Dele, navnlig i Districtet Chinantla.

Den voxer ikkun paa de skyggefuldeste Steder i meget fugtig Humus; i Skovkløfter langs Vandlöb, i dybe Baranker overskygget af store Skovtræer. Saasmart den ved Fældning af de store Træer udsættes for det tropiske Lys, visner den næsten øieblødig.

Hooker anfører i sin Synopsis Arten iblandt de tvivlsomme Arter, idet den nøi-agtige og fuldkommne fyldestgjørende Beskrivelse af Kunze i Addit. l. c. er undgaaet ham. Jeg har ovenfor bemærket, at de af Galeotti under *Alsophila pruinata* meddelte Bemærkninger for største Delen henhøre til denne i Memoiren ikke omtalte Art, der forresten er den almindeligste træagtige Bregne i det østlige tempererte Mexico, danner hele Skovpartier, og altsaa umulig kan undgaae den Reisendes Opmærksomhed.

2. **Alsophila compta Mart.** pl. crypt. sel. Bras. p. 66. t. 41. Hook. sp. fil. 1. 42. Kze in Bot. Zeit. 1844. p. 328.
- Anføres af Hooker som samlet af Linden i Tabasco. Stammen bliver 8—10 Fod höi.

3. **Alsophila mexicana Mart.** pl. crypt. Bras. p. 70. t. 45. Hook. sp. fil. 4. p. 47. Kze in Bot. Zeit. 1844. p. 330.

Samlet af Karwinski i Dep. Oajaca ved S. Pablo Teojomulco. Stammen bliver 15 Fod høj. Skal efter Kunze være beslægtet med *A. hirta* Kaulf.

4. **Alsophila myosuroides Liebm.:**

arborea, fronde ampla subcoriacea elongato-lanceolata, bipinnato-pinnatifida; pinnis alternis patulis petiolatis elongato-lanceolatis acuminatis $1\frac{1}{2}$ —2 pedalibus, pinnulis alternis suboppositive, infimis petiolatibus, sursum sessilibus decrementibus, summis sensim confluentibus, divergentibus 3— $3\frac{1}{2}$ poll. longis, semipollinem lati, elongato-lanceolatis longe-acuminatis acutis profunde pinnatifidis, laciiniis e basi dilatato lineari-lanceolatis falcatis obtusiusculis falcato-crenulatis, margine parum revolutis, sinibus acutis angulatis; apice pinnularum contracto $\frac{1}{2}$ —1 pollicari 1—2 lineas lato crenato; costa costulisque utrinque elevatis, costa utrinque pilis adpressis obsita, costulis antice glabris postice parce pilosis, venulis furcatis glabris; soris numerosis, 10—14 cujusque laciinæ, seriatis densis, mox confluentibus; stipite pedali pollinem crasso flavescente fulvo-piloso aculeolato, aculeis rectis inaequalibus instructo; rhachi universali 4—5 pedali dorso convexa, antice et lateribus sulcata, basi aculeolata sursum incruci fulvo-pilosa, partialibus inermibus fulvo-pilosis sursum marginatis et subalatis.

Caudex 10—16 pedalibus erectus gracilis, 3—4 pollices in diametro squamosus apice aculeatus, aculeis flavidis.

Denne prægtige træagtige Bregne voxer i tykke fugtige Urskove i Chinantlas subtropiske Region ved Locaba, Jocotepec og Teotalcingo, 2—4000'.

Den staer nærmest til *A. armata* Presl; adskiller sig ved noget mindre Torne paa Lövstilklen og Lövaxen, Lövet underneden glat med Undtagelse af Middelnerven, ingen Skjæl paa Lövets Underside; Smaafinnerne pludselig udtrukne i en lang smal kærvet Spids af indtil en Tommes Længde.

Hemitelia R. Br.

1. **Hemitelia decurrens Liebm.:**

fronde herbacea ovato-lanceolata 2½ pedali, 8—9 poll. lata, stipite pedali, pinnata apice confluente, pinnis suboppositis alternisve sub 20 cujusque lateris sessilibus decurrentibus patulis, elongato-lanceolatis parum falcatis 5—6 poll. longis, pollinem lati, basi oblique cuneatis, apice acutis, margine remote crenatis utrinque glabris, supra atrovirentibus nitidis, subtus glaucentibus, venis utrinque prominulis pinnatis, infimis arcuatis anastomosantibus, ceteris excurrentibus liberis; soris biserialibus zonam medium inter marginem et costam

formantibus dorso venulae adfixis; rhachi stipiteque arachnoideo-pubescentibus compressis antice sulcatis marginibus membranaceis alatis, squamis tenuibus excoloribus falcatis adspersis, stipite basin versus aculeolis brevibus squamisque latioribus rigidioribus brunneis marginatis instructo. Caudex vix pedalis.

Af Slægten *Hemitelia* var hidtil ingen Art funden paa Americas Fastland, N. for Panamá, det vil derfor være af Interesse at lære at kjende to nye mexicanske Arter. Begge have en meget lav næsten urteagtig Stamme.

H. decurrens voxer i de hede fugtige Skove i Chinantla ved Lobani (3—3500') i Dep. Oajaca; man finder den i Selskab med lave Palmer, *Geonomia*, *Chamædorea*, *Stachyophorbe*.

I blandt de beskrevne Arter er der ingen der staarer den nærmere end *H. speciosa* Hook. i Henseende til Finnernes Form, men meget forskjellig i Henseende til Nervation, Frugtpletternes Plads o. fl. a.

2. *Hemitelia mexicana* Liebm.:

fronde ampla 5—6 pedali, $1\frac{1}{2}$ ped. lata, stipite $1\frac{1}{2}$ pedali, glabra, supra atrovirente nitida, subtus glauco-virente, lato-lanceolata acuminata pinnata, pinnis alternis deorsum divergentibus, pedalibus pollicemque circiter latis, linear-lanceolatis acuminatis acutis sub-pinnatifidis vel grosse crenatis apicem versus confluentibus argute serrulatis, crenis lineam longis 3 lin. latis rotundato-truncatis, margine parum revolutis, costa utrinque elevata, antice canaliculata, postice convexa nuda, venis utrinque prominulis pinnatis, infimis transversis anastomosantibus, reliquis excurrentibus liberis; soris 2—3 seriatis dorso venularum affixis inter marginem et costam mediis, receptaculis capitellatis, indusiis orbiculatis demum expansis; stipite rhachique squamulosis demum glabrescentibus, basin versus minutissime aculeolatis. Caudex pedalis herbaceus squamosus.

Voxer i de skyggefylde fugtige hede Skove omkring Lacoba i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca (2500'). Den findes i Selskab med *Cyatheer*, *Alsophiler*, *Desmoneus*, *Astrocaryum*.

Af de beskrevne Former nærmer den sig mest til *H. obtusa* Kaulf.

Cyathea Sw.

1. ***Cyathea mexicana* Schlechtdl.** Lin. 5. p. 616. Presl Tent. Pter. t. 1. f. 8. Mart. & Gal. L. c. p. 79. Hook. sp. fil. 4. p. 45. *Cyathea denudans* Kze fil. Leibd. L. c. p. 349.

Den er unaegtelig den prægtigste af Mexicos træagtige Bregner, og meget udbredt

i den østlige Region imellem 3—4000 Fods Höide. Den optræder omrent samtidig med de immergrønne Ege, og voxer især paa meget fugtige skyggefulde Steder i Skovkløfter og Baranker. Jeg har samlet den ved Mirador, Totulta, Dos Puentes, Aguas santas, Malalucia, Jalapa. Schiede sendte den fra Jalapa; Galeotti fandt den ved Jalapa og Totulta.

Uagtet denne Art allerede har været nöiagtig beskrevet af Schlechtendal siden 1830, synes den dog endnu ikkun at være ufuldkommen kjendt. Presl opstillede først en Underslägt Notocarpia med Sori befastede paa Midten af en Nerve, og til første Afdeling af denne Underslägt: *venis simplicibus, superioribus sæpe furcatis henførtes som eneste Art C. mexicana*. Hooker sp. fil. opstiller den i Afdelingen *Notocarpia**, og Kunze fil. Leibd. antager samme Inddelingsmaade. Da jeg har havt Leilighed til at jagttagte Hundreder af Exemplarer af denne Art, og i mine hjembragte Samlinger har det rigeste Materiale til Undersögelse, maa jeg gjøre Indsigelse herimod. *C. mexicana* har baade enkelte og klöftede Nerver, det sidste langt hyppigere end det første; nogle Smaafinner har udelukkende klöftede Nerver, andre ikkun enkelte, andre blandede enkelte og klöftede. Frugtpletterne kunne sidde paa en udelt Nerve, men de sidde hyppigst i selve Klöftningens Vinkel, og Arten kan saaledes ikke höre til *Notocarpia* men til *Eucyathea*. Jeg finder derfor ingen Grund til at antage *C. denudans* Kze som Art; Beskrivelsen af den eneste Finne Forf. har havt til Disposition passer meget godt paa *C. mexicana*. Hooker kalder fremdeles Planten tornlös (unarmed), uagtet Schlechtendal beskriver den som tornet. Formodentlig har denne Uoverensstemmelse sin Grund i de ufuldstændige Exemplarer, som sædvanlig af Samlere hjemsendes af disse store Former, og som især har givet Anledning til at de störste, skjönneste, og i Henseende til den Rolle, de spille i Landskabet, vigtigste Former ere de slettest kjendte. Forholdet hos *C. mexicana* er følgende. Den överste Del af Stammen er forsynet med skarpe rette eller noget krummede sorte glindsende Torne, som ligeledes findes i stort Antal uden Orden paa den nederste Del af Stipes, tabende sig opadtil i Rhachis, blivende mindre og mindre. Rhachis paa de nederste Finner er ofte paa Undersiden fintornet; de øvrige Finner, ligesom ogsaa den øvre Deel af Hovedrhachis er tornlös.

2. Cyathea Schanschin Mart. pl. crypt. Bras. p. 77. t. 54. Hook. sp. fil. 1. p. 20. *C. mexicana* Hook. in Benth. pl. Hartweg. p. 54. *C. mex. affin.* Mart. &

*). Det er ikke meget conseqvent af Hooker, at antage *Notocarpia* som Underslägt, definere den saaledes: *Sori situated upon a vein or veinlet, not at the forking*, og dog henhøre dertil *C. mexicana*, hvorom han siger: *sori confined to the lower half of the segment, situated upon the veins, which are almost wholly simple or below the fork when divided, very rarely indeed at the forking*. Den sidste Sætning viser det indifferente i Frugtpletternes Insertion, og kuldkaster Underslägten *Notocarpia*.

Gal. l. c. p. 80. *Alsophila fulva* Mart. & Gal. l. c. p. 78 t. 23 (mala!) sec. Hook.

Samlet af Galeotti i Fyrreskove ved Talea (5—6000') i Dep. Oajaca. Hartweg sendte den fra Zucualtipan. Mig ubekjendt.

Da det er at formode, at Hooker har havt Galeottiske Exemplarer for sig, idet han henførte de ovenciterede Synonymer til C. Schanschin, vil jeg afholde mig fra Ytringer om det Ubegrivelige i, at en Forf. kan anføre den samme Plante som to Arter under to forskjellige Slægter, tillægge den ene (*Alsophila fulva*) en Stamme af 18—20, ja selv 25—30 Fods Höide, medens den anden (*Cyathea mex. affin.*) tillægges en Stamme af 15—20 Fods Höide. Ret heldigt er det imidlertid, at det hedder om den sidste: Cette grande Fougère se trouve avec l'*Alsophila fulva* au bords des ruisseaux etc., thi hine Angivelser, som aabenbart ere skrevne paa Maa og Faa, kunde ligesaa godt have indeholdt end mere skrigende Uoverenstemmelser.

3. *Cyathea bicrenata* Liebm.:

arborea, fronde 10—15 pedali coriacea, antice atroviridi, postice olivacea elongato-lanceolata bipinnato-pinnatifida, pinnis alternis subsessilibus patulis vel divergentibus elongato-lanceolatis bipedalibus et insuper, 7—8 poll. latis, sursum crescentibus sessilibus minus compositis; pinnulis suboppositis alternisve sessilibus infimis divaricatis, mediis divergentibus sursum patulis, circiter 70—80 in quavis pinna, elongato-lanceolatis longe-acuminatis 4 circiter poll. longis semipollicem latis, profunde pinnatifidis, laciinis (circ. 30 ejusque lateris e basi latiori falcato-lanceolatis acutiusculis marginibus revolutis grosse rotundato-crenatis, crenaturis bidentatis, sinibus amplis obtusis angulatis; costa pinnularum antice pilis griseis arachnoideis adpressis, postice pilis griseis longis patulis strigosis obsita; costulis laciinarum utrinque prominulis, postice strigosis, venulis impressis furcatis, superficie anteriori laciinarum bullato-inflata; soris numerosis usque ad apicem laciinarum 12—16, indusii tenuissime membranaceis hyalinis operculiformibus deciduis, receptaculis capitellatis prominentibus; rhachi pinnarum subquadrangula, antice canaliculata sulcata, postice convexa scabra pilosa, stipite 1—2 pedali pollice crassiori scabrida.

Caudex 30—35 pedalibus, gracilis squamosus, coma eleganter infundibuliformi terminatus.

Species e vecinitate Cyath. Serræ Willd., sed ab hac omnibusque adhuc notis speciebus satis differt crenaturis bidentatis laciinarum.

Den voxer i Bjergskoven imellem Trapiche de la Concepcion og Totontepet i Dep. Oajaca paa henimod 5—5500 Fods Höide. Efter et beskadiget Exemplar, som findes i mit Herbarium, forekommer den ogsaa i Omegnen af Chinaulta i Dep. Puebla paa 6500—7000', og er saaledes den i Mexico höiest gaaende træagtige Bregneform.

Af alle Mexicos træagtige Bregnere bærer denne sin anseelige Krone paa den smuk-

keste Maade, idet Lövet først hæver sig i Veiret, og derpaa böier sig jevnt ud i en elegant Bue. Den höie slanke, 3—4 Tommer tykke Stamme indeholder en stor Mængde Meel og Sukker i sit Indre, men Indianerne benytte det ikke.

Parkerieæ.

Parkeria Hook.

1. *Parkeria pteroides* Hook & Grev. ic. fil. t. 97.

Hidtil var denne Art ikkun kjendt fra Gujanas stillestaende Vande; den er imidlertid udbredt baade paa Mexicos østlige og vestlige Side, indskrænket til den egentlige tropiske Kystflora. Den voxer deels i stillestaende Vand, dels i rindende Vand. Jeg fandt den først sparsom i Sumpe imellem Morro de Boquilla og Rancho nuevo paa Mexicos Østkyst i Dep. Vera Cruz imellem Vera Cruz og Colipa; senere fandt jeg den langt hyppigere i rindende Vand paa Hacienda de Sta Cruz, 5 Leguas N. for Tehuantepec (Dep. Oajaca) paa Mexicos Vestside.

Mine talige Exemplarer ligne meget godt Afsildningen i Hook. & Grev ic. fil., kun findes ikke den omtalte Bulbildannelse, eller den derfra udskydende Prolification hos min Plante.

Hymenophylleæ.

Hymenophyllum Sw.

1. *Hymenophyllum asplenoides* Sw. syn. fil. p. 145. Hedw. fil. c. icon. Hook. sp. fil. 1. p. 87. Presl Hymenophyll. p. 32. Kze bot. Zeitg. 1847. p. 485.

Denne i Mexico ei för fundne Art opdagede jeg i Baranca de Huitamalco (2500'), voxende paa gamle Træstammer, og dette er det eneste Sted, hvor jeg har seet den. Den er tidligere kjendt fra Jamaica, Gujana og Brasilien.

2. *Hymenophyllum brevitipes* Liebm.:

fronde subcoriacea glabra $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ poll. longa, semipollicem lata, stipite 1—2 lineas longa, fusca subflabellata vel lato-cordato-lanceolata obtusa bipinnatifida, partitionibus primariis alternis patulis dichotomis, basi alato-decurrentibus; laciniis linearibus integerrimis repandulis apice retusis obtusis; involucris rhombeis cuneatis subimmersis bilabiatis compressis, labiis semiovatis margine crispatis; stipite tenui brevi nigro alato; candice filiformi repente (6—12 poll. longo) ramoso, sparsim radiculoso et frondifero.

E. vicinia Hym. abrupti Hook.; differt: fronde basi latiori, bipinnatifida, laciniis dichotomis, indusiis semiovatis margine crispatis, receptaculis inclusis, stipite breviori alato.

Denne nye Art har jeg fundet temmelig udbredt i Mexico i den subtropiske og tempererte Region paa Østsiden fra 2000—5000', voxende saavel paa Barken af gamle Træer i Skove, som paa fugtige Klipper. Jeg fandt den ved S. Pedro Tepinapa (2000') i Oajaca; ved Teotalcingo (5000') i Chinantla, ved Mirador (3000'), ved S. Antonio Huatusco (4500').

- 3. *Hymenophyllum fucoides* Sw.** Hedw. fil. c. icon. Hook. sp. fil. 1. p. 100.
Schlechtdl. Lin. 5. p. 619. Kze in bot. Zeitg. 1847. p. 226. *Leptocionium fucoides* Presl Hym. p. 27.

Schlechtendal anfører denne Art som samlet af Dr. Schiede i den tempererte Region paa Cuesta grande de Jalacingo, voxende paa Trærernes Bark, og Hooker anfører Mexico iblandt Artens Voxesteder, men sætter Kunze istedetfor Schiede som Autoritet.

Kunze henfører (Fil Leibd. I. c. p. 352) den schiedeske Plante iblandt Synonymerne til *H. polyanthos*; derimod gjør han ingen Indvendinger imod Hookers Angivelse af Mexico (Bot. Zeit. 1847. p. 226). Der synes saaledes at kunne være nogen Tvivl om den ægte swartziske Plante findes i Mexico eller ei. Jeg antager imidlertid at den hører hjemme der, saameget mere, som jeg har fundet en Form, hvilken jeg ikke overer at adskille fra *H. fucoides*, og som kun adskiller sig ved sin Lidenhed og Glathed:

Hym. fucoides var. frigida Liebm.: forma pusilla 1½—2 pollicaris, glaberrima, laciiniis angustioribus, rhachi alata.

Voxer paa Cerro de Sempoaltepec i Dep. Oajaca i 8—9000 Fods Höide paa Egesstammer i Bjergskoven.

- 4. *Hymenophyllum undulatum* Sw.** Hedw. fil. c. ic. Hook. sp. fil. 1. p. 105.
Schlechtdl. Lin. 5. p. 619.

Særdeles hyppig i den østlige tempererte Region paa 4500', og deraf stigende ned til 2500', hvor den er meget sparsom. Den overvæver Egenes Stammer med sine krybende Stængler, hvorfra det smukke krusede Löv hænger ned. Jeg fandt den især i Omegnen af S. Antonio Huatusco; sparsom i Potrero de Consoquitla ved Mirador, og imellem Lobani og Petlapa i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Jalacingo.

- 5. *Hymenophyllum polyanthos* Sw.** Hedw. fil. c. ic. Hook. sp. fil. 1. p. 106.
Kze bot. Zeit. 1847. p. 243. Kze fil. Leibd. I. c. p. 352. *H. jalapense* Schlechtdl. Lin. 5. p. 619. Mart. & Gal. I. c. p. 81.

Udbredt i den østlige varm-tempererte Region imellem 3—4000', voxende i Skove

paa Træernes Bark. Jeg fandt den ved Mirador, Chistla, St. Antonio Huatusco, og i Skoven ved en lille Fjeldsø ikke langt fra Talea i Dep. Oajaca (5–5500'). Schiede fandt den ved Jalapa, Galeotti ved Jalapa, Mirador og Zazuapan.

Den meget foranderlige Art opfatter jeg omtrent efter Hookers Begrænsning, da et rigt Materiale har overbevist mig om det mislige i at adskille de Former, som Hooker efter min Mening med Rette har forenet herunder.

6. *Hymenophyllum Millefolium* Schlechtd. Lin. 5. p. 620. Kze in bot. Zeit. 1847. p. 244. H. polyanthos Presl. Hym. p.

I den østlige varm-tempererte Region paa Træernes Bark. Schiede fandt den paa Cuesta grande del Jalacingo; jeg i Skoven om Mirador.

Skjøndt de nyere Bregnekjendere ere tilbøjelige til at anse den som Form, antager jeg den dog med Forf. som egen Art.

7. *Hymenophyllum nigrescens* Liebm.:

fronde coriacea glabra nigrescente 5–6 poll. longa, pollicem lata, stipite 1–3 poll. longa, elongata bi-tripinnatisecta, partitionibus primariis et secundariis alternis patulis involutus linearibus, lacinii linearibus apice emarginatis; indusiis ad apices laciniarum illisque latioribus non immersis bivalvibus compressis rotundatis marginatis apice subtus, receptaculo inclusu; stipite rhachique alatis; caudice filiformi flexuoso repente irregulariter ramoso sparsim frondifero.

Voxer paa trachytiske og basaltitiske Vægge af Barankerne omkring Chinautla i Dep. Puebla (7000').

Af alle mig bekjendte Hymenophyller har denne Art det tykkeste og fasteste Löv, hvorfor den i tør Tilstand er meget sprød. Lövets Fasthed har megen Overensstemmelse med Davallia, men i anatomisk Henseende er den en ægte Hymenophyllum ved sit enkelte Cellelag.

8. *Hymenophyllum ciliatum* Sw. Hedw. fil. c. ic. (optimal) Hook. sp. fil. 1. p. 88. Hook. & Grev. ic. fil. t. 35. Schlechtd. Lin. 5. p. 619. no. 809.

Hyppig i den tempererte Region paa Østsiden imellem 2–5000', voxende i Skove paa Træstammer. Jeg fandt den paa Hacienda de Jovo, ved Jalapa, og i Dep. Oajaca ved Teotalcingo. Schiede fandt den ved Jalacingo paa skyggefude Klipper.

Mine Exemplarer stemme paa det fuldkomneste med Afbildungen hos Hedwig, som Kunze ikke har kjendt. Det er mig ubekjendt af hvad Grund Kunze henfører Schlechtdals ovenciterede Nr. 809 til H. lineare Sw. jvnfr. Kunze Lin. 18. p. 352. Et Original-Exemplar af H. lineare Sw. i Vahls Herbarium er væsentlig forskjellig fra H. ciliatum.

Hym. ciliatum Sw. var. nudipes Kze fil. Leibd. l. c. p. 351. Hym. affin. ciliato Schlechtd. Lin. 5. p. 619. no. 810. Kze in bot. Zeit. 1847. p. 186. Sphaerocionium Schiedeanum Presl Hym. p. 34 og 60.

Allerede tilstede iblandt Ruiz og Pavon's mexicanske Planter uden Localangivelse; fandtes af Schiede paa Cuesta grande de Jalacingo; i Leibolds Samling er den betegnet som voxende paa Træer i temp. Region; jeg fandt den paa Ege ved Mirador.

Ved uvinget Stilk, og udelte sjeldnere stjernedelte Randhaar adskilt fra foregaaende; Lövet er desuden længere, smallere, meget mere tilspidset, Indskæringerne mere fjern-staaende. Muligen er den egen Art.

- 9. *Hymenophyllum hirtellum* Sw.** sp. fil. p. 149. Hook. sp. fil. 1. p. 90. t. 34 D.
Kze in bot. Zeitg. 1847. p. 198. *Sphærocionium hirtellum* Presl.

Denne hidtil kun paa Jamaica fundne Bregne er almindelig i de varme fugtige Skove i Chinantla paa gamle Træer; jeg fandt den saaledes ved Petlapa, Lobani; ligeledes i den tempererte Regions Skove imellem Tonaguia og Roayaga (5000') i Districtet Villa alta.

10. *Hymenophyllum trapezoidale* Liebm.:

fronde tenuissime membranacea obscure olivacea, 4–6 poll. longa, pollicem lata, stipite 1–2 pollicari, elongato-lanceolata acuminata pinnato-pinnatifida, pinnis alternis patulis trapezoidalibus rhomboidalibusve, basi cuneatis sessilibus parum adhatis, basi superiori truncatis, margine inferiori integro recto, anteriori et superiori pinnatifido-incisis, incisuris bifidis aut bis bifidis, lacinii brevibus linearibus apice obtusis retusis emarginatisve, margine obsolete denticulatis stellato-pilosus, venis nigris repetitive dichotomis utrinque stellato-pilosus; indusiis ad apicem laciniarum basi cuneata immersis compressis bivalvibus, valvis rotundatis margine rufo-stellato-pilosus, receptaculis inclusis; stipite rhachique filiformibus teretibus pilosis nigris, rhachi sursum alata; caudice horizontali repente sparsim frondifero filiformi rufo-piloso.

Species affinis H. Plumieri Hook., sed diversa.

Hører til Mexicos höiere Cordillere-Regioner, voxende paa Stammerne af Ege- og Fyrretræer i Omegnen af Chiautla Dep. Puebla (7–7500').

- 11. *Hymenophyllum pulchellum* Schlechtd.** Lin. 5. p. 618. Hook. sp. fil. 1. p. 91. (t. 33 A?) Kze in bot. Zeitg. 1847. p. 199. Kze fil. Leibd. l. c. p. 351.

Schiede fandt den paa skyggefulde Klipper ved Jalacingo; Leibold paa Træer i den tempererte Region.

- 12. *Hymenophyllum plumosum* Kaulf.** en. p. 267. Kze bot. Zeit. 1847. p. 200.
H. sericeum Hook. sp. fil. 1. p. 92. (pro parte, excl. excludend.) *Sphærocionium aureum* Presl. Hym. p. 57.

Udbredt i Mexicos østlige tempererte Region fra 2–4500', voxende selskabeligen

paa Træernes Bark. Jeg har fundet den i Mængde ved S. Antonio Huatusco, Matlaluca Chistla ved Mirador, S. Pedro Tepinapa i Chinantla (Dep. Oajaca).

Kunze nævner den (l. c.) som mexicansk, men angiver ikke Kilden.

I Reliquia Hænkeana anfører Presl *Hymenophyllum cruentum* Cav. og *H. pectinatum* Cav. som samlede af Hænke i det vestlige Mexico, dog uden Localitets Angivelse. I hans nyeste Monographie over *Hymenophylleæ* vedbliver han at nævne Mexico som Fædreland for begge Arter. Cavanilles har beskrevet begge sine Arter efter Exemplarer samlede af Luis Née paa S. Carlos Chiloë, og det er sandsynligt at de to Hænkeske Bregner ere samme stedsfra, hvorimod den mexicanske Localitet er i høieste Grad usandsynlig. Hooker nævner i Spec. fil. ogsaa ikkun Chiloë som disse Arters Fædreland, og omtaler slet ikke Mexico. Jeg deler ganske denne Anskuelse.

Trichomanes Sw.

1. ***Trichomanes reptans* Sw.** fl. ind. occid. 3. p. 1727. (non Hook. & Grev. ic. fil. t. 32). Hook. sp. fil. 1. p. 116. (excl. excludend.) Kze fil. Leibd. l. c. p. 351. Kze bot. Zeitg. 1847. p. 278. *T. quercifolium* Hook. & Grev. ic. fil. t. 115! Hook. sp. fil. 1. p. 120.

Denne gamle bekjedte, men i den nyere Tid især af de engelske Botanikere miskjendte Art, som ved Kunzes Critik er blevet befriet for alt uvedkommende, er meget almindelig i Mexicos østlige varm-tempererte Region, voxende i skyggefulte Skove paa Træernes Bark eller paa fugtige Stene imellem Mos. Jeg fandt den yderst almindelig omkring Mirador, Aguas santas, S. Antonio Huatusco, i Baranca de Huitamalco, ved Teotacingo i Chinantla, imellem Tonaguia og Roayaga i Districtet Villa alta.

Mine rige Udviklingsrækker sætte det udenfor al Tvivl, at *T. quercifolium* ikkun er en kraftig Form af denne Art, hvilken Mening Kunze allerede tidligere havde antydet.

2. ***Trichomanes sinuosum* Rich.** Hook. & Grev. ic. fil. t. 13. Hook. sp. fil. 1. p. 120. Kze Farrnk. p. 183. t. 77. f. 1.

Hidtil ikke kjendt fra Mexico, men ingenlunde sjeldent paa Østsiden i den tropiske og subtropiske Region imellem 1500—3000'. Den voxer paa de fugtigste og skyggefulteste Steder i Skove og Baranker paa Træernes Bark; især er den hyppig paa Stammerne af træagtige Cyatheer og Alsophila. Jeg fandt den paa Hac. de Jovo i Baranken ved Arroyo de Isapa, og i Baranker omkring Mirador.

3. ***Trichomanes pellucens* Kze** fil. Poep. l. c. p. 104. Kze. Farrnk. p. 158 t. 68. Hook. sp. fil. 1. p. 131. (*Achomanes Pr.*) Kze in bot. Zeit. 1847. p. 372.

Hidtil kun kjendt fra Peru og Guiana. Jeg fandt den i Chinantla, Dep. Oajaca ved Indierlandsbyen Teotacingo, voxende i stor Mængde paa et Leerdige omkring Kirken.

Hooker anseer den for en Form af *T. crispum* L; Kunze forsvarer sine Anskuelser, og adskiller 5 Arter, som Hooker vil forene. Jeg maa bemærke, at Planten er noget variabel, idet jeg har frugtbærende Exemplarer, som ikke ere fingerlange, og andre, som ere fodlange, hvilke have voxet imellem hverandre. De smaae ere stærkere haarede, Lövels Flige fortil indslagne, Lövet indbøjet mod Spidsen — kort ligner ganske *Trich. pilosum* Raddi, som Kunze vil have anset for en god Art. De større Individer ligne til Punkt og Prikke Afbildningen i Kunzes *Farrnkräuter*. Efter disse Kjendsgjerninger er jeg ikke utilbøjelig til med Hooker at udvide Artsbegrebet for *T. crispum* L.

- 4. *Trichomanes pyxidiferum* L.** Hook. & Grev. ic. fil. t. 206. Hook. sp. fil. 1. p. 124. Schlechtd. Lin. 5. p. 618. Kze fil. Leibd. l. c. p. 317. Kze in bot. Zeit. 1847. p. 329.

Meget almindelig i de hede og varm-tempererte Skove paa Mexicos Østside imellem 1000—4500', voxende paa Træer og fugtige Stene, hvilke den ganske overvæver med sine krybende Stængler. Jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Hac. de Jovo, Huitamalco, Mirador. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco.

- 5. *Trichomanes rigidum* Sw.** fl. ind. occid. 3. p. 1738. Hedw. fil. c. icon. (*Pachychatium* Pr.) Hook. sp. fil. 1. p. 133. Kze. in bot. Zeit. 1847. p. 402.

Denne i Asien, Africa, Australien og America udbredte Bregne var ikke tidligere kjendt fra Mexico; jeg fandt den i Chinantla (Dep. Oajaca) i Bjergskove ved S. Pedro Tepinapa (2500') og ved Teotalingo (4500—5000'), voxende paa Leerjord og gamle forraadne omstyrtede Stammer.

- 6. *Trichomanes trichoideum* Sw.** Hook. & Grev. ic. fil. t. 199. Schlechtd. Lin. 5. p. 618. Mart. & Gal. l. c. p. 81. Kze fil. Leibd. l. c. p. 351. Kze bot. Zeit. 1837. p. 438. *T. pyxidiferum* Schk. crypt. t. 134.

Meget almindelig i den subtropiske og tempererte Region paa de mexicanske Cordillerers Østside, voxende paa Træernes Bark i de skyggefuldeste fugtige Skove. Især er den hyppig paa Stammer af traagtige Bregner. Jeg fandt den paa Hac. de Jovo, i Baranca de Huitamalco, ved Mirador, S. Antonio Huatusco (en lille neppe tommelang Form); i Bjergskovene imellem Tonaguia og Tepitongo Dep. Oajaca (5—5500'). Schiede fandt den ved Jalapa, Galeotti sammesteds.

- 7. *Trichomanes scandens* L.** Mart. & Gal. l. c. p. 81. *T. radicans* Schlechtd. Lin. 5. p. 618.

Almindelig i den subtropiske og tempererte Region paa Østsiden, hvor den voxer krybende, men ikke slyngende, paa Træernes Stammer, og opnaaer en Længde af indtil en Favn.

Jeg fandt den i Skove ved Huitamalco, Mirador, Jocotepec i Chinantla. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco, Galeotti ved Jalapa.

Den linneiske Plante har været meget miskjendt, er idelig blevet forvexlet, spaltet i mange Arter. Man sammenligne herom Hooker sp. fil. under Artiklerne *T. radicans*, *Kunzeanum* og *scandens*, og Kunzes critiske Bemærkninger i bot. Zeit. 1817 under samme Numere. At alle de i Mexico forekommende Former, som have været omtalte snart under Navn af *T. radicans*, snart som *T. scandens* virkelig hører til den ægte linneiske *T. scandens*, derom er jeg ved Hundreder af Exemplarer fra forskellige Localiteter blevet fuldkommen overtydet. At Navnet er upassende, da Planten ikke er slyngende, har allerede Kunze gjort opmærksom paa.

- 8. *Trichomanes (Neurophyllum Pr.) pennatum Kaulf.*** en. p. 264. Kze in bot. Zeit. 1847. p. 351. *T. floribundum* Hook. & Grev. ic. fil. t. 9. Hook. sp. fil. 1. p. 129. (excl. syn.) *Neurophyllum pennatum* Presl.

Ikke før kjendt fra Mexico. Den voxer i Bjergskoven over S. Pedro Tepinapa i Districtet Chinantla Dep. Oajaca (2000'), paa leret Jordbund i Selskab med *T. rigidum* Sw., og forekommer i meget stort Antal.

Gleicheniaceæ R. Br.

Mertensia Willd.

* stipite furcato, ramis bipinnatis vel pinnato-pinnatifidis.

- 1. *Mertensia Baneroftii. Hooker* sp. fil. 1. p. 5. t. 4 A. (sub Gleichenia) Kze fil. Leibd. l. c. p. 307.**

I Mexicos tempererte Region paa henimod 4000 Fods Höide. Jeg fandt den paa bratte Leervægge ved en Huulvei, som fører ned til Dos puentes imellem Totutla og Huatusco, voxende selskabelig i store Masser. Formodentlig er det sammesteds at Leibold har fundet den. Ligeledes fandt jeg den i Baranken ved Tomatlan imellem Huatusco og Byen Orizaba.

Hookers alt for korte Beskrivelse passer godt paa vor Plante; kun er Udtrykket rhachis with a very acute margin ikke tilstrækkeligt tydeligt. Baade den 2—3 Fod lange Stipes og Grenenes over 3 Fod lange Rachis ere forsynede med en skarp nedløbende Ribbe paa hver Side.

* * stipite trichotomo, ramis furcatis pinnatifidis.

- 2. *Mertensia gleichenioides Liebm.*:**

fronde coriacea erecta 1—1½ pedali bis-ter trichotomo-ramosa, ramis oppositis patulis bifur-

catis gemmā abortiva rufo-squamosa interjecta, pinnis 7—12 poll. longis 2 lineas latis lineariis flexuosis obtusiusculis modo crenato-pinnatifidis, laciinis subhorizontalibus 1½ lin. longis latisque lato-lanceolatis acutiusculis obtusive margine reflexis, modo tantum rotundato-repandis, margine cucullato-reflexis, pagina anteriori leviter bullato-convexa; stipite rhachique universalis pennam passerinam crassis teretibus nitidis fuscis villo cano-rufo detergibili obsitis, stipite basin versus squamis castaneis lanceolatis adpressis tecto, rhachibus secundariis subpollicaribus marginatis laciinis obsoletis 2—3 decurrentibus latere superiori notatis, costa utrinque convexa straminea antice glabra, postice rufo-villosa, venis e costa excurrentibus utrinque prominulis patulis bis-ter furcatis, pagina anteriori olivaceo-viridi glabra, posteriori tota rufo-villosa; soris minutis rufis e sporangii 2—3 compositis angulo infimo furcationum venarum costae approximatis affixis. Rhizoma horizontale flexuosum pennam corvinam crassum squamis rigidis castaneis ciliatis adpressis obsitum.

Denne mærkelige Art fandt jeg ikkun en Gang i den hede østlige Region i Dep. Vera Cruz i Nærheden af Cuapa, voxende paaaabne Sider af en Hulvei i leerblandet Sand.

Af de hidtil beskrevne Arter veed jeg ingen at sammenligne den med, og den staer saaledes ganske afsondret, mærkelig ved sin Lighed med en Gleichenia. Skjöndt den er meget afgivende fra M. revoluta H.B.K., bliver den dog at indordne ved Siden af samme.

* * fronde dichotoma pinnatifida.

3. Mertensia pubescens Willd. Hook. & Grev. ic. fil. t. 15. Hook. sp. fil. 1. p. 8. (ex parte) sub Gleichenia. Kze fil. Leibd. l. c. p. 307. M. tomentosa Mart. & Gal. l. c. p. 16.

I den subtropiske og tempererte Region imellem 2000—5000', voxende i Randen af Skove eller paaabne Bjergsider. Jeg fandt den ved Lacoba i Chinantla, og ved Huitamalco i Dep. Vera Cruz. Galeotti angiver den fra Chuapan og Villa alta i Dep. Oajaca.

4. Mertensia furcata Willd. Act. holm. 1804. p. 166. Sp. pl. 5. p. 71. Petiv. fil. t. 5. f. 4. Schlecht. Lin. 5. p. 620. Klotzsch. Lin. 18. p. 537.

Paa lerede Bakker og abne Steder i Skove i den tempererte østlige Region (3500—6000'). Jeg fandt den især hyppig i Omegnen af S. Antonio Huatusco; fremdeles ved Aguas santas, imellem Huitamalco og Tiutzulan (6000'). Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco; C. Ehrenberg ved Jalapa.

Hooker henfører denne Art som Var. glabra til den foregaende, men jeg kan ikke tiltræde denne Mening. Den er i alle Dele mindre, Fligene kortere smallere spidsere, Middelaaren ved Grundens belagt med tiltrykte rustrøde Skjel, forresten glat.

5. Mertensia Mathewsi Hook. sp. fil. 1. p. 9. t. 7. B. (sub Gleichenia) M. furcata Mart. & Gal. l. c. p. 17. sec. Hook.

Hører til Central-Cordillerernes höiere Regioner imellem 7—9000'. Jeg fandt den paa Cerro de Sempaltepec i Dep. Oajaca (9000'), voxende paaabne Steder i Fyrreskoven; Galeottis Plante er fra Llano verde i Oajaca (7—7500').

Klotzsch. Lin. 18. p. 537 fører M. Mathewsi som Synonym til M. pubescens Willd., og anfører iblandt Localiteterne Mexico. C. Ehrenberg. Den Plante, jeg har bestemt som M. Mathewsi afviger betydeligt fra M. pubescens.

* * * stipite genuflexo dichotomo, ramis simpliciter furcatis, laciniis non decurrentibus.

6. Mertensia glaucescens Willd. Hooker sp. fil. t. p. 11. (sub Gleichenia) Mart. & Gal. l. c. p. 17. M. pectinata Willd. Act. holm. 1804. p. 106. t. 4. Langsd. & Fisch. ic. fil. t. 30. Gleich. Hermanni Schlechtd. Lin. 5 p. 620.

I den subtropiske og tempererte Region imellem 2—5000'. Den voxer selskabelig ved Skovranden, paaaabne Steder i Skove, og ligeledes paa forhen dyrkede Marker, som vende tilbage til Forvildning, og bedækkes med den Vegetation, som i Mexico kaldes Acahuall. Jeg fandt den ved Mirador, Huitamalco; Galeotti anfører den desuden fra Huatusco, Coscomatepec og Jalapa; Schiede fandt den imellem Mecapaleo og Cuapa. Den er Mexicos almindeligste og mest udbredte Art.

Tvivlsomme.

Mertensia (Gleichenia) tenuis Presl Rel. Hænk. 4. p. 70.

Mexico, uden Stedbetegnelse, Hænke.

Siges at være nærstaende til M. glaucescens. Ingen kjender den.

Mertensia (Gleichenia) nitida Presl Rel. Hænk. 4. p. 70.

Mexico (ingen Localitet) Hænke.

Siges at være nærstaende til M. dictotoma. Ingen kjender den.

Lygodiaceæ Presl.

Lygodium Sw.

* articulatæ.

1. Lygodium venustum Sw. Schk. Crypt. t. 139. Presl Suppl. p. 105. L. polymorphum H.B.K. nov. gen. t. p. 31.

Den findes saavel i de dybe Dale imellem Central-Cordillererne i Dep. Oajacas østlige Dele i den subtropiske Region, som paa Mexicos vestlige Side i den hede Region; paa bælte Steder slyngende i Krat. Jeg fandt den ved Trapiche de la Concepcion ved Comaltepec (2500—3000'), ved Guatulco.

Presl anfører (l. c.) iblandt Synonymerne ogsaa L. pubescens Mart. & Gal. l. c. p. 17 (nec Kaulf.), hvilken af Forff. nævnes som slyngende i de tynde Kystslove ved Vera Cruz og i Barankerne ved Puente nacional. Jeg formoder, at denne Henførelse blot grunder sig paa det af Forff. uriktig anførte Synonym L. polymorphum H.B.K.; efter de angivne Localiteter at dömme, henhører imidlertid disse Forff's Plante til L. Schiedeanum Presl.

Tvivlsom.

Lygodium hastatum Desv. Kze fil. Leibd. l. c. p. 308. Martius ic. crypt. Bras. 118. t. 57. f. 4.

Skal efter Kunze være samlet af Leibold i den hede Region sammen med *L. mexicanum*, men man maa vist vente nærmere Bekræftelse for dette.

* * continuæ.

- 2. Lygodium mexicanum Presl** Rel. Hæk. 1. p. 72. Presl Suppl. p. 109. Schlechd. Lin. 5. p. 620. Mart. & Gal. l. c. p. 18. Kze fil. Leibd. l. c. p. 308. L. Schiedeanum Presl Suppl. p. 110.

Særdeles udbredt i Mexicos østlige tropiske Skovregion, ligeledes paa Vestsiden. Hænke samlede den først paa Mexicos Vestside; Galeotti ved S. Blas; Schiede i Krat ved Papantla; jeg fandt den slyngende om Træstammer ved Boca del rio, S. for Vera Cruz, ved Vera Cruz, Antigua, Colipa, Potrero del cazadero, Pital, Hac. de Sta Barbara.

Forgjæves har jeg søgt at udfinde de Forskjelligheder, hvorpaa Presl har grundet Adskillelsen af de to Arter *L. mexicanum* og *L. Schiedeanum* i Supplementum Pteridogr. Skjøndt Presl giver meget udførlige Beskrivelser af begge, lades man dog ganske i Stikken, naar man, med talrige Exemplarer af denne yderst foranderlige Bregne liggende foran sig vil søge at fastholde de enkelte Charakterer. Man overbevises snart om det mislige i at ville tillægge et enkelt vilkaarligt valgt Exemplar Rang som Typus for en Art, uden at ville agte paa mange andre Former, hidførende fra samme Localitet, ja maaskee fra det samme Exemplar, kun taget i Spidsen eller ved Grunden af den overmaade lange slyngende Plante. Presl vil hævde Benævnelsen *L. mexicanum* allene for det hænkeske Exemplar i Prager Museet, men af hans udførlige Beskrivelse i Supl. sees, at dette ikkun har været et temmeligt ung Exemplar med Hensyn til de unge Frugtax. Det er Enhver bekjendt, som har hørt Leilighed til at see Lygodier i déres Födeland, hvor forskjelligt Lövets Form er efter Fructificationens Udviklingstrin. *L. venustum* er let adskillelig fra denne Art derved, at Finnernes korte Stilk danner en Articulationsknude umiddelbart under lamina pinnæ, hvilket ikke er Tilfældet hos *L. mexicanum*.

Hydroglossum Willd. Prest.

Lygodictyon J. Smith.

- 1. Hydroglossum spectabile Liebm.** Lygodium scandens Mart. & Gal. l. c. p. 18.
(non Schk., nec *L. semi hastatum* Sprlg.)

Caudice tereti pennam gallinaceam crasso longissimo scandente glabro stramineo,

ramis distantibus (6—9 poll.) brevissimis 1—1½ lin. longis, gemma abortiva rufo-villosa terminatis, sub apice lateraliter et opposite frondes duas stipitatas gerentibus, stipte 1—2½ poll. longo, parte superiori genuflexo, semitereti argute marginato; frondibus *fertilibus* coriaciis glabris utrinque late-viridibus lucidulis divergentibus spithameis pinnatis petiolatis, petiolis 1½—1 pollicaribus marginatis sursum alato-dilatatis sensim in laminam expansis, pinnis plerumque tribus rarius duabus pluribusve 5 poll. profunde palmatifidis basi cordato-aureolatis, pinnis lateralibus 3fidis, terminali plerumque bifidis, laciiniis patulis elongato-lanceolatis 4 circ. poll. longis, poll. latis, inaequilongis, sinibus rotundatis, costulis utrinque convexis stramineis, venis utrinque prominulis in areolas elongato-hexagonoideas anastomosantibus, areolis infinitis majoribus oblique triangularibus; spicis marginalibus densis compressis linearibus obtusis, 1—1½ lin. longis, indusiis cucullatis ovalibus obtusis imbricatis.

Frondes steriles e pinnis duabus oppositis patulis vel divergentibus bi-trifidis formatæ, laciiniis margine minutissime denticulatis.

Planta juvenilis caudicem habet erectum strictum, gemma abortiva terminatum, frondes 2 patulas laterales emittens, frondibus 9 poll. longis basi utrinque cordato-aureolatis, palmatifidis, laciiniis 5—6 patulis elongato-lanceolatis rectis vel ensiformibus pollicem et insuper latis, margine denticulatis.

Denne prægtige Bregne voxer i de hede Urskove, som bedække de lave Bjerge, der hæve sig fra S. Pedro Tepinapa i Districtet Chinantla Dep. Oajaca, slyngende om Stammerne og i Buskadset. Golde og unge Exemplarer fandtes ved Lacoba og Lobani i Chinantla. Den fandtes ligeledes i Skove ved Teotacingo, saa at dens Udbredningsregion bliver imellem 2—4500'.

Af Slægten *Hydroglossum*, saaledes som den af Presl er begrændset, ere ikun to Arter tidligere bekjendte, en fra Sydhavsøerne og en fra Madagascar. Fra America var hidtil ingen Art kjendt, og det har derfor været mig en stor Tilfredstillelse at kunne tilføre Videnskaben den nærværende Art, som nærmer sig noget til *H. madagascariensis* Poir., men dog afviger i mange Punkter. Jeg har ikke mindste Tvivl om, at den galeottiske Plante henhører hertil, saa utroligt det end kunde synes, og uagtet Presl i Suppl. Pteridogr. p. 103 har taget Forff. Bestemmelse for god, og anført den som Synonym til *Lycopodium volubile* Willd. Det er da et Exempel mere af de næsten utallige, som forekomme i Martens & Galeotti Mem., paa disse Forff's store Unøjagtighed. Ved Tepinapa i Chinantla, hvorfra Galeotti angiver sin saakaldte *Lycopodium scandens* findes ikke nogen anden Art end *Hydroglossum spectabile*. Derpaa passer de af Forff. omtalte Finner af 5 Tommers Længde — men det er ogsaa den eneste Lighed imellem *L. scandens* og vor Plante.

Schizæaceæ Kaulf. Presl.

Schizæa Sw.

1. ***Schizæa elegans* Sw.** syn. fil. p. 151. *Lophidium elegans* Presl. Suppl. p. 77.
Acrost. eleg. Vahl Symb. 2. p. 104. t. 50.

Denne tidligere kun fra Øen Trinidad, Guyana og Brasilien kjendte Art fandt jeg i Chinantlas hede fugtige Urskove. Talrige Exemplarer medbragtes fra Jocotepec.

Aneimia Sw.

* flabellatovenatae.

1. ***Aneimia pilosa* Mart. & Gal.** I. c. p. 19. t. 2. f. 1. Presl. Suppl. p. 86.

Galeotti fandt den paa Mexicos Vestside i Dep. Oajaca i fugtige Skove paa Gneis og Syenithjerge ved Zocatepec. Han angiver dens Höideregion imellem 2—6000'. Jeg fandt den under meget forskjellige Forhold, nemlig paa aabne græsrigt Bjergsider imellem Trapiche de la Concepcion og Tepitongo (4—5000') i Dep. Oajacas østlige Deel.

Denne Art er i høj Grad variabel, og vil let kunne foranledige Opstillingen af flere Arter af Botanikere, som i Europa beskrive Arter efter enkelte tørre Herbarie-Exemplarer, som sendes fra andre Verdensdele uden nöagtige Oplysninger om de Forandringer, som forekomme indenfor Artens Grændser. Foruden den Form, som Martens og Galeotti beskrive og afbilde, der udmarkrer sig ved sin korte Stilk, brede budte Finner, store kileformige Endefinner, store Laaddenhed, endelig ved de meget lange, (5—7 Tommer) tynde Frugtstilke, og som passende kunde kaldes:

α brevitistipes; findes en anden mere langstrakt Form, som jeg vil kalde:

β longistipes, fronde 6—10 pollicari, sparse pilosa; stipite 5—6 poll., lamina 2 poll. longa, pollicem circ. lata; lanceolata attenuata, pinnis alternis elongato-subtrapezoideis sessilibus, sursum decrescentibus adnatis, terminali minima linearis obtusa utrinque attenuata, basi cuneatis, basi superiori truncatis, apice attenuatis obtusiusculis, margine sup. irregulatiter incisis denticulatis, anteriori et inferiori deorsum usque ad medium denticulatis; pinnis infimis majoribus 9 circ. lin. longis, 3 lin. latis; paniculis cum pedunculis 3 pollicaribus frondem superantibus.

Denne Form voxer imellem Formen α paa Bjergene imellem Trap. de la Concepcion og Tepitongo.

Imod den galeottiske Afbildning lader sig gjøre flere væsentlige Indvendinger. Middelstokken er ikke tegnet overenstemmende med Naturen; jeg finder aldeles ikke saadan store brede lancetformige Skjæl; Nervationen er som sædvanlig meget maadelig udtrykt.

2. **Aneimia collina Raddi** fil. Bras. p. 70. t. 12. Sprlg. Syst. 4. p. 31. Mart. & Gal. I. c. p. 20. Presl. Suppl. p. 86.

Fundet af Galeotti paa Mexicos vestlige Side i den hede Region (1000—3500') i Dep. Oajaca; jeg fandt den sparsom paa aabne Bjergsider imellem Talea og Hac. de Sta Gertrudes i Dep. Oajaca.

3. **Aneimia hirsuta Sw.** Kze fil. Leibd. I. c. p. 308. A. hirsuta var. achilleæfolia Mart. & Gal. I. c. p. 20. A. repens Raddi. Klotzsch. Lin. 18. p. 526. A. gracilis Schrader. Presl Suppl. p. 87. A. filiformis Sw. Presl Suppl. p. 87. A. ciliata Presl. del. prag. Ej. Suppl. p. 87. A. adiantifolia Schlechtd. Lin. 5. p. 621. (sec. Presl).

Denne i Størrelse, Behaaring, Finnernes Indskjæring temmelig foranderlige Art er udbredt over en stor Deel af Mexico i den subtropiske og tempererte Region, voxende paa aabne tørre Klipper. Jeg fandt den hyppig i Potrero de Consoquitla ved Mirador (2400'), ligeledes ved Trapiche de la Concepcion (3000') ved Comaltepec i Oajaca; C. Ehrenberg har sendt den fra Mexico og Tlacolula; Schiede fandt den ved Hæc. de la Laguna; Galeotti paa Vestsiden ved Zocatepec og Juquila (2—6000'). Hænke havde ligeledes tidligere samlet den paa Vestsiden uden nærmere Angivelse af Stedet.

Man vil muligen finde, at jeg har været altfor rundhaandet med at sammendrage Arter, som af Forfl. ere adskilte, men det er skeet efter moden Overveielse, og med Blikket aabent for de Forandringer, som Planteformer med betydelig geographisk Udbredning ere underkastede. Selv Presl, som er saa tilbøelig til at dele Arter, synes at føle det utilbørlige i den vidtgaaende Sønderdeling, og hans Bemærkninger i Suppl. p. 88. til A. ciliata, hirsuta, dissecta, tenella, vise noksom paa hvor svag Grund disse Arter hvile.

4. **Aneimia fulva Sw. γ flexuosa Presl** Suppl. p. 84 A. flexuosa var.? anthris-cifolia Kze fil. Leibd. I. c. p. 308 (excl. syn.)

Samlet af Leibold i den subtropiske Region af det østlige Mexico.

Mig ubekjendt. Kunze anfører at det muligen er en egen Art. Presl, som formodentlig har haft Planten for Øie, deler ikke denne Mening, men fører den som Form til A. fulva.

5. **Aneimia adiantifolia Sw.** syn. p. 157. Hook. & Grev. ic. fil. t. 16. Schlechtd. Lin. 5. p. 621. Mart. & Gal. I. c. p. 21. Kze fil. Leibd. I. c. p. 309. A. carvifolia Presl Rel. Hænk. 1. p. 74. Ej. Suppl. p. 85.

Findes paa solaabne Steder, paa tørre Klipper i den tropiske og subtropiske Region saavel paa den østlige som vestlige Side af Mexico. Jeg fandt den imellem Isleta og

Maloapam (Dep. Vera Cruz), Colipa, Papantla paa Kalkklipper, Comaltepec (Dep. Oajaca); Schiede fandt den ved Papantla og paa Hac. de la Laguna; Galeotti ved Puente nacional; Hænke paa Mexicos Vestside.

Uagtet Beskrivelsen af *A. carvifolia* ikke indeholder noget, hvorved Adskillelsen af denne fra *A. adiantifolia* kunde synes begrundet, er Presl vedbleven at opføre den som egen Art i Supplementum Pteridogr., men tilføjer dog: forsitan mera varietas *A. adiantifoliæ*.

6. *Aneimia mexicana* Klotzsch in Lin. 18. p. 526.

Sendt fra Omegnen af Byen Mexico af Aschenborn. Mig ubekjendt.

Da Forf. ved Beskrivelsen af denne Art ikke omtaler Nervationen, er dens Plads paa dette Sted ikke ganske sikker.

Tvivlsom.

***Aneimia villosa* ? Karwinskyana Presl Suppl. p. 83. *A. villosa* Karw. pl. mex. exs. no. 8.**

Mexico (Karwinski).

Presl tilstaaer, at han kun har seet fragmentariske Exemplarer. Det er derfor tvivlsomt, om Planten er stillet rigtig som Afart af *A. villosa*, eller det er egen Art.

* * pinnatovenatae.

7. *Aneimia speciosa* Presl Suppl. p. 89.

Samlet paa Mexicos Vestside uden Localangivelse af Née. Jeg fandt den paa græs-rige Bjergsider imellem Tepitongo og Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca (4500'); den bærer Frugt i August.

Da jeg har havt et større Antal Exemplarer til min Raadighed, finder jeg Anledning til at gjøre følgende Tillægsbemærkninger til den iøvrigt gode Beskrivelse af Presl.

Planten opnaaer sjeldent den af Presl angivne Størrelse, navnlig er den golde Plante betydelig mindre, sjeldent over 3—4" lang med en Stilk af 1—2". Finnernes Antal er meget foranderligt; stundom er Lövet udelt aflatng-hjerteformigt med to Frugtstilke fjernede indtil 3 T. under Lövet, og kortere end dette; stundom har Lövet 2—3 Finner; ikke paa meget store Exemplarer, og paa golde Löv er dette bestaaende af indtil 5 Finner. Finnerne ere ved Grunden hjerteformige, og for det meste noget skjæve; Sidefinnerne ere meget kortere og mindre tilspidsede end Endefinnen, som er af 2—2½" Langde, 1' Brede. De to Frugtstilke sidde afvæxlende (ikke modsatte) indtil over en Tomme under Lövet, og ere for det meste kortere end dette. Rodstokken er lille næsten kugelformig, af Størrelse som en Kirsebærsteen, udvendig beklædt med kastaniebruun Filt.

* * * reticulatovenæ (Aneimidiptyum Presl.)

- S.** *Aneimia Phyllitidis* Sw. Schlechtd. Lin. 5. p. 620. Kze fil. Leibd. I. c. p. 308.
Nees ab E. Linnæa 19. p. 686. A. Hænkei Mart. & Gal. I. c. p. 19.

Dette er Mexicos almindeligste Art, som har en betydelig geographisk Udbredning i den subtropiske og tempererte Region, hvor den voxer i Skove paa fugtige skyggefulde Steder. Jeg fandt den ved Mirador (3000'), imellem Comaltepec og Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca (2500–3000'), ved Teotacingo i Chinantla (4000'). Schiede fandt den ved Jalapa, paa Hac. de la Laguna; Galeotti ved Zazuapan; Leibold sammedes.

Arten varierer betydelig, ikke blot i Størrelse, men ogsaa i Finnernes Antal og Form; de ere snart siddende, snart stilkede, snart hjerteformige ved Grunden, snart budd afrundede, snart endelig tilspidsede. Det er af denne Grund at jeg med megen Vantro seer hen til A. Hænkei Presl. Suppl. p. 94 og β cordifolium Pr. (A. Hænkei Pr. Rel. Hæn. I. p. 74. A. cordifolium Pr. Rel. Hæn. I. p. 73. t. 11. f. 3) samlede af Hænke i det vestlige Mexico. Det er neppe andet end mindre Former af *Phyllitidis*, voxne paa en noget tørrere Jordbund.

Osmundaceæ Mart.

Osmunda L.

- 1.** *Osmunda spectabilis* Willd. β *palustris* Presl Suppl. p. 63. O. spectabilis Mart. & Gal. I. c. p. 21. O. regalis L. var. spectabilis Willd. β *brasiliensis* Kze fil. Leibd. I. c. p. 308.

I Moser ved Foden af nogle smaae Slamvulkaner, los Hornillos kaldte, i Nærheden af S. Antonio Huatusco (4500') Dep. Veru Cruz. Leibolds Exemplarer ere fra samme Localitet. Galeotti fandt den i Moser ved Jalapa.

- 2.** *Osmunda cinnamomea* L. Schk. Crypt. t. 146. Kze. fil. Leibd. I. c. p. 308.
Presl Suppl. p. 68. (sub § 3. Osmundastrum.)

Den voxer i de samme Moser ved Huatusco sammen med foregaaende, og findes der om Foraaret rigelig i Frugt. Leibold fandt den sammedes.

Ophioglossaceæ R. Br.

Ophioglossum L.

- 1.** *Ophioglossum bulbosum* Michx. fl. am. bor. 2. p. 276. Klotzsch. Lin. 18. p. 529.
Presl Suppl. p. 51.
Fundet i Real del monte af C. Ehrenberg.

- 2. *Ophioglossum reticulatum* L.** Hook. & Grev. ic. fil. t. 20. Schlechtd. Lin. 5. p. 620. Mart. & Gal. p. 13. Presl. Suppl. p. 52.

Fundet paa Træstammer ved Jalapa af Dr. Schiede; Galeotti fandt den i Llano verde (7500') i Oajaca ved Foden af Kalkklipper paa sumpige Steder.

- 3. *Ophioglossum (Cheiroglossa Presl) palmatum* Plum.** fil. t. 163. Hook ic. pl. 1. p. 4. Mart. & Gal. l. c. p. 14. Presl Suppl. p. 57.

Galeotti fandt den nedhængende fra Traerne i skyggefulde Skove ved Petlapa i Dep. Oajaca (3000').

De her nævnte Arter af *Ophioglossum* synes i Mexico at være yderst sporadisk fremtrædende; i det mindste har jeg under et næsten treaarigt Ophold i Landet under idelig System med Planteverdenen ikke seet noget eneste Exemplar deraf.

Prof. Kunze omtaler i fil. Leibd. p. 306 to Arter, som have været tilstede i ufuldstændige Exemplarer i Leibolds Samling, og som han derfor ikke vover at bestemme.

Botrychium Sw.

* flabellatovenatæ.

- 1. *Botrychium obliquum* Mühlenbg.** Schlechtd. Lin. 5. p. 621. (partim) Presl. Suppl. p. 44. B. lunarioides Schk. Crypt. t. 157. Klotzsch. Lin. 18. p. 529.

Fundet paa Cerro colorado af Schiede, ved Huajolote af C. Ehrenberg.

- 2. *Botrychium decompositum* Mart. & Gal.** l. c. p. 15. t. 1. Presl. Suppl. p. 44. B. obliquum Schlechtd. Lin. 5. p. 621. (partim).

Galeotti angiver som denne Arts Voxested Skoven paa Pico de Orizaba i 5—6000 Fods Höide. Denne Angivelse er urigtig af den simple Grund, at der slet ikke existerer noget Pico de Orizaba paa den angivne Höide, thi det Plateau, hvorfra Vulkanen begynder at have sig ivedret, er ved Landsbyen Sta Maria Alpatlahua allerede 7500 höit. Jeg har fundet Bregnene i Skovene imellem Totulla og Mirador paa henimod 4000', og sandsynligvis ere de Galeottiske Exemplarer ogsaa fra denne Localitet. Efter Presl's Angivelse er den samlet af Schiede imellem den foregaaende paa Cerro colorado.

* * pinnatovenatæ.

- 2. *Botrychium virginicum* Sw. var *mexicanum* Hook. & Grev.** syn. fil. in Hooker bot. Miscell. 2. p. 223. Presl Suppl. p. 46. A. virginicum Schlechtd. Lin. p. 621. (excl. syn. Plum.) B. brachystachys Kze fil. Leibd. l. c. p. 305. (sec. Presl.)

I den østlige tempererte Region. Fundet i Skove ved Jalapa, og paa Cuesta grande de Chiconquiaco af Schiede; i den temp. Reg. af Leibold.

Anm. Arterne af Botrychium forholde sig i Mexico ligesom Ophioglossum; de optræde ingensteds i rigelig Mængde, men man støder tilfældigvis paa et enkelt eller et Par Exemplarer.

Danæaceæ Presl.

Danæa Smith.

1. *Danæa (Holodanæa) elata* Liebm.:

fronde sterili 4—5 pedali, stipite bipedali, elongata pinnata, pinnis supra obscurc viridibus nitidis subtus pallidioribus, oppositis remotis, 10 paribus cum impari, brevissime petiolatis, patentibus, oblongo-lanceolatis, longioribus 7 poll. 1½ poll. latis, abrupte longi-et falcato-acuminatis, margine incrassato parum reflexo undulatis, apice undulato-repandis, basi obliquis cuneatis, costa utrinque elevata, antice obsolete canaliculata glabra, postice convexa squamulis ferrugineis obsita, venis obscuris utrinque prominulis simplicibus vel furcatis parallele-curvatis; stipite basin versus penna cygnea crassiori subtereti vix canaliculato squamulis ferrugineis laceris adpressis adperso continuo, rhachi articulata, internodiis biplicaribus sursum brevioribus, ad nodos compresso-incrassata, antice canaliculata sulcata, lateribus planis, dorso convexa, squamulosa. *Fertiles* perierunt.

Habitus D. nodoso, sed hæc stipite nodoso, pinnarum paribus pluribus (15), pinnis longioribus (8 poll.), apice subintegerrimis, cet. differt.

Denne Bregne har jeg ikkun fundet paa en Localitet i Mexico, nemlig i en Skovkløft ved Randen af en Bæk voxende i et tykt Muldtag paa Hacienda de Jovo (Baranca del arroyo de Isapa, Dep. Vera Cruz) paa henimod 1500' Höide.

Det er at beklage, at de frugtbare Exemplarer af denne Art ere gaaede tilgrunde i en Plantesending, der paa Flodpassagen ned ad Rio Tecoluta og senere paa Seildsden i et maadeligt Kystfartöi havde lidt meget af Fugtighed. Det er saameget beklageliggere, som forhen ingen Danæa Art var kjendt fra Fastlandet Nord for Panamá.

2. *Danæa (Holodanæa) media* Liebm.:

fronde sterili 1—2 pedali, stipite 6—12 poll. longo, oblonga pinnata, pinnis oppositis remotis patentissimis (paribus pinnarum plerumque 5, rarius 7 vel 4—3), subsessilibus infimis brevipetiolatis, 2—3 poll. longis, 1—1½ poll. latis, e basi obliqua cuneata ellipticis apice abrupte curvato-cuspidatis, margine leviter undulatis apicem versus repandulis, supra obscurc viridibus subtus glauco-viridibus, costa utrinque elevata, antice canaliculata glabra, postice convexa squamulis ferrugineis hic illuc adpersa, venis basi furcatis utrinque pro-

minulis obscuris; stipite continuo compressiusculo subtetraquetro marginato squamis-membranaceis fuscis squamulisque ferrugineis laceris adpressis adperso, antice plano sulcato; rhachi compressa interrupte-alata articulata, internodiis inferioribus 2 poll., sursum brevioribus, alis membranaceis ad apicem articuli majoribus, deorsum decrescentibus. Rhizoma horizontale pollice crassius, intense fuscum, protophyllis carnosis subreniformibus laceris, instructum. Frondes fertiles jam non adsunt.

Habitus accedit ad D. Leprieurii Kze, sed differt hæc species præter alias notas imprimis stipite articulato.

Den findes i Baranca del arroyo de Isapa paa Hac. de Jovo imellem foregaaende Art. Disse to Arter vox i Selskab med lave Pandaneer (Carludovica), Polybotrya cervina, Dorstenia Houstoni, lave Melastomer, forskjellige Aroideer, odl.

Skjønt de frugtbærende Løv ere blevne ödelagte, kan jeg dog ikke tvivle om, at denne ligsom foregaaende hører til de ubeskrevne Former.

3. **Danæa (Eudanæa) cuspidata Liebm :**

fronde sterili $1\frac{1}{2}$ pedali, stipite 6—8 pollicari, elongata, pinnata, pinnis coriaceis antice atroviridibus lucidis, postice glauco-viridibus opacis, oppositis, paribus 10—12 cum impari, patulis sessilibus, longioribus 4 poll. semipollucem latis, linear-ellipticis, basi oblique cuneatis, apice falcato-incurvis longe cuspidatis, margine incrassato undulatis revolutis, apicem versus argute hamato-dentatis, costa utrinque elevata castanea, antice canaliculata glabra, postice convexa hic illic squamis membranaceis fuscis adpersa, venis utrinque prominulus obscuris simplicibus furcatiis parallelis; stipite 2—3nodoso, internodiis 2— $2\frac{1}{2}$ poll. longis quadrangulo antice bisulco ferrugineo-squamuloso; rhachi nodosa sursum imprimis sub nodis marginata, internodiis vix pollicaribus, nodis compressiusculis incrassatis densius squamuosis. Frondes fertiles non visæ.

Denne Art fandtes i de mørke fugtige varme Urskove, som bedække Bjergsiderne i Chinantla imellem Lobani og Petlapa (2500'), og synes meget sjelden.

Frugtbærende Exemplarer ere ikke komne mig for Öie.

I Habitus ligner denne Art nærmest Danæa stenophylla Kze. Farrn. t. 28, som imidlertid ved sin uleddede knudeløse Lövstilk og Axe hører til en anden Afdeling, saa det er uforståeligt at fremhæve de speciellere Forskjelligheder. Skade er det at Frugtexemplarer ikke ere trufne, for at faae afgjort, om Arten har sine Synangier overensstemmende med Danæa, saaledes som Presl omskriver Slægten i Suppl. Pteridogr., eller med Heterodanæa Presl, hvortil ovennævnte D. stenophylla henføres.

Marattiaceæ Kaulf.

Marattia Smith.

- 1. Marattia (Gymnotheca) laxa Kze** fil. Leibd. l. c. p. 306. Kze. Farrnk. p. 231.
t. 95. *Gymnotheca laxa* Presl Suppl. Pterid. p. 15.

Denne Art tilhører Mexicos østlige tropiske Region, og gaaer neppe op i den tempererte, saaledes som Kunze efter Leibolds Angivelse anfører. Den voxer paa meget skyggefulde og fugtige Steder, især i Bundene af skovbegroede Baranker. Allerede i Foraaret 1841 samlede jeg Planten paa flere Steder paa Mexicos Østkyst ved Ranchoen Cabrestros i en Baranke, neppe 500 Fod over Havet; ved Sta Maria Tlapacoyo, og paa den nærliggende Hac. de Jovo paa henimod 1500 Fods Höide; endelig i den dybe Baranca de S. Francisco i Nærheden af Mirador paa omtrent 2000'. De Leiboldske Exemplarer skrive sig formodentlig fra denne sidste Localitet.

Det fuldt udviklede frugtbærende Löv er over 5 Fod langt, de primære Finner over 20 Tommer lange, sædvanlig afvexlende, stundom modsatte især imod Spidsen.

- 2. Marattia (Gymnotheca) weinmanniaefolia Liebm.**: *Marattia laevis* Mart. & Gal. l. c. p. 151 (minime Smith).

fronde 5—6 pedali coriacea lato-lanceolata tripinnata; pinnis primariis oppositis patulis bipedalibus lanceolatis remotis (6—4 poll. distantibus); pinnis secundariis alternis patentissimis approximatis (1—2 poll. distantibus), 4—5 poll. longis $\frac{2}{3}$ poll. latis, linearis-lanceolatis longe acuminato-caudatis; pinnulis sessilibus alternis patulis adfixis, vix semipollicem longis (in pin. sterilibus et apicem versus longioribus), 3 lin. latis oblique ovalibus, basi oblique cuneatis, apice truncato- et rotundato-obtusis margine adpresso crenatis plerumque leviter revolutis, utrinque late viridibus glabris; costa antice elevata convexa, postice subimmersa, non excurrente, venis immersis patulo-furcatis simplicibusve. Synangis dorso venarum infra marginem affixis, thecaformibus coriaceis pallide fuscis ellipticis bilobis, 4—5 rimosis margine incrassato integris, deciduis; indusiis nullis; receptaculis e venarum parte incrassata formatis linearibus, sulco longitudinali ad recipiendum cristam synangiorum exaratis. Rhachi universali antice planiuscula canaliculata, postice convexa ad insertiones pinnarum dilatata; secundariis marginata apicem versus alatis; tertiaris utrinque interrupte-alatis, alis sub pinnula quoque oblique-truncatis membranaceis aveniis integerrimis margine parum revolutis, deorsum decrescentibus. Rhachi universali et secundariis sparse paleaceis; tertiaris glabrescentibus, solummodo ad insertionem pinnularum squama una alterave instructis. Rhizoma erectum breve vix spithameum carnosum squamis carnosis obsitum, frondes 5—6 emittens.

Habitus speciei quodammodo ad M. alatam accedit, sed præter alias notas genere (sec. definitionem Marattiacearum Preslii) differt.

Voxer i den fugtige skyggefulde Skovregion i Dep. Oajacas østlige Bjerge imellem 4—6000 Fods Höide paa leret Jordbund ved Bredden af smaae Vandløb. Jeg fandt den især hyppig imellem Roayaga og Tonaguia i Districtet Villa alta, ligeledes i Skoven imellem Betaza og Chichicastepec, og imellem Yalalah og Yagochi i 7—8000 Fods Höide. Galeotti samlede den lidt længere imod N.V. i den samme Bjergkjede ved Talea i lignende Höide.

Der kan ikke være nogen Tvivl om, at den eneste Marattiacee, som omtales af Martens og Galeotti i Mem. s. I. Foug. under Navn af M. laevis Willd. (skal være Sm.) er denne Art, uagtet man vel maa undre sig over en saa unøiaglig Bestemmelse. M. laevis har en overordentlig tjern Lighed dermed, hvorimod Forvexling med M. alata meget snarende lod sig forklare hos Forff., som ikke tage det saa nøie med deres Bestemmelser eller Benævnelser. Nærværende Art stemmer imidlertid paa det fuldstændigste med Charaktererne for Presl's Gymnotheca, hvorimod M. alata henhører til samme Forf's Discostegia, der er forsynet med Indusium og har et kuglerundt Receptaculum, medens vor Plantæ mangler Indusium og har et linieformigt Receptaculum. Dette er altsaa den første grove Feiltagelse af Mem.'s Forff. Presl har i Suppl. Pteridogr. p. 12 taget den martens-galeottiske Bestemmelse for god, stolende paa sammes Nøiagtighed, men Mexico bliver efter det anførte at stryge iblandt Localiteterne for M. laevis. En anden Uriglighed hos Mart. & Gal. er den Angivelse, at denne Bregne skal være træaglig, hvilken Angivelse allerede er gaaet over i andre Værker (cfr. Presl l. c. p. 11 i Slægtsbeskrivelsen af Discostegia). Planten har, som i ovenstaende udförlige Beskrivelse omtalt, en kjödfuld Middelstok, som neppe hæver sig et Qvarter over Jordens Overflade.

Plantergeographisk Oversigt over Mexicos Bregner.

Det eneste Forsög, der hidtil er gjort til at fremstille Mexicos Bregner efter deres geografiske Fordeling, findes i Martens & Galeottis *Mémoire sur les Fougères du Mexique* p. 83. Det vil være nødvendighed at gaae noget nærmere ind paa dette Arbeide, dels fordi det er det første Forsög i denne Retning, og derfor er blevet tillagt nogen Betydning, dels fordi jeg aldeles ikke kan antage de af Forff. fulgte plantergeographiske Principer, og maa forkaste de at dem vundne Resultater som urigtige. Jeg vil derfor først give en kort Udsigt af deres Fremstilling, og derpaa meddele de derved foranledigede critiske Bemærkninger. Først efter at være kommen til Erkjendelse om dette Arbeides Beskaffenhed, vil jeg forsøge at opstille de i Henseende til Bregnernes geografiske Fordeling karakteristiske Regioner, hvilke jeg vil söge at begrunde paa ganske andre, men som jeg vil haabe, med Naturen mere overenstemmende Forhold end de af Martens og Galeotti anvendte.

Forff. plantergeographiske Inddeling er følgende*):

1º Hede Region ved Foden af Cordillererne fra Atlanterhavets (*sic!*) Bredder indtil 2500'. Underafdeles saaledes:

A. *Hede Kystregion.* Tynde Skove. *Rhizophora Mangle*, *Castilloa elastica*, *Convolv. maritimus*. Liden Fugtighed. Middeltemperatur 25°—25° 30' C.

1. *Lygodium*. 1. *Acrostichum*.

B. *Barankernes og de fugtige Skores hede Region.* Skovtræer af forskjellige Familier. Basalt, vulkanske Conglomerater og detritus. Middeltemp. 19°—24° 30' C.

Overgaer i den tempererte Region igjennem Barankerne og de fugtige Skove imellem 2—3000'; man kan derfor opstille en Underafdeling: en varm-temperert Region fra 1500—1800' til 2500—3000'.

2 *Lygodium*, 1 *Ancimia*, 1 *Acrostichum*, 1 *Polypodium*, 1 *Gymnogramme*, 2 *Pteris*, 3 *Asplenium*, 2 *Aspidium*, 4 *Adiantum*, 1 *Dicksonia*.

C. *Sydhavskysts hede Region.* Indtil 2500—3000'; Middeltemp. 19° til 25°; fugtige Skove, dybe Baranker, kraftig Vegetation lige til Havel. Basalt i Jalisco, Granit ved Acapulco, Gneis og Granit i Oajaca.

1 *Lygodium*, 1 *Acrostichum*, 1 *Polypodium*, 1 *Blechnum*, 1 *Asplenium*, 3 *Adiantum*, 1 *Cheilanthes*.

2º Tempererte Regioner.

A. *Östlige Cordillere-Heldning.* Meget udsrakt; øvre Grændse vanskelig at angive især

*). Da Forff. regne Lycopodiaceerne med til Bregnerne, og opføre dem i de plantergeographiske Lister, ere disse strøgne i min Oversigt over Forff. Arbeide.

i Dep. Oajaca. Uafbrudt Grönhed; stor Fugtighed; træagtige Bregnere og Liquidambar, immergrønne Ege, mange Orchideer, *Myrica jalappensis* etc. etc. Middeltemp. 15—19° C. Basalt i Dep. Vera Cruz; Kalkskifer i Dep. Oajaca.

Basaltens: 1 *Mertensia*, 1 *Aneimia*, 1 *Osmunda*, 3 *Acrostichum*, 4 *Gymnogramme*, 19 *Polygonium*, 1 *Tænitis*, 1 *Lomaria*, 4 *Blechnum*, 1 *Diplazium*, 4 *Pteris*, 12 *Asplenium*, 1 *Cænopteris*, 2 *Aspidium*, 5 *Adiantum*, 1 *Cheilanthes*, 1 *Dicksongia*, 2 *Alsophila*, 2 *Cibotium*, 1 *Cyathea*, 2 *Trichomanes*, 1 *Hymenophyllum*.

Kalkskiferens: 1 *Ophioglossum*, 1 *Marattia*, 5 *Polypodium*, 1 *Blechnum*, 3 *Pteris*, 1 *Asplenium*, 1 *Adiantum*, 1 *Aspidium*, 1 *Alsophila*, 1 *Cyathea*.

B. Vestlige Cordillere-Heldning. Tempererte Region udstrakt igennem største Dele af Dep. Michoacan, Districtet Colima, Dep. Jalisco. I Oajaca nærmer den sig Havet og gaaer ned til 1000'; øvre Grændse bliver at ansætte i det mindste ved 6500'. Middeltemp. (ved Tepic) 15—20° C. Basalt (Jalisco, Del af Michoacan), Kalk og Sandsteen (sydlige Michoacan), chrystallinsk Kalk, Gneis, Granit, Syenit (Oajacas Kyster). Ingen træagtige Bregnere*) eller Liquidambar, stor Mængde Ege og Orchideer, nogle Palmer, men ingen Chamædoreer**).

Vulkansk Jordbund: 1 *Acrostichum*, 1 *Gymnogramme*, 1 *Notochlæna*, 1 *Blechnum*, 1 *Pteris*, 2 *Adiantum*, 1 *Cheilanthes*.

Granit, Gneis: 3 *Aneimia*, 1 *Acrostichum*, 1 *Polypodium*, 1 *Pleopeltis*, 2 *Allosorus*, 1 *Asplenium*.

C. Tempererte Central-Region, indbefattende Heldningerne af Bjerkjederne, som adskille Höisletterne, fra 3500—6000'. Middeltemp. 15°—20° C. Jordbund forskjellig: Kalk, Skifer, Basalt, Trachyt, Phorphyr, Gneis etc. Höisletterne selv have ingen Bregnere. For denne Region anføres ikkun:

Aspidium abruptum, paa Gneis i Oajaca.

3^o Kolde Regioner.

A. Østlige Cordillere-Heldning. Naaletræer, træagtige Ericaceer, Cruciferer, mange Ranunculaceer, ingen Acacier eller Malpighiaceer etc., faa Lianer.

Nedre Grændse varierer imellem 5500 og 7000'. Bregnere hyppige imellem 8—10,000; de forsvinde paa 12,500 Fods Höide.

Vulkansk Jordbund: 4 *Acrostichum*, 1 *Gymnogramme*, 1 *Xiphopteris*, 3 *Polypodium*, 1 *Allosorus*, 2 *Pteris*, 2 *Asplenium*, 1 *Woodwardia*, 2 *Aspidium*, 1 *Adiantum*, 1 *Cheilanthes*.

Kalk: 1 *Ophioglossum*, 1 *Mertensia*, 3 *Acrostichum*, 1 *Grammitis*, 1 *Xiphopteris*, 6 *Poly-*

*) En træagtig Bregne findes dog i denne Region, nemlig *Alsophila mexicana* Mart.

**) Urigtigt, flere Chamædoreer findes i Floddalene paa Dep. Oajacas Vestside.

podium, 4 Tænitis, 4 Antrophyum, 4 Blechnum, 2 Pteris, 3 Asplenium, 4 Cænopteris, 2 Aspidium, 4 Adiantum, 2 Cheilanthes.

- B. *Vestlige Cordillere-Heldning.* Omrent samme Charakteer som østlige Heldning. Herunder føres det centrale Mexicos Höider, som overgaae 7000', f. Ex. Popocatepetl, Ixtaccihuatl, Malinche, Nevado de Toluca, Cerro de Ajusco, Pico de Tancitaro etc. Geognostisk Beskaffenhed meget forskjellig.

Basalt: 1 Acrostichum, 3 Polypodium, 1 Notochlæna, 1 Asplenium, 1 Aspidium, 1 Adiantum, 2 Cheilanthes.

Gneis og Kalk: 2 Aneimia, 1 Acrostichum, 1 Grammitis, 1 Polypodium, 1 Pleopeltis, 3 Notochlæna, 2 Allosorus, 1 Pteris, 2 Asplenium, 3 Adiantum, 1 Cheilanthes.

- C. *Høisletterne.* Hertil regnes Mexico Sletten, Toluca Sletten, Sletterne ved Guanaxuato, Silao, de uhyre Sletter i Zacatecas, Durango, S. Luis Potosi. Ingen Bregner.

Totaltallet 170 Arter, hvoraf 114 paa Basalt, 54 paa Kalk, Gneis og Granit.

Saavidt Memoiren. Vi ville nu see, hvilke væsentlige Mangler ogaabenhængigheder denne Fremstilling lader af.

Idet Forff. aldeles ignorere det betydelige Antal Bregner, der tidligere var bekjendt fra forskjellige Egne af Mexico, og ikkun tage Hensyn til de af Galeotti samlede Arter gaaer den hele videnskabelige Brugbarhed af denne Del af deres Arbeide tabt. Hvilken Nutte skal nemlig Plantogeographen have af en Oversigt over 170 Bregners Fordeling efter Regioner, vilkaarlig og utilbör- ligen fremhævede fremfor en stor Mængde Arter, som paa den Tid, da Forff. udgave deres Mem. s. l. *Fougères du Mexique* vare bekjendte som mexicanske? Meningen med slige plantogeographiske Oversigter er jo dog at anskueliggjøre en vis Plantefamilies Forhold i et vist Land igjenem de forskjellige Höideregioner. Men dette opnaaes ikke ved den af Forff. givne Fremstilling. Et vilkaarligt valgt Exempel vil gjøre det indlysende, at Forff. have forfeilet Øiemedet med deres Arbeide. I Mem. finde vi 1 Hymenophyllum og 2 Arter Trichomanes omtalte, alle tre føres af Forff. til den østlige tempererte Region; men dengang Forff. udgave deres Mem. var det velbekjendt, at et betydeligt større Antal af disse to Slægter fandtes i Mexico, nemlig de af Dr. Schiede samlede og af Schlechtendal og Kunze bestemte og i Linnaæus omtalte: Hymenophyllum 6 Arter, Trichomanes 3 Arter. Hvis Forff. havde taget tilbörligt Hensyn til det allerede for Videnskaben vundne, vilde vi have faaet en ganske anden Forestilling om disse to Slægters Rolle i Mexico. Det samme gjælder om de fleste andre Slægter.

Det er fremdeles meget uhensigtsmæssigt at Forff. ikkun nævne Tallet paa

Arterne af de forskjellige Slægter, som optræde i de forskjellige Regioner, men ikke, hvilke Arterne ere. Det er meget besværligt at maatte slaae efter i de artrigere Slæglers systematiske Opstilling for imellem en stor Mængde Voxesteder at söge at udfinde, hvilke Arter det vel kan være som fremtræde i hver Region. Dette er imidlertid en Mangel af mindre Betydning. Betænker man desuden at Forff's Artsbestemmelser ere i høieste Grad upaalidelige, saaledes som det i den foregaaende Fremstilling er viist, da vil man ikke savne de urigtige Artsnavne, man ellers vilde have erholdt.

Plantestatistiske Oversigter, især fra tropiske Egne, pleier man ikke at tillægge stor Betydning, fordi man ikke kan skjænke dem absolut Paalidelighed, idet ny opdagede Former hurtigen forandrer de opstillede Proportioner; naar imidlertid en Forfatter tager tilbørligt Hensyn til Alt, hvad Videnskaben paa en given Tid frembyder, for at gjøre sit Arbeide saa fuldstændigt og paalideligt som muligt, da vil ogsaa Arbeidet have Værd for sin Tid, men ogsaa ikkun da.

Martens og Galeotti inddede Mexico i tre Regioner, en hed, en temperert og en kold. Denne Inddeling synes noget vel almindelig, ligesom ogsaa Grænderne for disse Regioner ere stillede med stor Vilkaarlighed. Vi ville korteligt betragte hver enkelt af disse Regioner og deres Underafdelinger, saaledes som Forff. omskrive dem.

1º Den hede Region. Det er i Samklang med saa mange andre Unöiagtigheder, som forekomme i dette Skrift, at Forff. definere Regionen som strækende sig ved Foden af Cordillererne fra Atlanterhavets Bredder til 2500 Fods Höide, og dog underafdele den i A) en Atlanterhavskystregion og C) en Sydhavskystregion, af hvilke den sidste gaaer til 3000'. Desuden opstilles som B) en Skov- og Barankeregion, der skal overgaae i den tempererte Region imellem 2—3000', saa at man kan opstille som Underafdeling en varmtemperert Region fra 1500—1800 til 2500—3000'. Skjöndt denne Region er stillet imellem de to Kystregioner, og derfor skulde synes at maatte være ment som fælles for begge, sees det dog tydeligt, at den kun er ment som henhørende til den østlige Kyst. Der var lige megen Anledning til at opstille en Skov- og Barankeregion for Vestsiden som for Østsiden. Men det er overhovedet ulogisk, og i Modstrid med hele den øvrige fulgte Inddelingsmaade, at opstille en Skov- og Barankeregion allene i den hede, men ikke i den tempererte og kolde Region.

2º Tempererte Regioner. A) Østlige Cordillere-Heldning, B) Vestlige Cordillere-Heldning, C) Tempererte Central-Region.

Det skal efter Forff. være vanskeligt at angive den øvre Grændse for den østlige tempererte Region, men dette kan jeg ikke indrømme uden med Hensyn til Dep. Oajaca, hvor Vegetationsforholdene paa Grund af Landets særegne Bygning ere yderst indviklede. Paa hele den øvrige østlige mexicanske Cordillerekjede, der strækker sig parallel med Kysten, og hæver sig til 8—9000 Fods Middelhøide, afgiver den nedre Grændse for Naale-

Træerne en særdeles bekvem Grændse mellem den tempererte og kolde Region. Den vestlige tempererte Cordillere-Heldning skal sørke sig indtil 1000 Fod i Dep. Oajaca; men det er umuligt at bringe denne Paastand i Overensstemmelse med den tidligere ved Sydhavskysts hede Region gjorte, hvorefter samme ansættes indtil 3000', og de Iagttagelser, jeg paa en Reise i de vestlige Dele af Dep. Oajaca har havt Lejlighed til at anstille, modstridige ogsaa aldeles denne Forff's Paastand.

3º Kolde Regioner. A) Østlige Cordillerers, B) Vestlige Cordillerers, C) Höisletternes. Under B) de vestlige Cordillerers Heldning indbefattes höist mærkeligen alle Bjerghöider i det Indre af Mexico, hvilket ikke er overensstemmende med det ved den tempererte Region fulgte Inddelingsprincip, hvorefter man skulde have ventet, at de kolde Central-Bjerghöider kom til at danne en egen Underregion for sig. Höisletterne, som ingen Bregner eie, danne derimod en under C) opstillet Underregion.

Forff. lagte i deres plantekogeographiske Oversigt særdeles Vægt paa Jordbundens geognostiske Beskaffenhed, og opstille i de fleste Regioner to Rækker af Bregner, eftersom de voxer paa vulkansk Jordbund eller paa Granit, Kalk, Skifer. Denne Modsætning mellem Bregner, som voxer paa vulkansk Jordbund, og dem, som voxer paa Kalk, Skifer, Granit, Gneis o. dl. maa være Enhver paafaldende. Det er dog vel Vilkaarigheden drevet vel vidt. Men jeg tager ikke i Betænkning at erklære denne hele paa Jordbundens Beskaffenhed støttede Fremstilling som greben af Lusten, og, hvad der ville synes utroligt, hvis det ikke kunde bevises, nedskrevne tiltrods for Forff's bedre Vidende.

Saavidt vor Kundskab for Tiden gaaer er det ikkun et indskrænket Antal Planter, som ere *jordfaste*; det langt overveiende Antal er ikke bunden til nogen bestemt Jordbund, men voxer tilsyneladende lige villigt i meget forskjellige Jordflåndinger. Bregnerne höre ganske vist snarere til de *jordfaste* end til de *jordfrie*, men det er paa en ganske anden Maade end Forff. antage, og at opstille to Rækker, hvoraf den ene indbefatter de vulkanske Klippers Bregner, den anden alle andre Klippearters Bregner, og begge Rækker dog ikkun betegnende Klippebregner, det er absurd. Europas Bregner voxer enten i en meget humusrig Jordbund (i Skove, i Törvemoser) eller i Klippesprækker. Disse sidste voxer sædvanlig ligegodt i Revnerne af Granit- Skifer- Kalkklipper, ja selv i Muurrevner. Stenens chemiske Sammensætning synes mindre vigtig for disse Klippebregner end sammes Haardhed. Asplenium Ruta muraria, septentrionale, Trichomanes, Adiantum nigrum, kunne tjene som velbekjendte Exempler herpaa.

I den hede Zone er Forholdet det samme, men her kommer endnu det meget store Antal Bregner til, som voxer snyltende paa Træstammer, og altsaa ere aldeles uafhængige af Jordbunden. Det er ubegribeligt, at Martens og Galeotti ikke have taget Hensyn hertil, uaglet de i den systematiske Deel idelig nævne Arterne som parasitiske.

I Mexico er det i de planterigere Egne, navnlig i de, hvor Bregnerne fremherske, særdeles vanskeligt, ofte umuligt at komme til Kundskab om Beskaffenheten af det faste Klippeunderlags Natur, fordi dette er bedækket af mægtige Leerlag, som i Skovegnene endnu blive overleirede af et tykt sort Humuslag. I dette røde jernholdige Leer, i denne sorte Humus voxer de fleste Jordbregner; af det forholdsvisi ringe Antal, som voxer i Klippesprækker træffes nogle tillige parasitisk paa Træer, og vise saaledes tilfulde, hvor lidet de ere afhængige af de Klippers chemiske Sammensætning, i hvis Sprækker de voxer.

Efter disse Bemærkninger, som vil finde Medhold af enhver med Forholdene bekjendt Botaniker, ville vi tage et Par Exempler ud af de af Martens og Galeotti opstillede Rækker, for at vise det aldeles ugrundede i samme.

P. 85. Tempererte østlige Region. *Basaltisk Jordbund*: 2 Arter Psilotum, men den ene Art voxer kun paa Klipper, den anden paa Træer. — 1 Mertensia, men denne voxer aldrig paa Basalt, men paa rød Leer. — 1 Aneimia, paa Leer. — 1 Osmunda, i Sumpe. — 3 Acrosticha, alle paa Træer. — 1 Cyathea, i sort Humus. — 2 Trichomanes, parasitisk paa Træer. — 1 Hymenophyllum, paa Træer. — 19 Polypodia, største Delen paa Træer. Flere Exempler behøves vist ikke; Sagen er indlysende. Det nyttet ikke, hvis Forff. ville söge at frelse Skinnet af Nöagtighed ved at paastaae, at den faste Klippegrund har Indflydelse paa Vegetationens Charakter selv igjennem de overleirende Leer- eller Humuslag; thi om ogsaa det var sandt, hvilket det ikke er, saa maa vi dog strax spørge, om denne Klippejordbund da ogsaa har Indflydelse igjennem Træstammerne paa de Parasiter, som i de tropiske Skove bedække Træernes Bark? og dette ville dog vel Forff. ikke fordriste sig til at paastaae. Resultatet bliver altsaa, at det hele plantogeographiske Forsøg, tilsyneladende saa nøagtigt og støttet paa geologiske Data, i Virkeligheden er unøagtigt, upaalideligt og — ubrugbart.

I den foran givne Fremstilling af Mexicos Bregner indeholderes Oplysninger om 308 Arter; i dette Tal indbefatter ikke 61 Arter, der nævnes af andre Forff. som mexicanske, men som jeg af forskjellige Grunde anser for at være tvivsløse, og derfor ikke vil medtage i den efterfølgende Fordeling igjennem de forskjellige Regioner. Af de med Sikkerhed kjendte ere 89 Arter Parasiter, 78 voxer i Klippesprækker, 131 i Jorden, formuemmelig i Skove, nogle paa aabne Steder, 10 ere Sump- eller Vandbregner.

I min Fordeling af Bregnearerne udgaer jeg fra Mexicos østlige Kyststrand tvers over Landet imod Vest indtil Sydhavskysten.

1. Østlige Heldning af mexicanske Cordillere.

A. Tropiske Kystregion fra 0—500'.

Glødende Kyst; fugtig Luft, men sparsom Regn, paa Grund af Ensformighed i Luftens

Opvarming og Jordbundens stærke Ophedning. Sandstrækninger, Sandhøje (callejones), Laguner derimellem; sparsom Vegetation af tørre tornede forvoxne Buske; ikun Flodmundingerne og Bredderne af de større udvaskede Laguner have prægtig Skovvegetation.

Vandbregner: *Acrostichum aureum* L., *Parkeria pteroides* Hook. & Grev.

Jordbregner: a) Skovformer: *Lygodium mexicanum* Presl, *Pteris grandifolia* L., *Aspidium trifoliatum* Sw., *Asplenium cicatricarium* Sw., *Adiantum radiatum* Sw., *Lastrea patens* Pr., *Polystichum melanostichum* Kze., *Blechnum occidentale* L.

b) Markformer: *Pteris caudata* L.

c) Klippeformer: *Adiantum trapeziforme* L., *A. tenerum* Sw., *A. chilense* Kaulf., *A. concinnum* HB.

Parasiter: *Polypodium crassifolium* L., *P. Phyllitidis* L., *Vittaria graminifolia* Kaulf., *Polyp. lycopodioides* L., *P. neriifolium* Schk., *P. incanum* Sw.

B. Tropiske Region fra 500—1500'.

Udstrakte Græssavanner og prægtige Höiskove (*Bombax*, *Carolinea*, *Bignonia*, *Laurineæ*, *Terebinthaceæ*, *Palmæ*, o. fl.); dybe vulkanske Barankas med fyldig Vegetation paa Grund af Skygge og Fugtighed.

De i foregaaende Region nævnte Bregnearter gaae ogsaa over i denne med Undtagelse af *Polyp. lycopodioides* og *Vandbregnerue*. Fremdeles findes her:

Vandbregner: *Asplenium riparium* Lb.

Jordbregner: a) Skovformer: *Gymnogramme polypodioides* Spr., *Polyp. tetragonum* Sw., *P. concinnum* W., *P. faucium* Lb., *P. imbricatum* Lb., *Pteris laciniata* W., *P. protea* Lb., *P. pulchra* Schld., *Asplenium pumilum* Sw., *A. mexicanum* Mart. & Gal., *Diplazium crenulatum* Lb., *Dicksonia umbrosa* Lb., *Lastrea macroura* Kze., *Nephrodium molle* Schott., *Acrostichum cervinum* Sw., *Diplaz. inaequilaterum* Lb., *Lindsæa imbricata* Lb., *Nephrolepis acuta* Presl, *N. neglecta* Kze., *Marattia laxa* Kze., *Danæa elata* Lb., *D. media* Lb., *Mertensia gleichenioides* Lb.

Træagtige ere: *Alsophila compta* Mart., *A. Schiedeana* Pr. (sparsom i denne, hyppigere i næste Region).

b) Klippeformer: *Hemionitis palmata* L., *Aneimia adiantifolia* Sw., *Allosorus intramarginalis* Pr.

Parasiter: *Polypod. Filicula* Kaulf., *P. plumula* W., *P. fraternum* Schld., *Antrophyum discoideum* Kze., *Polyp. fallax* Schld., *Asplenium monodon* Lb., *Lomaria fragilis* Lb., *Trichomanes sinuosum* Rich., *T. pyxidiferum* L., *T. trichoideum* Sw.

C. Subtropiske Region fra 1500—3000'.

Regnmængde tiltager med Luftens Afkjøling, jevnlig Taage; frødigere Vegetation, mange Slyngplanter af *Smilax*, *Vitis*, *Cissus*, *Malpighiaceæ*, *Convolvulaceæ*, *Asclepiadæ*, mange lave Palmer, mange *Piperaceæ*, *Urticeæ*.

Østlige Del af Dep. Oajaca (Districtet Chinantla) hører for største Delen til denne Region.

Af Bregnerne fra foregaaende Regioner forsvinde i denne følgende: *Pteris grandifolia*, *Polyp. faucium*, *imbricatum*, *Pteris pulchra*, *Dicksonia umbrosa*, *Acrostichum cervinum*, *Lindæa imbricata*, *Nephrolepis neglecta*, *N. acuta*, *Danæa elata*, *media*, *Aneimia adiantifolia*, *Asplen. monodon*, *Mertensia gleichenioides*, *Alsophila compta*.

Følgende fremtræde i denne Region:

Jordbregner: a) Skovformer: *Acrostichum umbrosum* Lb., *Meniscium sorbifolium* W., *M. falcatum* Lb., *Polyp. longicaudatum* Lb., *Asplen. birenatum* Lb., *Adiantum pulverulentum* L., *Trichomanes pennatum* Kaulf., *Schizæa elegans* Sw., *Danæa cuspidata* Lb., *Hemitelia decurrens* Lb., *H. mexicana* Lb. Træagtige: *Alsophila myosuroides* Lb.

b) Klippeformer: *Asplenium arcuatum* Lb., *Aneimia hirsuta* Sw., *A. fulva* var. *flexuosa*, *Adiantum villosum* L.

Parasiter: *Acrostichum revolutum* Lb., *A. Lingva Raddi*, *A. Sartorii* Lb., *A. peltatum* Sw., *Polyp. sessilifolium* Lb., *P. conterminans* Lb., *P. laxifrons* Lb., *P. longicaudatum* Lb.

Følgende Former begynde i denne Region, men ere især fremherskende i den efterfølgende tempererte Region:

Jordbregner: a) Skovformer: *Asplenium marginatum* L., *Dicksonia cicutaria* Sw., *D. dissecta* Sw., *Adiantum macrophyllum* Sw., *Cibotium Schidei* Schldl.

b) Klippeformer: *Gymnogramme pedata* Kaulf., *G. leptophylla* Desv., *Tænitis angustifolia* Spr., *Asplen. formosm* Sw., *A. polymorphum* Mart. & Gal., *A. Serra* Langs. & Fisch., *Adiantum obliquum* W., *Lastrea mexicana* Pr., *Polystichum ordinatum* Kze., *Aneimia pilosa* Mart. & Gal.

c) Aabne Steder: *Trichomanes pellucens* Kze., *Mertensia glaucescens* HB., *M. pubescens* W., *Lygodium venustum* Sw.

Pasasiter: *Antrophyum lanceolatum* Kaulf., *Polyp. angustum* HB., *Hymenophyllum asplenifolium* Sw., *H. brevistipes* Lb., *H. ciliatum* Sw., *H. plumosum* Kaulf.

D. Temperererte Region fra 3000—6000'.

Stor Regnmængde, og Regnfald uden store Afbrydelser hele Aaret igjennem. Plante-

rigeste Region. Immergrønne Egeskove; træagtige Bregner hyppige, og erstatte de manglende træagtige Palmer; Rørpalmer endnu hyppige. Orchideer fremherske i denne Region.

Af de foregaaende Regioners Bregner forsvinde i denne følgende:

Acrostichum umbrosum *Hemionitis palmata*, *Gymnogramme polypodioides*, *Meniscium sorbifolium*, *M. falcatum*, *Polypod. sessilifolium*, *conterminans*, *laxifrons*, *concinnum*, *longicaudatum*, *tetragonum*, *Pteris protea*, *Lomaria fragilis*, *Asplen. arcuatum*, *A. riparium*, *A. bicrenatum*, *A. monodon*, *A. cicutaria*, *Diplazium crenulatum*, *D. inaequilaterum*, *Cheilanthes squamosa*, *Adiantum villosum*, *A. pulverulentum*, *A. Capillus Veneris*, *A. concinnum*, *Lindsæa imbricata*, *Nephrolepis acuta*, *N. neglecta*, *Lastrea macroura*, *Aspid. macrophyllum*, *Hemitelia decurrens*, *H. mexicana*, *Trichomanes sinuosum*, *pennatum*, *Lygodium mexicanum*, *Schizæa elegans*, *Aneimia fulva*, *Danæa cuspidata*, *Marattia laxa*.

Følgende fremherske i denne Region:

Jordbregner: a) Skovformer: *Gymnogramme Linkiana Kze.*, *Polypodium rude Kze.*, *P. liti-giosum Lb.*, *P. Sloanii Kze.*, *P. meniscoides Lb.*, *Pteris nemoralis W.*, *P. Swartziana J. Ag.*, *P. apicalis Lb.*, *Lomaria spectabilis Lb.*, *L. campylotis Kze.*, *L. danaeaceæ Kze.*, *Blechnum aduncum Lb.*, *B. intermedium Lk.*, *B. glandulosum Lk.*, *Asplen. miradorense Lb.*, *A. achilleæfolium Mart. & Gal.*, *Diplazium plantagineum Sw.*, *D. ternatum Lb.*, *D. falcatum Lb.*, *D. striatum Pr.*, *D. lonchophyllum Kze.*, *D. Franconis Lb.*, *D. amplum Lb.*, *Dicksonia distenta Kze.*, *D. rubiginosa Kaulf.*, *Adiantum tetraphyllum W.*, *A. fructuosum Kze.*, *A. amabile Lb.*, *Lastrea leptorrhachis Kze.*, *Phanerophlebia nobilis Pr.*, *Cibotium horridum Lb.*, *Lygodium hastatum Desv. (?)*, *Aneimia Phyllitidis Sw.*, *Botrychium obliquum Mühlbg.*, *B. decompositum Mart. & Gal.*, *B. virginicum Sw.*, *Marattia weinmanniæfolia Lb.*

Træagtige ere *Cyathea mexicana Schldl.*, *C. bicrenata Lb.*, *C. Schanschin Mart.*, *Alspila Schiedeana Pr.* (meget hyppig i denne Region). De træagtige Bregner forsvinde paa henimod 5000'.

- c) Klippeformer: *Gymnogramme tartarea Desv.*, *G. peruviana Desv.*, *Notochæna pulvraea Kze.*, *N. sinuata Kaulf.*, *Allosorus ciliatus Pr.*, *A. angustifolius Pr.*, *A. microphyllus Sw.*, *A. formosus Lb.*, *A. flexuosus Kze.*, *Pteris pedata L.*, *Asplen. abscissum W.*, *A. lugubre Lb.*, *A. insigne Lb.*, *A. monanthemum L.*, *A. semicordatum Raddi*, *A. coriifolium Lb.*, *A. pyramidalatum Lb.*, *A. lacerum Schldl.*, *Cheilanthes glandulifera Lb.*, *Polystichum lætum Pr.*, *Cystopteris fragilis Bernh.*, *Aspid. latifolium Pr.*, *Woodsia mollis Hook.*, *Hymenophyllum fucoides Sw.*
- c) Abne Steder: *Davallia Schlechtendalii Pr.*, *Pteris aquilina L. var. pubescens*, *Woodwardia radicans Sw.*, *Blechnum scabrum Lb.*, *Trichomanes rigidum*

Sw., *Nephrolepis occidentalis* Kze., *Lastrea equestris* Kze., *Trichosorus glaucescens* Lb., *Mertensia Bancroftii* Hook., *M. furcata* W., *Aneimia speciosa* Pr., *Ophioglossum reticulatum* L.

Sumpbregner: *Gymnogramme trifoliata* Desv., *Nephrodium paludosum* Lb., *Osmunda spectabilis* W., *O. cinnamomea* L.

Parasiter: *Acrostichum Schiedei* Kze., *A. vestitum* Schldl., *A. peltatum* Sw., *Antrophyum lineatum* Kaulf., *Xiphopteris serrulata* Kaulf., *X. myosuroides* Kaulf., *Polypodium astrolepis* Lb., *P. aureum* L. (?), *P. fulvum* Mart. & Gal. (?), *P. araneosum* Mart. & Gal. (?), *P. lepidopteris* Kze., *P. Falcaria* Kze., *P. plesiosorum* Kze., *P. rhodoleurum* Kze., *P. lepidotum* W., *P. angustifolium* Sw., *P. squamatum* L., *P. furfuraceum* Schldl., *P. plebejum* Schldl., *P. olivaceum* Lb., *P. rhachipteryginum* Lb., *P. insigne* Lb., *P. costatum* Lb., *P. xiphopterooides* Lb., *P. jubæforme* Kaulf., *P. pilosissimum* Mart. & Gal., *P. suspensum* L., *P. cultratum* W., *P. pectinatum* Schk., *P. puberulum* Schldl., *Asplenium harpeodes* Kze., *A. furcatum* L., *A. erectum* Bory, *Hymenophyllum undulatum* Sw., *H. polyanthos* Sw., *H. millefolium* Schldl., *H. pulchellum* Schldl., *Trichomanes reptans* Sw., *T. scandens* L., *Ophioglossum palmatum* Plum.

E. Lavere Alperegion 6000—9000'.

Stor Regnmængde, hyppige Taager formindske Sommervarmen; Vintertemperaturen synker ofte til 0° C. Sneen ligger dog ikun i faae Timer. Naaleskove og Egeskove, mange Ericaceer, Umbelliferer, Cruciferer, faa Orchideer, men terrestre.

Fra foregaaende Regioner overgaae endnu i denne følgende Bregner:

Acrostichum Schiedei, *A. vestitum*, *Gymnogr. tartarea*, *G. peruviana*, *Polyp. lepidotum*, *P. angustifolium*, *P. incanum*, *P. squamatum*, *P. furfuraceum*, *P. xiphopterooides*, *P. plebejum*, *P. olivaceum*, *Notochlæna sinuata*, *Allosorus ciliatus*, *A. microphyllus*, *A. intramarginalis*, *Pteris cretica*, *P. aquilina* v. *pubescens*, *Woodwardia radicans*, *Asplen. monanthemum*, *A. furcatum*, *Hymenophyllum fucoides*, *Cystopteris fragilis*.

Charakteristiske for denne Region ere:

Jordbregner: a) Klippeformer: *Acrostichum hybridum* Bory, *A. setosum* Lb., *Gymnogramme pilosa* Mart. & Gal., *Notochlæna rufa* Pr., *Allosorus sagittatus* Pr., *A. ternifolius* Cav., *Lomaria falciformis* Lb., *Asplenium melanocaulon* W., *A. castaneum* Schldl., *A. resiliens* Kze., *A. rhizophyllum* Kze., *Cheilanthes canescens* Kze., *C. pulveracea* Pr., *C. paleacea* Mart. & Gal., *Adiantum cuneatum* Langs. & Fisch., *A. andicola* Lb., *Polystichum vestitum* Pr., *Cystopteris fumarioides* Kze., *Athyrium angustum* Pr., *A. arcuatulum* Lb., *Hymenophyllum nigrescens* Lb.

b) Aabne Steder: *Cheilanthes lentigera* Sw., *Lastrea parallelogramma* Kze, *Woodsia fragilis* Lb., *Trichosorus frigidus* Lb., *T. densus* Lb., *Mertensia Mathewsi* Hook., *Ophioglossum bulbosum* Michx.

Parasiter: *Acrostichum ovatum* Lb., *A. nitidum* Lb., *Polypod. polylepis* Roem., *P. glaucinum* Mart. & Gal. (?), *P. deltoideum* Lb., *P. confluens* Lb., *P. moniliforme* Sw., *P. delicatulum* Mart. & Gal., *P. affine* Mart. & Gal., *P. griseum* Lb., *P. Otites* L., *Lomaria pectinata* Lb., *Hymenophyllum trapezoidale* Lb.

I denne Region findes ingen egne Skovformer, men ikkun enten Parasiter eller Klippebregner.

F. Øvre Alpe-Region fra 9000' til Vegetationsgrænsen.

Sneen ligger i flere Maaneder; det øvrige Aar trække Taager daglig op og ned, næsten daglig Regn; raat Clima; Naaleskove fremherske, Egene aftage og forsvinde paa noget over 11,000'; enkelte Naaletraer gaae indtil 14000'. Byg modnes ikke paa 10,000', Kartofler lykkes godt paa 10,000'. Bregnerne i sterk Aftagen, de fleste voxer i Klippe-sprækker, faa Parasiter.

Følgende Bregner findes i denne Region.

Jordbregner: Klippeformer: *Acrostichum venustum* Lb., *A. rufescens* Lb., *Gymnogramme pilosa* Mart. & Gal., *Polypod. heteromorphum* Hook. & Grev., *Asplenium melanocaulon* W., *A. monanthemum* L., *Cheilanthes speciocissima* A. Br., *C. scariosa* Kaulf., *C. paleacea* Mart. & Gal., *C. lentigera* Sw., *Adiantum cuneatum* Langs. & Fisch., *Cystopteris fragilis* Bernh., *C. fumarioides* Kze.

Parasiter: *Acrostichum tenuifolium* Lb., *A. affine* Mart. & Gal., *Antrophyum ensiforme* Hook. (?), *Polypod. affine* Mart. & Gal.

De höist gaaende Bregner ere: *Acrostichum rufescens*, 11,000'; *Asplen. melanocaulon*, 11,000', *Cheilanthes lentigera* og *paleacea*, 11,000', *Cystopteris fragilis* 12,500'; *Polypod. polylepis* 14,000' paa de enkelte forkröblede *Pinus Stammer*, som findes paa den höieste Fjeldslette, hvorover en Mauldyrsti fører ned til S. Andres.

2º Mexicos Indre.

Höisleter eller höitliggende Dalbakkener (Mexicodalen, Tehuacandalen, Oajacatalen) adskilte ved stenige traflattige Bjergkjeder. Climatet tört, ugunstig for Bregneformen, som ikkun findes sparsomt i Klippeklofter, især i de höiere alpinske Strög. Höisletterne og Dalbundene have ingen Bregner. Mange af de i denne Region forekommende Bregner have hygroskopiske i tör Tilstand spiralformigt indrullede Löv.

Paa Grund af Landets Höide have vi i det Indre af Mexico ikkun en temperert og kold Region.

Tempererte Region.

Klippebregner: *Gymnogramme leptophylla* Desv., *Notochlæna sinuata* Kaulf., *N. bipinnata* Lb., *N. cretacea* Lb., *N. pulveracea* Kze, *Allosorus microphyllus* Sw., *Cheilanthes lentigera* Sw., *Allosorus flexuosus* Kze, *Lastrea mexicana* Pr., *Allosor. intramarginalis* Pr., *Adiantum Capillus Veneris* L., *Polypodium squamatum* L., *Asplen. heterochroum* Kze.

Aabne Bjerge: *Hypolepis mexicana* Lb., *Botrychium virginicum* Sw.

Kolde Region.

Klippebregner: *Gymnogramme pedata* Kaulf., *G. tartarea* Desv., *G. peruviana* Desv., *Calomelanos* Kaulf., *Notochlæna sinuata* Kaulf., *Cheilanthes canescens* Kze, *Allosorus sagittatus* Pr., *A. ciliatus* Pr., *A. cordatus* Pr., *A. Karwinskii* Kze, *A. microphyllus* Sw., *A. ternifolius* Pr., *A. aurantiacus* Pr., *Pteris cretica* L., *Adiantum chilense* Kaulf., *Cheilanthes paleacea* Mart. & Gal., *C. lentigera* Sw., *Asplenium monanthes* L., *A. fragile* Pr., *Lastrea paupertina* Kze, *L. indecora* Lb., *Polyp. angustifrons* Kze, *P. macrocarpum* Pr., *P. subpetiolatum* Hook., *P. lanuginosum* N. ab E.

Aabne Bjerge: *Aneimia mexicana* Klotzsch, *Ophioglossum bulbosum* Michx.

Parasiter: *Acrostichum Schiedei* Kze, *Polypod. incanum* Sw., *P. xiphopteroides* Lb., *P. Hartwegianum* Hook., *P. polylepis* Roem., *P. moniliforme* Sw. var major.

3^o Mexicos Vestside.

Vestlige Cordillerease naae omtrent samme Middelhøide (9—10,000') som de østlige, bedækkes af Fyrreskove, og paa den vestlige Heldning af de tætteste prægtigste Lövskove, men Bregner ere yderst sparsomme, og yderst faae charakteristiske Former forekomme. Eneste bekjendte traagtige Form fra Vestsiden er *Alsophila mexicana* Mart. Forresten er Vestsiden usfuldkommen kjendt. Mange af de ældre Forff's for Vestsiden angivne Bregner maa ansees som altfor tvivlsomme til at man her tør tage Hensyn dertil.

Kolde Region.

Klippeformer: *Allosorus sagittatus* Pr., *A. Karwinskii* Kze, *Notochlæna rufa* Pr., *Asplen. monanthes* L., *Athyrium angustum* Pr.

Parasiter: *Polypod. xiphopteroides* Lb., *P. angustum* HB., *P. furfuraceum* Schldl., *P. Lepidopteris* Kze, *Acrostichum nanum* Lb.

Tempererte Region.

Klippeformer: Gymnogramme pedata Desv., G. Calomelanos Desv., Allosorus aurantiacus Pr., A. angustifolius Pr., Aneimia adiantifolia Sw., Nephrodium molle Schott., Asplen. dimidiatum Sw.

Aabne Bjerge: Aneimia collina Raddi, A. hirsuta Sw., A. speciosa Pr., A. pilosa Mart. & Gal.

Skovformer: Aneimia Phyllitidis Sw., Alsophila mexicana Mart.

Parasitisk: Polypodium angustum HB.

Hede Region.


Skovformer: Asplenium amabile Lb., Pteris grandifolia L., Lygodium mexicanum Pr., L. venustum Sw.

Vandbregne: Parkeria pteroides Hook. & Grev.

Bemærkede Trykfejl og Rettelser.

- Pag. 161 Lin. 6. weinmanniæfolia læs weinmanniæfolia.
- „ — 22. Antroph. carnosum Libcm. læs A. discoideum Kze.
- 163 — 10. param læs parum.
- 164 — 4. Komma bort efter sterilibus.
- 165 — 11. paululum læs sensim.
- „ — 15. convexa læs convexo.
- 168 sidste Linie. inæquilatero læs inæquilatera.
- 172 — 20. in areola hexagonoidea irregularia læs in areolas hexagonoideas irregularces.
- 173 — 21. in areola parallelogramma irregularia læs in areolas parallelogrammas irregularces.
- „ — 24. areola rotundata læs areolas rotundatas.
- „ — „ rhachide læs rhachi.
- „ — 28. repanda læs repanda.
- 174 — 23. in areola irregulariter angulata læs in areolas irregulariter angulatas.
- 183 — 23. glaberrimus læs glaberrimis.
- 221 — 24. Allosorus ternifolia læs A. ternifolius.





To avoid fine, this book should be returned on
or before the date last stamped below

2008-0146



CALIF ACAD OF SCIENCES LIBRARY

3 1853 00043 5771